

LM-OrT-FR-019

## PRENATAL TARAMA TESTLERİ BİLGİ FORMU

## İlgili Testi Seçiniz:

1. Trimester Down Sendromu Tarama Testi-Kombine Testi (İkili Test)  Down Sendromu Tarama Testi-Entegre Test
2. Trimester Down Sendromu Tarama Testi (Üçlü Test)  Alfa Fetoprotein (AFP), Maternal Serum
2. Trimester Down Sendromu Tarama Testi (Dörtlü Test)  Alfa Fetoprotein (AFP), Amniyon Sıvısı

Risk hesabının doğru yapılabilmesi için aşağıdaki soruların eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

KİŞİSEL BİLGİLER			
Adı Soyadı:			
Protokol No:			
İrk:	Beyaz		Siyah
Sigara:	Evet		Hayır
İnsüline bağlı DM:	Evet		Hayır
Doğum Tarihi:	...../...../.....		
Gebelik Sayısı:			
SAT Tarihi:	...../...../.....		
Maternal Ağırlık:	.....kg		
Ultrasonografi Tarihi:	...../...../.....		
Örnek Alım Tarihi:	...../...../.....		

Fetüs Sayısı:	Tek		İkiz	
IVF Uygulaması mı?	Evet		Hayır	
Nazal Kemik:	Var		Yok	
	Değerlendirilmedi			
Daha önceki gebeliklerde NTD saptandı mı?	Hayır		Evet	
Daha önceki gebeliklerde kromozom anomalisi saptandı mı?	Hayır		Evet	



Monokoryonik, Monoamniyotik	
Monokoryonik, Diamniyotik	
Dikoryonik, Diamniyotik	



Trisomy 21		Trisomy 18	
Trisomy 13		Diğer	

1. Trimester için;			
CRL (Crown Rump Length)	.....mm	NT (Nuchal Translucency)	.....mm
2. Trimester için;			
BPD (Biparietal Diameter)	.....mm	BPD'ye göre düzeltilmiş gebelik	.....hafta.....gün

Hekimin Laboratuvara Notu:
----------------------------

Test isteğinde bulunan; Doktor Adı Soyadı: İmza: Telefon Numarası:
---

Formu dolduran/kontrol eden; Adı Soyadı: İmza:
--

## Uyarılar:

1. Trimester Tarama Testi için CRL değeri 43.0-83.9 mm arasında ve CRL'ye göre düzeltilmiş gebelik yaşı 11 hafta-13 hafta 6 gün arasında olmalıdır.

1. Trimester Tarama Testi için kan alma işlemi ve USG aynı gün içinde yapılmalıdır.

2. Trimester Tarama Testi (Üçlü ve Dörtlü Test) için gebelik yaşı 15-21 hafta (15 ve 21.hafta dahil) ve BPD değeri 29.7-52.0 mm arasında olmalıdır.

Çoğul gebeliklerde USG bilgileri her iki fetüs için ayrı belirtilmelidir.

İkiz gebelik riski, düzeltilmiş MoM değerleri ile tekli gebelik gibi hesaplanmıştır.

Down Sendromu Tarama Testi-Entegre Testinde; 1. ve 2. Trimester testleri ardışık olarak çalışılmaktadır.

NT ve nazal kemik ölçümleri için hekimin sertifikalı olması önerilir.