
ACIBADEM
LABMED
TEST KATALOĞU
Acıbadem Labmed Test Kataloğu

İÇİNDEKİLER

1. Acıbadem Labmed Klinik Laboratuvarları

2. Test Sonuçlarına Etki Eden Faktörler

3. Örnek Alımı

3.1. Genel Bilgiler

3.2. Numunenin Alınması

3.2.1. Kan Örnekleri

3.2.2. İdrar Örnekleri

3.2.3. Mikrobiyoloji Örnekleri

4. Örnek Transfer Koşulları

5. Alfabetik Test Listesi

1. ACIBADEM LABMED KLİNİK LABORATUVARLARI

Acıbadem Labmed Laboratuvarı, öncelikle büyüyen ve hizmet ağını genişleten Acıbadem Sağlık Grubunun Laboratuvar hizmetlerinin tek noktadan, yüksek standartlarla yürütülmesini sağlamak üzere organize edilmiştir. Grubun laboratuvar hizmetlerinin standart, hızlı ve güvenilir olarak sağlanmasının yanında, Acıbadem Sağlık Grubunun vizyonuna uygun olarak tüm Türkiye'ye referans laboratuvar olarak hizmet verilmesi de planlanmıştır. 2004 yılı Temmuz ayında daha etkin hizmet vermek üzere yeniden yapılandırıldı.

Doğru tanı ve etkin bir tedavi ancak nitelikli ve hızlı laboratuvar desteği ile sağlanabilir. Amacımız yüksek analiz kalitesi, nitelikli personel ve güncel gelişmeler ışığında sürekli verilen bilimsel danışmanlıkla, klinik laboratuvar tanısının gerektiği her durumda ve hastlarımızın tedavisinde en etkin yardımcınız olmaktadır.

Laboratuvarımız, güvenli test sonucu yanında en kısa sürede bu sonuçlara online ulaşılmasını da sağlamıştır.

Kataloğumuzda çalışılan tüm testlerin çalışma günü ve raporlama tarihleri belirtilmiştir. Ayrıca örnek tipi, gerekli miktarı, taşıma şartları, çalışma yöntemi ve teste ait özel uyarılar da yer almaktadır.

"Laboratuvarımızın güncel test listesini www.acibademlabmed.com.tr adresinden takip edebilirsiniz."

2. TEST SONUÇLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

Hasta bilgileri, testin yorumunu ve referans aralıklarını değiştirmektedir. Bu nedenle hastaya ait bilgiler (doğum tarihi, cinsiyet, prenatal tarama testleri bilgi formundaki bilgiler gibi) eksiksiz olarak verilmelidir.

Tanı ve tedavinin takibinde laboratuvarların önemi gittikçe artmaktadır. Test sonuçlarının güvenilir olması sadece laboratuvar performansına bağlı olmayıp, pre-analitik (analiz öncesi), analitik ve post-analitik (analiz sonrası) süreçlerde yer alan diğer faktörlere de bağlıdır. Son yıllarda teknolojik gelişmeler iç ve dış kalite kontrol sistemlerinin uygulanmasına imkan vermekte ve analitik süreç olabildiğince kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır.

Ancak test sonucunu etkileyebilecek pre-analitik faktörlerin kontrol altına alınması, laboratuvardan raporlanan test sonuçlarının güvenilirliğini arttıracaktır.

Pre-analitik faktörlerden birey ile ilgili olanlar, değiştirilebilenler ve değiştirilemeyenler olarak ikiye ayrılmaktadır.

Değiştirilemeyen faktörler:

- Yaş
- Cinsiyet
- Irk
- Fizyolojik özellikler (gebelik gibi)
- Genetik özellikler

Değiştirilebilen faktörler:

- Beslenme şekli
- Alkol kullanımı
-

- Sigara
- İlaç kullanımı
- Aktivite
- Postür
- Sirkadiyen ritim

Analiz öncesi dikkat edilmesi gereken faktörler:

- Hastanın hazırlanması
- Numunenin alınması
- Numunenin analize uygun hale getirilmesi ve saklanması

3. ÖRNEK ALIMI

3.1. GENEL TANIMLAR

Açlık: Laboratuvar işlemlerinin standardizasyonu ve teknikleri açısından 10-12 saatlik açlık tercih edilmelidir. Ancak açlık 16 saati aşmamalıdır.

İlaç kullanımı: Kullanılan ilaçların ölçülecek olan analitik etkileyip etkilemeyeceği kontrol edilmelidir. Gerekiyor ise kullanılan ilaçlar bırakılmalıdır. İlaç kullanan hastalarda kan örneği son ilaç dozundan hemen önce alınmalıdır.

Postür: Tedavinin izleminde kullanılacak olan testler hastadan her zaman aynı pozisyonda alınmalıdır. Hasta yatar veya oturur pozisyona geçtiğinde en az 5-10 dakika beklenerek ekstraselüler ve interstisyal kompartmanlar arasındaki sıvı dengesi sağlanmalıdır.

ALT, Albumin, ALP, Amilaz, AST, Kalsiyum, Kolestrol, IgA, IgM, IgG, Tiroksin, Trigliserid

Egzersiz: Aktivitenin süresinin ve yoğunluğunun bazı analitleri etkilediği unutulmamalıdır.

Egzersizin vücut sıvıları üzerine etkisi, süresi ve zorluğu ile ilgilidir. Ağır egzersiz sonrası asit fosfataz, ALP, AST, ALT, GH, kalsiyum, klorür, kolesterol, kreatinin, fosfor, total protein, üre ve ürik asit gibi analitlerin konsantrasyonu yaklaşık %1-41 oranında artmakta iken, albumin, bilirubin, demir, LDH, potasyum, sodyum ve total lipid konsantrasyonu %1-12 oranında azalmaktadır.

Sirkadiyen ritim: Örnek alma standardizasyonu için analitlerin sirkadiyen ritimleri göz önünde bu Vücut sıvılarında bulunan birçok analit gün içerisinde sirkadiyen ritim göstermektedir. Postür, yemek yemek, stres, aktivite, gün ışığı, uyku veya uyanıklık gibi birçok faktörler bu değişikliklere neden olmaktadır. Bu değişiklikler bazı durumlarda oldukça fazla olup kan alım zamanına dikkatlice uymak gerekmektedir. Bu değişikliklerden en fazla etkilenen analitlerden bir tanesi kortizol olup; 06:00-08:00 arasında en yüksek seviyelerde bulunmaktadır. Bir diğer analit ise serum demiridir. Sabah saat 08:00 ve 14:00'de alınan numunelerden çalışılan serum demiri yaklaşık %50 değişiklik gösterebilmektedir. Bu sebepten dolayı aşağıdaki listede örnekleri belirtilen analitlerin ölçümünde sirkadiyen ritim göz önünde bulundurulmalıdır:

Kortizol, ACTH, Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Klorür, Fosfat, Üre, Kreatinin, Ürik asit, Demir, Kolesterol, Albumin, Total protein, Total lipid, AST, ALT, Asit fosfataz, ALP, LDH

3.2. ÖRNEKLERİN ALINMASI

Klinik bölümler; tanı koymak, tanıyı desteklemek, rutin kontroller ve takip amaçlı istediği laboratuvar testleri için kayıt oluştururlar. Açılan kayıtların takibini sağlamak için web üzerinden oluşturulmuş irsaliyeler de örnekler ile birlikte gönderilmelidir.

3.2.1. KAN ÖRNEKLERİ

Laboratuvarlarımızda kullanılan tüpler vacutainer özellikte olup hemogard kapak özellikleri taşımaktadır. Ayrıca vacutainer özellikli bazı tüplerin ise konvansiyonel kapakları bulunmaktadır. Aşağıda kapak renkleri verilen tüplerde ilk renk hemogard diğeri ise konvansiyonel kapak rengini temsil etmektedir.

Venöz Kan Alımı:

- İstenen testler ile hasta durumunun uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. (açlık, diyet kısıtlaması, ilaç kullanımı, örnek alım zamanı vb.) Test bilgileri ve örnekler ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.acibademlabmed.com.tr internet adresinden ulaşılabilmektedir.
- Alınan örnek tüpünün barkotlanması işlemi dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Barkod üzerindeki isim, soy isim, doğum tarihi ve örnek numarası kontrol edilmelidir.
- Turnike, kan alınacak damardan yaklaşık 10 cm yukarı bağlanır. Turnike kolda 1 dakikadan fazla kalmamalıdır ve iğne damara girdikten sonra hemen gevşetilmelidir . Kola uygulanacak olan basınç maksimum 60 mmHg olmalıdır.
- Kan alınacak bölge alkol ile merkezden dışarı doğru dairesel şekilde temizlenir ve kuruması beklenir.
- Kan örnekleri aşağıda belirtilen sırada uygun tüplere alınır . Enjektör ile kan alımında, enjektör pistonu hızlı çekilmemelidir.
- Antikoagülan içeren tüplere kan alımında, kan tüp üzerinde bulunan işaret çizgisine kadar mutlaka dolmalıdır ve kan alındıktan sonra tüpler 8-10 kez nazikçe alt-üst edilmelidir.

Kan alım sırası:

1. **Kan kültür tüpü**

   Kontaminasyona engel olmak için kan kültürü alma işlemi hasta başında yapılır. Yapılacak istem ve hastanın yaşına göre 3 tip kan kültür şişesi mevcuttur. (Aerob, Anaerob ve Pediatrik)

   Kültür şişesinin renkli kapağı açılarak kapağın altındaki lastik bölüm %70 alkol ile silinir. Lastik bölüm iyot ile dezenfekte edilir. Kuruması için bir dakika beklenir. Birinci örnek alındıktan sonra diğer bölgeden aynı işlem uygulanarak örnek alımı gerçekleştirilir.

2. **Mavi kapaklı (sitratlı)**

   Sodyum sitrat içermektedir. Koagülasyon analizleri için gerekmektedir. Kan-Antikoagülan oranının 9:1 olması gerektiğinden kan örnekleri tüp üzerindeki çizgiye kadar alınmalıdır. Kan alındıktan sonra 8-10 defa nazikçe alt-üst edilmesi gerekir.

3. **Siyah kapaklı (Sodyum sitratlı)**

   Sodyum sitrat içermektedir. Eritrosit sedimantasyon analizi için kullanılmaktadır. Kan alındıktan sonra 8-10 defa nazikçe alt-üst edilmesi gerekir.

4. **Kırmızı/sarı kapaklı**

Klot aktivatörü ve serum separasyonu için jel içerir. Klinik kimya testleri için kull anılır . Kan alındıktan sonra klot aktivatörü ile kanın karışması için 3-4 defa nazikçe alt-üst edilmesi gerekir. Kesinlikle çalkalanmamalıdır. Kanın pıhtılaşma zamanı yaklaşık 30 dakikadır.

5. **Kırmızı-siyah**

Cam olanlar herhangi bir katkı içermemekte olup plastik olanlar ise klot aktivatörü içermektedir. Klot aktivatörü içeren tüp kan alındıktan sonra 3-4 kez nazikçe alt üst edilmelidir. Klinik kimya, seroloji testleri için kullanılmaktadır.

6. **Turuncu kapaklı**

Turuncu kapaklı tüpler pıhtılaşma işlemini hızlandırmak için trombin içeren bir pıhtı aktivatörü ile kaplı olup ayrıca içerisinde serum separasyonu içinde jel bulunmaktadır. Kan alındıktan sonra, trombin ile kanın karışması için 5-6 defa nazikçe alt üst edilmesi gerekir. Kesinlikle çalkalanmamalıdır. Kanın pıhtılaşma zamanı yaklaşık 30 dakikadır. Laboratuvarımızda turuncu kapaklı tüpler Biatin testi analizi için kullanılmaktadır.

7. **Yeşil kapaklı (Lityum heparinli)**

Plazma elde edilmesi için lityum heparin içermekt edir. Plazmada ölçüm gerektiren klinik kimya testleri için kullanılmaktadır. Kan alındıktan sonra 8-10 defa nazikçe alt-üst edilmesi gerekir.

Mor kapaklı (EDTA'lı)

EDTA içer mektedir . Hematolojik analizler için gereklidir. Kan alındıktan sonra 8-10 defa nazikçe alt-üst edilmesi gerekir.

8. **Gri kapaklı (Sodyum florürlü)**

Sodyum florür içermektedir. Sodyum florür antiglikolitik bir ajandır . Glukoz ve laktat ölçümünde kullanılmaktadır. Kan alındıktan sonra 8-10 defa nazikçe alt-üst edilmesi gerekir.

Örnek alımından sonra testlerin çalışma özelliklerine göre serum ve plazma ayrımları için santrifüj işlemi gerçekleştirilir . Hemolizli veya hücrelerinden tam ayrılmamış serumlar analiz için uygun değildir bu nedenle santrifüj işlemi çok dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Pıhtılaşma sonrası (kan alımından ortalama yarım saat sonra) kan 10 dakika 1300 x g'de santrifüj edilir.

Santrifüjün dakikadaki dönme hızı olan RPM, santrifüjün büyüklüğüne ve rotor çapına bağlı olarak santrifüj edilen materyalin çökme hızında farklılıklar yaratabilir. Bu farklılığı ortadan kaldırmak için "göreceli santrifügal kuvvet" olan RCF (g) ölçüm birimi kullanılır. Bunun için santrifüjün rotor çapı ölçülerek RPM'den RCF (g)'ye dönüşümü hesaplanır.

Horizontal açılı santrifüj için RCF (g) = 1.118 x 10^{-5} x r (mm) x (RPM) formülü kullanılır ya da aşağıdaki nomogramdan yararlanılır.



Horizontal Açılı Santrifüj

Sabit açılı santrifüj için RCF (g) = 1.118 x 10^{-5} x r (mid) (mm) x (RPM) formülü kullanılır ya da aşağıdaki nomogramdan yararlanılır.



Sabit Açılı Santrifüj

RCF (g) = 1.118 x 10^{-5} x r(mid) x $(RPM)^2$

RCF (g) = Göreceli Santifügal Kuvvet (relative centrifugal force)

RPM = Dakika Başına Santrifüj Dönme Hızı

r = Rotor Çapı

r (mid) = r (max) + r (min) / 2



Göreceli Santrifügal Kuvvet hesaplamak için Nomogram

Kapiller Kan Alımı:

- Metabolik Tarama-Aminoasit ve Açilkarnitin Profili (Tandem MS)
- Biyotinidaz, Tarama Testi
- Fenilketonüri Tarama Testi (PKU)
- Neonatal TSH kapiller kandan çalışılır.

Yenidoğan Tarama Testleri:

Doğumsal metabolizma hastalıklarının belirlenmesinde kullanılan tarama amaçlı testlerdir. Kan örnekleri doğumdan en az 48 saat sonra ve anne sütü ya da mama ile beslenmeye başladıktan sonra alınması gerekmekt edir. Doğumdan 48-72 saat sonra örnek alınması, genel olarak önerilmektedir. Eğer bebeğe transfüzyon yapılacak ise, örnek transfüzyondan önce alınmalıdır. Doğumdan sonraki ilk 24 saat içinde alınan örnekler ile prematüre bebeklerden ve/veya transfüzyon sonrası alınan örnekler için test tekrar edilmelidir.

- Örnek alımı için en uygun bölge topuğun yan kısımlarıdır.
- Örnek alınacak bölge önceden ılık hale getirilmelidir.
- Örnek alınacak bölge önce %70 izopropanol ile steril gazlı bez kullanılarak dezenfekte edilir ve alkolün fazlası steril gazlı bez ile kurulanır.
- Steril lanset ile kan alınacak bölge 1 kez delinir.
- İlk kan damlası steril gazlı bez ile silinir (Kesinlikle kullanılmamalıdır).
- Özel filtre kağıdı kanın üzerine temas ettirilerek kanın filtre kağıdı üzerindeki halkaları dolduracak şekilde emmesi sağlanır.
- Kanın, ne halkaların dışına taşacak kadar çok ne de halkaları doldurmayacak kadar az olmamasına dikkat edilmelidir .
- Kanın filtre kağıdının arkasına geçmesi sağlanmalıdır .
- Bir halkaya yeterli örnek alınamamış ise, aynı bölge üzerine birden fazla damla emdirilmeye çalışılmamalı ve yeni bir halkada alım işlemi tekrarlanmalıdır.
- Fenilketonüri ya da yenidoğan metabolik tarama testleri için en az 2 halka içeren filtre kağıdına ihtiyaç vardır.
- Filtre kağıdı oda sıcaklığında, güneş ışığı, toz, nem ve ısıdan uzak ortamda yatay şekilde en az 3 saat kurutulur. Kurutma işlemi için yapay ısı kullanılmamalıdır.
- Filtre kağıdı tamamen kuruduktan sonra temiz bir zarf ile 24 saat içerisinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.
-





3.2.2. İDRAR ÖRNEKLERİ

Toplanacak olan idrar gerçekleştirilecek test ölçümlerine bağlıdır. İdrar örnekleri randomize elde edilebileceği gibi 24 saatlik toplama ile de elde edilebilir.

Spot İdrar

- Günün herhangi bir saatinde alınan idrardır.
- Mikroskobik inceleme, protein miktarı ve gebelik için özellikle sabah idrarı daha konsantre olduğu için tercih edilmelidir.

Orta-akım İdrarı

- Mikrobiyolojide idrar kültürleri alımında kullanılan yöntemdir.
- Erkeklerde üretra ağzı, kadınlarda genital bölge önden arkaya doğru tek hareketle hijyenik mendil ile silinerek temizlenir
- Steril gazlı bez ile kurulanır.
- İdrarın başlangıç kısmı tuvalete yapıldıktan sonra devamı steril örnek kabına alınır . Son kısım yine dışarı yapılır.
- Örnek kabının kapağı dikkatlice kapatılır. Kapağın iç kısmına el değdirilmemelidir.

24 Saatlik İdrar

- Analizi yapılacak olan parametrelerin stabilizasyonu için herhangi bir koruyucu gerekip gerekmediği kontrol edilmelidir. Eğer gerekiyorsa; idrar toplanmaya başlamadan önce idrar kabına koruyucu ilave edilmelidir.
- Hastanın idrar toplama kabında bulunan koruyucu maddeleri herhangi bir şekilde kap dışına çıkarmaması, toplama kabını dik muhafaza etmesi ve kap içerisine idrarını direkt yapmaması öğütlenmelidir.
- Toplama işlemi bitince idrar kap içerisinde nazikçe karıştırılmalı, hacmi ölçülmeli ve yeterli miktar laboratuvara gerekli bilgiler ile gönderilmelidir.
- Toplama işlemi sırasında idrar örneklerinin güneş ışığından uzak bir ortamda mümkünse buzdolabında saklanmasına özen gösterilmelidir.
- Sabah elde edilecek ilk idrar numunesi en konsantre örnek olup, mikroskobik muayene ve idrarda normalde bulunmayan analitlerin belirlenmesinde önemlidir.

24 saatlik idrar toplanması:

- Hasta ilk idrarını tuvalete yaparak mesanesini boşaltır.
- Bu zaman, idrar toplanmaya başlanacak zaman olarak kaydedilir .
- İstenen süre boyunca tüm idrarlar toplama kabında biriktirilir.
- Süre bitiminde yapılan idrarda kap içerisine ilave edilerek toplama işlemine son verilir. İdrar hacmi kaydedilir.
- Toplama süresince idrar numunesi karanlık ve serin ortamda saklanmalıdır.

- Bazı testler için idrarın koruyucu içeren kaplarda toplanması gerekmektedir. Bunun için idrar toplanmaya başlamadan önce koruyucu kap içerisine konulmalı ve toplama işlemi süresince her idrar numunesi kaba eklendiğinde, kap nazikçe karıştırılmalıdır.

İdrar Koruyucuları:

İdrar koruyucularının görevi bakteri kontaminasyonunu azaltmak, kimyasal dekompozisyonu engellemek, stabil olmayan bileşiklerin oksidasyonunu azaltmak ve ölçülecek olan analitleri solübl halde tutmaktır.

İdrar örneklerine eklenmesi gereken koruyucularla ilgili ayrıntılı bilgiye www.acibademlabmed.com.tr internet adresinden ulaşılabilmektedir.

MİKROBİYOLOJİ ÖRNEKLERİ

Mikrobiyoloji örneklerinin genel alım kuralları:

- Uygun olduğu sürece örnekler antibiyotik kullanımı öncesi alınmalıdır.
- Örnekler uygun zamanlarda alınmalıdır (Örneğin tüberküloz kültürü için sabah ilk balgam örneği gibi).
- Uygun ve yeterli miktarda örnek alınmalıdır.
- Cilt kültür örnekleri için cilt yüzeyi %70'1ik alkol, klorheksidin veya iyot ile dekontamine edilmelidir . Örnek alımından önce 2 dakika beklenmelidir.
- Örnekler yakınındaki doku veya sekresyonlarla kontaminasyon oluşmamasına dikkat edilerek enfeksiyonun olduğu bölgeden alınmalıdır.
- Enfekte bölgeden yalnızca doku ve aspirat örneği alınmalıdır. Sürüntü örnekleri uygun materyal değildir.
- Örneğin nereden alındığı mutlaka belirtilmelidir.
- Farklı örnek türleri tek bir örnek kabına konulup, kültür antibiyogram testleri istenmemelidir.
- Örnekler laboratuvara en hızlı şekilde ve uygun koşullarda ulaştırılmalıdır.

Kan kültür örnekleri:

Yukarıda kan alımı sırasında belirtilen alım kurallarına göre alınır.

Mantar için örnek alımı:

Saç: Saç kökünden koparılarak alınmalıdır. Saçlı deri döküntüleri alınabilir. Kesilmiş saç örneği inceleme açısından uygun örnek değildir.

Tırnak: %70'lik alkol ile temizlenir. Tırnak üst kısmından bistüri ile kazıma örneği alınabilir. Tırnak kesilerek örnek alımı yapılır. Tırnağın altından kazıntı şeklinde de örnek alınabilir.

Cilt: %70'lik alkol ile temizlenir. Lezyon sınırından bistüri ile deri kazıntı örneği alınır.

Solunum Yolu Örnekleri:

Trakeal aspirat, Bronkoalveoler lavaj ve Fırça örneklerinin bakteriyel etkenler için kültürü 'Solunum Sekresyonlarının Kantitatif Kültürü' başlığı altında çalışılmakta ve örnek dilüe edilerek kantitatif olarak sonuç verilmektedir.

Trakeal aspirat: Örnek steril, vidalı kapaklı bir kapla laboratuvara gönderilmelidir. Eğer örnek hemen gönderilemeyecekse

buzdolabında 2-8°C' de saklanmalıdır. Laboratuvara 1 mL' nin altında örnek gönderilmemelidir.

Bronkoalveolar Lavaj (BAL): Anestezik jel varlığı antimikrobiyal etki yaratacağından örnek alımı esnasında kullanılmamış olması gerekir. Örnek steril, vidalı kapaklı bir kapla laboratuvara gönderilmelidir . Eğer örnek hemen gönderilemeyecekse buzdolabında 2-8°C' de saklanmalıdır.

Fırça örnekleri: Fırça örnekleri steril kapta 1 mL' lik steril serum fizyolojik içerisine konularak laboratuvara gönderilmelidir.

Balgam: Ağız musluk suyu ile çalkalanarak temizlenmelidir (Tüberküloz kültürü örneklerinde bu işlem uygulanmaz). Hasta derin bir nefes alarak ve bir kaç kez öksürtülerek steril bir kap içerisine örneği vermelidir.

Boğaz ve Tonsillerden Örnek Alımı: Örnek alımından önce herhangi bir şey yenmemiş olmalıdır. Gargara ya da dezenfektan bir madde kullanılmamalıdır. Eküvyon çubuğu, ağız mukozasına değdirilmeden, tükürükle temas etmesinden kaçınılarak tonsiller, farenks ve nazofarenkse bastırılıp döndürülerek örnek alınır. Hem boğaz kültürü hem de Streptococus pyogenes antijeni testi (Strep-A testi) isteği olan hastalarda aynı anda hem pamuklu hem de rayon eküvyon çubuğu kullanılarak örnek alınmalıdır. Örnekler 2 saat içerisinde laboratuvara gönderilemeyecekse oda sıcaklığında 24 saat saklanabilir.

Apse/PÜY örnekleri:

Cilt yüzeyi %70'lik alkol ve %1-2' lik iyot ile dekontamine edilmelidir. Steril bir enjektör ile pürülan materyal alınır. Alınan örnek uygun transport kabı (Anaerob transport kap/enjökter, heminli KI thioglikolat besiyeri, vb.) içerisinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.

Not: Sürüntü örnekleri çok çabuk kurudukları ve kısıtlı bir miktar örnek içerdikleri için kaliteli örnek türleri değildir. Sürüntü örnekleri ayrıca mikobakteri kültürleri için de uygun değildir.

İdrar Örneği:

Alınacak idrar örnekleri; orta idrar, kateter, sistoskopik veya suprapubik idrar örnekleridir. Eğer örnek invaziv bir yöntemle alınmış ise mutlaka belirtilmelidir. Sabah idrarının ya da mesanede en az 3 saat beklemiş idrarın alınması uygundur .

Kadınlarda orta idrar alımı : Öncelikle eller yıkanmalıdır. Genital bölge önden arkaya doğru yıkanır. Daha sonra steril temizlik mendilleriyle önden arkaya doğru t emizl enir. Steril gazlı bezle kurulanır. İdrarın ilk kısmı tuvalete boşaltılır. Orta idrar kısmı (5-10 mL) steril idrar kabına alınır. İdrarın son kısmı tuvalete boşaltılır.

Erkeklerde orta idrar alımı: Öncelikle eller yıkanmalıdır. Genital bölge yıkanır. Üretra ağzı steril temizlik mendilleriyle temizlenir. Steril gazlı bezle kurulanır. İdrarın ilk kısmı tuvalete boşaltılır.

Orta idrar kısmı (5-10 ml) steril idrar kabına alınır. İdrarın son kısmı tuvalete boşaltılır. Suprapubik aspirasyonla idrar örneği alımı: Akşam saat 24.00' den sonra mesane boşaltılmaz. Sabah bol sıvı içirilir. Bundan yaklaşık 3 saat sonra dezenfekte edilmiş suprapubik bölgeden örnek alınır .

Tüm idrar kültürü örnekleri; steril kaplara alınmalıdır. Kültürde üreme olduğunda otomatize cihazlar yardımıyla identifikasyon ve antibiyotik duyarlılık testleri çalışılmakta ve MİK değerleri ile birlikte verilmektedir.

Uygun olmayan koşullar: Steril olmayan ya da sızdıran kapla örneğin laboratuvara ulaşması, 24 saat içerisinde birden fazla örnek alınması, örneğin laboratuvara transportunun gecikmesi (oda ısısında 2 saatten fazla, ya da 2-8°C'de 24 saatten fazla beklemiş olması), kateter torbasından örnek alınmış olması. Dondurulmuş örnekler kabul edilmez.

BOS ve Diğer Vücut Sıvıları:

Kültür örnekleri alımı: BOS kültürü için alınacak örnekler oda ısısında taşınmalı ve saklanmalıdır. 1 ml beyin omurilik sıvısı steril tüp içerisinde laboratuvara gönderilmelidir. Her bir örnek tüpü koruma amacıyla bir falkon tüp içerisinde ve daha sonra kilitli poşet içerisinde gönderilmelidir. BOS örnekleri oda ısısında 24 saat st abildir . 2-8°C'de saklanmış ve dondurulmuş

örnekler uygun değildir.

Diğer vücut sıvıları: Amniyon sıvısı, perikardiyal, peritoneal, sinoviyal, torasentez materyalleri ve diğer vücut sıvı örnekleri mümkün olduğu durumlarda kan kültür şişelerine ekilerek laboratuvar gönderilmelidir. Alınan vücut sıvısının kendisinden de bir örnek 5 ml steril tüp içerisinde aktarılarak laboratuvara gönderilmelidir. Her bir örnek tüpü koruma amacıyla bir falkon tüp içerisine yerleştirildikten sonra kilitli poşet içerisine konularak gönderilmelidir. Örnekler oda ısısında 24 saat stabildir. 2-8° C'de saklanmış ve dondurulmuş örnekler uygun değildir.

Hücre sayımı için örnek alımı (BOS ve Diğer vücut sıvıları):

Hücre sayımı için alınan vücut sıvısı örnekleri antikoagülanlı tüpler içerisinde gönderilmelidir. BOS hücre sayımı örnekleri antikoagülansız steril tüplerde gönderilmelidir.

Gaita Örnekleri:

Temiz bir kap içerisine gaita (dışkı) örneği alınır. Örnekler kısa süre içerisinde laboratuvara ulaştırılır. "Entamoeba histolytica" varlığı düşünülen örnekler ilk yarım saat içerisinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.

ARB boyama, Tüberküloz kültürü ve Tüberküloz PCR için alınacak örnekler:

Balgam, sabah alınan ilk balgam örneği olup, miktarı 5 ml'den az olmamalıdır. İdrar örneği alınacaksa sabah ilk idrarının tamamı alınmalıdır.

İdrar ve balgam örnekleri ile yapılacak ARB incelemelerinde duyarlılığı arttırmak için, incelemenin birbirini takip eden 3 günde alınan ayrı örneklerle gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

BOS (Beyin Omurilik Sıvısı) ve vücut sıvıları örnekleri 5 ml'den az gönderilmemelidir. Örnekler, steril, vidalı kapaklı bir kapla laboratuvara gönderilmelidir. Eğer örnek hemen gönderilemeyecekse 2-8°C'de saklanmalıdır. 24 saat içerisinde aynı bölgeden alınan birden fazla örnek, kuru materyal, steril olmayan ya da sızdıran kapla örneğin laboratuvara ulaşması, balgamın miktar (2 ml'nin altında) ve niteliğinin uygun olmaması (tükürük ağırlıklı) veya gönderilen vücut sıvılarının miktarının 1 ml' nin altında olması, eküvyon çubuğu alınan materyaller çalışmalar için uygun değildir.

4. ÖRNEK TRANSFER KOŞULLARI

Örnekler, çevresel koşullardan etkilenmemesi için tasarlanmış transfer çantası içerisinde, test bilgilerinde yer alan taşıma ısıları ve belirtilen örnek miktarlarına göre uygun olarak şehir içerisindeki anlaşmalı kurumlardan, kuryeler ile şehir dışındaki anlaşmalı kurumlardan ise yurt içi taşıma şirketleri ile laboratuvarımıza ulaştırılır.

Laboratuvarımıza gelen testler için yeniden örnek istenmesinin en sık nedenleri;

-Test sonucunu etkileyecek faktörler (Hemoliz, lipemi, vb.)

-Testler için örnek miktarının yetersiz olması

-Özel şartlar gerektiren örneklerin uygun gönderilmemesi (donmuş olarak gelmesi gereken örnekler, koruyucu asit ile gelmesi gereken 24 saatlik idrarlar, ışıktan korunması gereken örnekler vb.)

Test bilgileri ve örnekler ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.acibademlabmed.com.tr internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Test listemizde bulunmayan herhangi bir test için lütfen laboratuvarımızı arayınız.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

ÖRNEK	KAP	MİKTAR	TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ

Laboratuvar Hizmetleri

C8661121 A Life Rutin Tarama Paketi -1

Panel içeriğinde: Tam Kan Sayımı, C reaktif protein (CRP), Kreatinin, Üre Azotu (BUN), Sodyum (Na), Potasyum (K), Alanin Aminotransferaz (ALT), Aspartat Aminotransferaz (AST) yer almaktadır. Test panelinde tanımlı tüm örnek türleri gereklidir.

Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak (CBC)**	1	mL	2-8°C		

C8661123 A Life Rutin Tarama Paketi -2

Panel içeriğinde: Vitamin B12, Vitamin D, 25-Hidroksi, Demir (Fe), Total Demir Bağlama Kapasitesi (TDBK), Ferritin, Folik Asit, Albumin, Protein, Total, Tiroid Stimülan Hormon (TSH), Magnezyum (Mg), Kalsiyum (Ca) yer almaktadır.

Serum	**Jelli Tüp**	5	mL	2-8°C	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00

C8040002 ACTH Stimülasyon Testi (Kortizol)

Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00

Serum: Hasta örnek vermeden önce en az 8 saat aç olmalıdır.Örnek alınmadan önce hasta 30 dakika istirahat ettirilmelidir. Örnek ile birlikte Fonksiyon Testleri Örnek Alma İzlem Formu da gönderilmelidir. Erişkinlerde 250 ug cosyntropin (Cortrosyn) i.v. olarak verilir. Cortrosyn verilmeden hemen önce 1 kez, Cortrosyn verildikten sonra 30. ve 60. dakikalarda kan örnekleri alınır. Stimülasyon testi ile; -Kortizol, 0. dakika, -Kortizol, 30. dakika, -Kortizol, 60. Dakika ölçümleri yapılır. Hastalar yüklemeden 24 saat önce glukokortikoid içeren ilaç kullanımını kesmelidir (Hidrokortizon, prednizolon).

C8040005 ACTH Stimülasyon Testi (Kortizol ve 17-Alfa-Hidroksiprogesteron)

Serum	**Jelli Tüp**	4	mL	2-8°C	CLİA, LC-MS/MS	Pzt 08:00 Per 08:00	Sal 18:00 Cum 18:00

Serum: Örnek ile birlikte Fonksiyon Testleri Örnek Alma İzlem Formu da gönderilmelidir. Stimülasyon testi ile;
-Kortizol, 0. dakika,
-Kortizol, 30. dakika,
-Kortizol, 60. dakika,
-17-alfa-hidroksiprogesteron, 0. dakika,
-17-alfa-hidroksiprogesteron, 30. dakika
-17-alfa-hidroksiprogesteron, 60. dakika yapılmaktadır.

C8040006 ACTH Stimülasyon Testi (Kortizol, 17-Alfa-Hidroksiprogesteron ve DHEA-S)

Serum	**Jelli Tüp**	6	mL	2-8°C	CLİA, LC-MS/MS	Pzt 08:00 Per 08:00	Sal 18:00 Cum 18:00

Serum: Hasta örnek vermeden önce en az 8 saat aç olmalıdır.Örnek alınmadan önce hasta 30 dakika istirahat ettirilmelidir. Örnek ile birlikte Fonksiyon Testleri Örnek Alma İzlem Formu da gönderilmelidir. Erişkinlerde 250 ug cosyntropin (Cortrosyn) i.v. olarak verilir. Cortrosyn verilmeden hemen önce 1 kez, Cortrosyn verildikten sonra 30. ve 60. dakikalarda kan örnekleri alınır. Stimülasyon testi ile; -Kortizol, 0. dakika, -Kortizol, 30. dakika, -Kortizol, 60. dakika, -17-alfa-hidroksiprogesteron, 0. dakika, -17-alfa-hidroksiprogesteron, 30. dakika, -17-alfa-hidroksiprogesteron, 60. dakika , -DHEA-S, 0. dakika, -DHEA-S, 30. dakika, -DHEA-S, 60. dakika, ölçümleri yapılır.

C8040003 ACTH Stimülasyon Testi (17-Alfa-Hidroksiprogesteron)

Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Pzt 08:00 Per 08:00	Sal 18:00 Cum 18:00

Serum: Stimülasyon testi ile; 17-alfa-hidroksiprogesteron, 0. dakika, 17-alfa-hidroksiprogesteron, 30. dakika ve 17-alfa-hidroksiprogesteron, 60. dakika ölçümleri yapılmaktadır.

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8779915	**Actinomyces DNA (PCR)**							
	Balgam	**Plastik Kap**	1	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
	Bronkoalveoler Lavaj	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	1	mL	2-8°C	PCR		
	Doku	**Plastik Kap**	1	gr	2-8°C	PCR		
	Genç Bakteri	**Kültür Plağı**	0		2-8°C	PCR		
	Püy (cerahat)	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	1	mL	2-8°C	PCR		
	Transtrakeal Aspirat	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	1	mL	2-8°C	PCR		
	Vaginal Akıntı	**Nucliswab**	0		2-8°C	PCR		
	Vaginal Akıntı: Alınan sürüntü örnekleri nucli swap ile transfer edilmelidir.							
C8499920	**Adalimumab, Serum ²**							
	Serum	**Jelli Tüp**	3	mL	2-8°C	ELİSA	Sal 08:00	2 hafta sonra
	Serum: Kan alındıktan sonra serum en geç 2 saat içinde hücrelerden ayırılmalıdır.							
C8661104	**ADAMTS13 Aktivite**							
	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	**Sitrat-Mavi Kapak**	1	mL	<0°C	EİA	Pzt 08:00 Çar 08:00	Cum 18:00 Pzt 18:00
C8661103	**ADAMTS13 Antijen**							
	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	**Sitrat-Mavi Kapak**	1	mL	<0°C	EİA	Sal 08:00	Cum 18:00
C8661105	**ADAMTS13 İnhibitör**							
	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	**Sitrat-Mavi Kapak**	1	mL	<0°C	EİA	Sal 08:00	Cum 18:00
C8730102	**Adenovirus Antijeni, Gaita**							
	Gaita	**Plastik Kap**	1	gr	2-8°C	İMMUNOKROMATOGRAFİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8730103	**Adenovirus Antijeni, Solunum Yolu Örnekleri**							
	Bronkoalveoler Lavaj	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	1	mL	2-8°C	İMMUNOKROMATOGRAFİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Nazofaringeal Aspirat	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	2	mL	2-8°C	İMMUNOKROMATOGRAFİ		
	Nazofarinks Sürüntüsü	**Dacron/ Rayon Swab**	0		2-8°C	İMMUNOKROMATOGRAFİ		
	Transtrakeal Aspirat	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	1	mL	2-8°C	İMMUNOKROMATOGRAFİ		
	Nazofarinks Sürüntüsü: Swab; örnek alınan kısım dibe gelecek şekilde kuru steril tüp içerisine veya kağıt ambalajın içine konur. Üst kısım kapatılarak laboratuvara gönderilir.							

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8660303	**Adenovirus Antikoru, IgA ³**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	EIA	Cum 08:00	Pzt 18:00
C8660306	**Adenovirus Antikoru, IgM**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	EİA	Cum 08:00	Pzt 18:00
C8779940	**Adenovirus DNA (PCR), Balgam**							
	Balgam	**Plastik Kap**	2	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
C8780167	**Adenovirus DNA (PCR), Biyolojik Sıvı**							
	Biyolojik Sıvı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	2	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
C8660304	**Adenovirus DNA (PCR), BOS**							
	BOS	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	2	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	Sal-Cmt 18:00
C8779941	**Adenovirus DNA (PCR), Bronkoalveolar Lavaj**							
	Bronkoalveoler Lavaj	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	2	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
C8780168	**Adenovirus DNA (PCR), Diğer Örnekler**							
	Diğer	**Laboratuvara danışınız**	0		2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
C8779942	**Adenovirus DNA (PCR), Gaita**							
	Gaita	**Plastik Kap**	1	gr	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
C8779943	**Adenovirus DNA (PCR), İdrar**							
	İdrar	**Steril Tüp**	5	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
C8779944	**Adenovirus DNA (PCR), Nazofarinks Sürüntü**							
	Nazofarinks Sürüntüsü	**Nucliswab**	0		2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
	Nazofarinks Sürüntüsü: Alınan sürüntü örnekleri VTM (Viral transport tüpü) ile transfer edilmelidir.							
C8779945	**Adenovirus DNA (PCR), Plazma**							
	Plazma (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C9519911	**Adenozin Deaminaz (ADA), BOS**							
	BOS	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	1	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Sal 08:00 Cum 08:00	Sal 18:00 Cum 18:00
C9519913	**Adenozin Deaminaz (ADA), Perikard Sıvısı**							
	Perikardiyal Sıvı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	2	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Sal 08:00 Cum 08:00	Sal 18:00 Cum 18:00
C9519915	**Adenozin Deaminaz (ADA), Periton Sıvısı**							
	Periton Sıvısı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	2	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Sal 08:00 Cum 08:00	Sal 18:00 Cum 18:00
C9519912	**Adenozin Deaminaz (ADA), Plevra Sıvısı**							
	Plevra Sıvısı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	2	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Sal 08:00 Cum 08:00	Sal 18:00 Cum 18:00
C9519914	**Adenozin Deaminaz (ADA), Serum**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Sal 08:00 Cum 08:00	Sal 18:00 Cum 18:00
C9519916	**Adenozin Deaminaz (ADA), Sinoviyal Sıvı**							
	Sinoviyal sıvı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	2	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Sal 08:00 Cum 08:00	Sal 18:00 Cum 18:00
C8352018	**Adiponektin ²**							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1	mL	<0°C	ELİSA	Sal 08:00	14 gün sonra
	Serum, Dondurulmuş: Kan örneği aç olarak alınmalıdır. Lipemik örnekler uygun değildir.							
C8625611	**Adrenal Korteks Antikoru ²**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	İFT	Sal 08:00	15 gün sonra

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8460005 **Adrenal Stres Test**								
	Tükürük	**Laboratuvara danışınız**	3	mL	<0°C	ECLIA, LC-MS/MS	Çar 08:00	Per 18:00
	Tükürük: Hastadan 4 adet tükürük örneği alınmalıdır ve saatleri şu şekildedir : Tükürük sabah (07:00-09:00), Tükürük öğlen (11:00-13:00), Tükürük öğleden sonra (16:00-18:00) ve Tükürük gece (22:00-00:00).Örnek alınmadan önce dikkat edilecek hususlar : Numune alınmadan önce dişler fırçalanmamalı, 15 dakika öncesinde yeme, içme bırakılmalıdır.Numune, Salivette (tükürük kortizol tüpüne) alınmalıdır.Tüp kapağı açılarak içindeki rulo pamuk alınır ve ağız içerisine yerleştirilir.Rulo pamuk yaklaşık 2 dakika ağızda tutulur ve yavaşça çiğnenir.Rulo pamuk, tüp içine yavaşça geri yerleştirilir ve kapağı sıkıca kapatılır.Bu aşamalarda rulo pamuğa dokunmamaya özen gösterilmelidir. Tüpün üzerine toplanma tarihi ve saati mutlaka kaydedilir.Örnekler ile birlikte Adrenal Stres Testi Örnek Alım Formu da doldurularak gönderilmelidir.							
C8238403 **Adrenalin (Epinefrin), İdrar (24 saat)**								
	24 Saatlik İdrar, (HCl ile)	**24 Saatlik İdrar Kabı**	10	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Sal 08:00	Çar 18:00
	24 Saatlik İdrar, (HCl ile): 24 saatlik idrar örneği toplanmasında idrar koruyucusu olarak 10 mL, 6 N HCl kullanılmalıdır. Örnek ışıktan korunmalıdır.							
C8238402 **Adrenalin (Epinefrin), Plazma**								
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş	**EDTA-Mor Kapak**	1	mL	<0°C	LC-MS/MS	Sal 08:00 Cum 08:00	Cum 18:00 Sal 18:00
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş: Test için EDTA-plazma örneği gerekmektedir. Hemolizli örnekler kabul edilmez.Örnek alınmadan önce 4 saat birşey yenilmemeli, sigara ve kahve içilmemelidir.Örnek alınmadan önce hasta 30 dakika istirahat ettirilmelidir.Örnek, alındıktan hemen sonra buzlu su içerisinde bekletilmeli ve 30 dakika içerisinde mümkünse soğutuculu santrifüjde plazma ayrılmalı ve hemen dondurulmalıdır.							
C8238409 **Adrenalin/Kreatinin Oranı, İdrar (Spot)**								
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	1	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Sal 08:00	Çar 18:00
C8202401 **Adrenokortikotropik Hormon (ACTH)**								
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş	**EDTA-Mor Kapak**	1	mL	<0°C	CLIA	Pzt 08:00 Çar 08:00	Sal 18:00 Per 18:00
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş: Örnek alım için sabah saat 06:00 - 10:00 arası tercih edilmelidir. Örnek alındıktan hemen sonra buz banyosunda bekletilir. Soğutuculu santrifüjde plazmanın 15 dakika içerisinde ayrılması sağlanır. Soğutuculu santrifüj yoksa örneğin buz banyosunda bekletilerek ayrılması sağlanır.							
C8392107 **Akciğer Aspergillosisi Spesifik IgG Antikoru ²**								
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	RİA	Sal 08:00	1 hafta sonra
	Serum: Test İçeriğinde: -Aspergillus flavus, -Aspergillus fumigatus, -Aspergillus niger, -Aspergillus terreus, yer almaktadır.							
C8530701 **Aktive Protein-C Rezistansı Oranı (n-APC Oranı)**								
	Plazma örneği en az iki ayrı tüpe bölünerek dondurulmalıdır.							
	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	**Sitrat-Mavi Kapak**	0.5	mL	<0°C	KOAGÜLOMETRİ	Pzt 08:00	Çar 18:00

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8818012 **Akut Lösemi Paneli, Kemik İliği**								
Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır. Test içeriğinde; CD10, CD117, CD13, CD19, CD33, CD34, CD4, CD45, CD56, CD7, CD9, HLA-DR+, MPO, Tdt, Sitoplazmik CD3 ve Sitoplazmik CD79a bulunmaktadır.								
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8818011 **Akut Lösemi Paneli, Tam Kan**								
Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır. Test içeriğinde; CD10, CD117, CD13, CD19, CD33, CD34, CD4, CD45, CD56, CD7, CD9, HLA-DR+, MPO, Tdt, Sitoplazmik CD3 ve Sitoplazmik CD79a bulunmaktadır.								
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8818013 **Akut Lösemi Paneli, Vücut Sıvıları**								
Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır. Test içeriğinde; CD10, CD117, CD13, CD19, CD33, CD34, CD4, CD45, CD56, CD7, CD9, HLA-DR+, MPO, Tdt, Sitoplazmik CD3 ve Sitoplazmik CD79a bulunmaktadır.								
	Biyolojik Sıvı	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8818027 **Akut Megakaryoblastik Lösemi Paneli, Kemik İliği**								
Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır. Test içeriğinde; cCD41, cCD61, CD34, CD36, CD41, CD45 ve CD61 bulunmaktadır.								
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8818026 **Akut Megakaryoblastik Lösemi Paneli, Tam Kan**								
Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır. Test içeriğinde; cCD41, cCD61, CD34, CD36, CD41, CD45 ve CD61 bulunmaktadır.								
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8818028 **Akut Megakaryoblastik Lösemi Paneli, Vücut Sıvıları**								
Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır. Test içeriğinde; cCD41, cCD61, CD34, CD36, CD41, CD45 ve CD61 bulunmaktadır.								
	Biyolojik Sıvı	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8446001 **Alanin Aminotransferaz (ALT)**								
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8204001 **Albumin** [1] [3]								
	Serum	**Jelli Tüp**	0.1	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8204201 **Albumin, Biyolojik Sıvı**								
	Biyolojik Sıvı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	0.1	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8204202 **Albumin, BOS**								
	BOS	**BOS Tüpü**	0.5	mL	2-8°C	NEFELOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	BOS: Sanrifüj edilerek hücrelerden ayrılması gerekir.							
C8208501 **Aldolaz**								
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Cum 08:00	Cmt 18:00
C8208801 **Aldosteron**								
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş	**EDTA-Mor Kapak**	1	mL	<0°C	CLIA	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Sal 18:00 Per 18:00 Pzt 18:00
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş: Örnek erişkin hastalardan ayakta veya yatar pozisyonda alınmalıdır. 16 yaşın altındaki hastalarda ayakta pozisyonda örnek alınmaz. Yatarak: hasta yataktan kalkmadan önce alınmalıdır. Ayakta: Hasta yataktan kalktıktan en az 2 saat geçtikten sonra örnek alınmalıdır.							
C8208802 **Aldosteron, İdrar (24 saat)**								
	24 Saatlik İdrar, (Borik asit ile)	**24 Saatlik İdrar Kabı**	5	mL	<0°C	CLIA	Sal 08:00	2 hafta sonra
C8208804 **Aldosteron / Plazma Renin Aktivitesi (PRA) Oranı**								
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	<0°C	CLIA	Sal 12:00	Cum 18:00
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş: Plazma örneği en az iki ayrı tüpe bölünerek dondurulmalıdır.							
C8208803 **Aldosteron / Renin, Direkt Oranı**								
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş	**EDTA-Mor Kapak**	4	mL	<0°C	CLIA	Pzt 08:00 Çar 08:00	Sal 18:00 Per 18:00
C8925630 **Alerjik Hastalıklar Paneli**								
	Panel içeriğinde; IgE, Total, Spesifik IgE- İnek Sütü (Cow's Milk) (f2), Spesifik IgE- Yumurta Akı (Egg White) (f1), Spesifik IgE- Yumurta Sarısı (Egg Yolk) (f75), Spesifik IgE- Dermatophagoides pteronyssinus (d1), Spesifik IgE- Dermatophagoides farinae (d2), Spesifik IgE- Küf Mantarı Karışımı 1 (mx1), Spesifik IgE- Ot karışımı 3 (gx3), Spesifik IgE- Kafes Kuşu Tüy Karışımı (ex72), Spesifik IgE- Kedi Epiteli-Kepeği (e1), Spesifik IgE- Köpek Epiteli (Dog Epithelium) (e2), Spesifik IgE- Ağaç Karışımı (tx7) yer almaktadır.							
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C		Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600099 **ALEX Gıda Allerjenleri (58 parametre)**								
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	EIA	Per 08:00	Pzt 18:00
C8600100 **ALEX Solunum Allerjenleri (58 parametre)**								
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	EIA	Per 08:00	Pzt 18:00

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8019703	**ALEX3, Multiplex Kapsamlı Alerji Paneli (300 Parametre)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	EIA	Cum 08:00	Pzt 18:00
C8210502	**Alfa Fetoprotein (AFP)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.2	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8210601	**Alfa-Fetoprotein (AFP), Amniyotik Sıvı**							
	Amniyotik Sıvı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	1	mL	<0°C	CLIA	Pzt 08:00 Sal 08:00 Çar 08:00 Per 08:00 Cum 08:00	Çar 18:00 Per 18:00 Cum 18:00 Pzt 18:00 Sal 18:00
	Amniyotik Sıvı: "Prenatal tarama testi bilgi formu" eksiksiz doldurulmalı ve hekim tarafından kaşeli/imzalı olarak örnekle beraber gönderilmelidir.							
C8210504	**Alfa-Fetoprotein (AFP), Maternal Serum**							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1	mL	<0°C	CLIA	Pzt 08:00 Sal 08:00 Çar 08:00 Per 08:00 Cum 08:00	Çar 18:00 Per 18:00 Cum 18:00 Pzt 18:00 Sal 18:00
	Serum, Dondurulmuş: "Prenatal tarama testleri bilgi formu doldurulmalıdır." AFP MoM değerinin hesaplanabilmesi için Kilo bilgisi ile birlikte BPD ölçümüne göre gebelik haftası bilgileri belirtilmelidir. Bu test için optimum değerlendirmeler 16-18. gebelik haftaları arasında olmakla birlikte 15-22. haftalar arasındaki tüm gebelerde risk değerlendirmesi yapılmaktadır.							
C8265698	**Alfa-Fukosidaz, Lökosit**							
	Lizozomal Enzim Testleri İstek Formu eksiksiz doldurulmalı ve örnek ile birlikte gönderilmeli.							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	20	mL	2-8°C	FLUOROMETRİ	Pzt 08:00	Cum 18:00
	Tam Kan (EDTA): Numune hafta içi günlerde ve mümkünse kurye/kargo zamanına yakın olarak alınmalıdır. Aşırı hemolizli örnekler kabul edilmez.							
C8265708	**Alfa-Galaktosidaz, Lökosit**							
	Lizozomal Enzim Testleri İstek Formu eksiksiz doldurulmalı ve örnek ile birlikte gönderilmeli.							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	8	mL	2-8°C	FLUOROMETRİ	Pzt 08:00	Cum 18:00
	Tam Kan (EDTA): Numune hafta içi günlerde ve mümkünse kurye/kargo zamanına yakın olarak alınmalıdır. Aşırı hemolizli örnekler kabul edilmez.							
C8265711	**Alfa-Glukosidaz, Lökosit**							
	Lizozomal Enzim Testleri İstek Formu eksiksiz doldurulmalı ve örnek ile birlikte gönderilmeli.							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	8	mL	2-8°C	FLUOROMETRİ	Pzt 08:00	Cum 18:00
	Tam Kan (EDTA): Numune hafta içi günlerde ve mümkünse kurye/kargo zamanına yakın olarak alınmalıdır. Aşırı hemolizli örnekler kabul edilmez.							

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8265697	**Alfa-Iduronidaz, Lökosit**							
	Lizozomal Enzim Testleri İstek Formu eksiksiz doldurulmalı ve örnek ile birlikte gönderilmeli.							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	20	mL	2-8°C	FLUOROMETRİ	Pzt 08:00	Cum 18:00
	Tam Kan (EDTA): Numune hafta içi günlerde ve mümkünse kurye/kargo zamanına yakın olarak alınmalıdır. Aşırı hemolizli örnekler kabul edilmez.							
C8265699	**Alfa-Mannosidaz, Lökosit**							
	Lizozomal Enzim Testleri İstek Formu eksiksiz doldurulmalı ve örnek ile birlikte gönderilmeli.							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	20	mL	2-8°C	FLUOROMETRİ	Pzt 08:00	Cum 18:00
	Tam Kan (EDTA): Numune hafta içi günlerde ve mümkünse kurye/kargo zamanına yakın olarak alınmalıdır. Aşırı hemolizli örnekler kabul edilmez.							
C9519906	**Alfa-Subunit, TSH ²**							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	2	mL	<0°C	İA	Sal 08:00	3 hafta sonra
C8210301	**Alfa-1-Antitripsin**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	NEFELOMETRİ	Çar 08:00	Per 18:00
C8210302	**Alfa-1-Antitripsin, Gaita**							
	Gaita	**Plastik Kap**	5	gr	2-8°C	EIA	Per 08:00	Cum 18:00
C8530003	**Alfa-1-Mikroglobulin ²**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	RİD	Sal 08:00	10 gün sonra
C8530005	**Alfa-1-Mikroglobulin, İdrar (24 saat)**							
	24 Saatlik İdrar	**24 Saatlik İdrar Kabı**	10	mL	2-8°C	RİD	Sal 08:00	10 gün sonra
C8530004	**Alfa-1-Mikroglobulin/Kreatinin Oranı, İdrar (Spot)**							
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	10	mL	2-8°C	RİD	Sal 08:00	10 gün sonra
C8530002	**Alfa-2-Makroglobulin ²**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	NEFELOMETRİ	Sal-Cum 08:00	Çar-Pzt 18:00
C8530000	**Alfa-2-Makroglobulin, İdrar (Spot)**							
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	5	mL	2-8°C	NEFELOMETRİ	Sal-Cum 08:00	Çar-Pzt 18:00

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8532999 **Alfa-2-Makroglobulin, İdrar (24 saat)**								
	24 Saatlik İdrar	**24 Saatlik İdrar Kabı**	5	mL	2-8°C	NEFELOMETRİ	Sal-Cum 08:00	Çar-Pzt 18:00
C8407501 **Alkalen Fosfataz (ALP)**								
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	ENZİMATİK	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Kan alındıktan sonra serum en geç 2 saat içinde hücrelerden ayırılmalıdır.							
C8408001 **Alkalen Fosfataz, İzoenzim Elektroforezi**								
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	ELEKTROFOREZ	Çar 08:00	1 hafta sonra
	Serum: Örnek aç olarak alınmalıdır.							
C8407802 **Alkalen Fosfataz, Kemik İzoenzimi**								
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1	mL	<0°C	CLIA	Cum 08:00	Pzt 18:00
	Serum, Dondurulmuş: Örnek en az 8 saat açlıkta alınmalıdır.Örnek alındıktan sonra serum en kısa sürede ayrılmalıdır.							
C8690604 **Alt kan grup tiplendirmesi (Minör kan grubu)**								
	Bu test içerisinde Lua, Lub, K, k, Kpa, Kpb, Jka, Jkb, M, N, S, s, Fya, Fyb antijenleri tiplendirilmektedir. Test için mutlaka laboratuvara danışınız.							
	Tam Kan (EDTA) (TM)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	JEL SANTRİFÜGASYON	Pzt-Cum 12:00	3 gün sonra
C8210801 **Aluminyum (Al)**								
	Plazma (Heparin)	**Sodyum Heparin-Lacivert Kapak**	3	mL	2-8°C	İCP-MS	Pzt 08:00 Per 08:00	Sal 18:00 Cum 18:00
C8210805 **Aluminyum (Al) / Kreatinin Oranı, İdrar (Spot)**								
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	5	mL	2-8°C	ICP-MS	Pzt 08:00 Per 08:00	Sal 18:00 Cum 18:00
C8210806 **Aluminyum, İdrar (24 saat)**								
	24 Saatlik İdrar	**24 Saatlik İdrar Kabı**	5	mL	2-8°C	İCP-MS	Pzt 08:00 Per 08:00	Sal 18:00 Cum 18:00
	24 Saatlik İdrar: İdrar örneği plastik kaplarda toplanmalı ve plastik kap ya da tüplerde transfer edilmelidir.							
C8684917 **Alzheimer / Demans Biyobelirteç Paneli, BOS (Aß40 / 42, p-Tau217, p-Tau181, GFAP ve NfL)**								
	SR-X Ultra Hassas Biyobelirteç Tespit Sistemi kullanılarak parametreler yüksek duyarlılıkla analiz edilir. Bu panel içerisinde; ABeta 40, ABeta 42, ABeta42/40, pTau-217, pTau-181, NF-Light (Nörofilament Hafif Zincir), GFAP (Glial Fibriler Asidik Protein) bulunmaktadır.							
	BOS, Dondurulmuş	**Polietilen/polipropilen tüp**	1	mL	-80 °C	SIMOA (Single Molecule Array)	Pzt 08:00 Per 08:00	1 hafta sonra

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8684916	**Alzheimer/Demans Biyobelirteç Paneli, Plazma (Aß40/42, p-Tau217, p-Tau181, GFAP ve NfL)**							
	SR-X Ultra Hassas Biyobelirteç Tespit Sistemi kullanılarak parametreler yüksek duyarlılıkla analiz edilir. Test içeriğinde; ABeta 40, ABeta 42, ABeta42/40, pTau-217, pTau-181, GFAP, NF-Light bulunmaktadır.							
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş	**EDTA-Mor Kapak**	4	mL	-80 °C	SIMOA (Single Molecule Array)	Pzt 08:00 Per 08:00	1 hafta sonra
C8215001	**Amilaz** [1] [3]							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	ENZİMATİK	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Kan alındıktan sonra serum en geç 2 saat içinde hücrelerden ayırılmalıdır.							
C8215003	**Amilaz, Biyolojik Sıvı**							
	Biyolojik Sıvı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	0.5	mL	2-8°C	ENZİMATİK	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8215006	**Amilaz, İdrar (24 saat)**							
	24 Saatlik İdrar	**24 Saatlik İdrar Kabı**	1	mL	2-8°C	ENZİMATİK	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	24 Saatlik İdrar: İlk 48 saat içerisinde çalışılmayacak örnekler, NaOH ile alkali hale getirilmelidir (pH>7).							
C8215004	**Amilaz, Pankreatik**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	ENZİMATİK	Pzt-Cum 08:00	Pzt-Cum 18:00
C8215005	**Amilaz/Kreatinin Oranı, İdrar (Spot)**							
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	1	mL	2-8°C	ENZİMATİK	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Spot İdrar: İlk 48 saat içerisinde çalışılmayacak örnekler, NaOH ile alkali hale getirilmelidir (pH>7).							
C8213003	**Aminoasit Profili, BOS**							
	BOS, Dondurulmuş	**BOS Tüpü**	0.5	mL	<0°C	LC-MS/MS	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Çar 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00
	BOS, Dondurulmuş: Profil altında; Taurin, Aspargin, Hidroksiprolin, Threonin, Serin, Aspartik asit, Glutamik asit, Glutamin, Alfa-Amino Adipik asit, Prolin, Glisin, Alanin, Sitrüllin, Alfa-Amino Bütirik asit, Valin, Sistin, Sistatyonin, Metiyonin, İzolösin, Lösin, Tirozin, Fenilalanin, Homosistin, Beta-Alanin, Gama-Amino bütirik asit, Histidin, 3-Metilhistidine, 1-Metilhistidine, Triptofan, Karnozin, Hidroksilizin, Ornitin, Lizin, Etanolamin, Arjinin, yer almaktadır.							
C8213002	**Aminoasit Profili, İdrar (Spot)**							
	Spot İdrar, Dondurulmuş	**Plastik Kap**	2	mL	<0°C	LC-MS/MS	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Çar 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00
	Spot İdrar, Dondurulmuş: Profil altında;Taurin, Aspargin, Hidroksiprolin, Threonin, Serin, Aspartik asit, Glutamik asit, Glutamin, Alfa-Amino Adipik asit, Prolin, Glisin, Alanin, Sitrüllin, Alfa-Amino Bütirik asit, Valin, Sistin, Sistatyonin, Metiyonin, İzolösin, Lösin, Tirozin, Fenilalanin, Homosistin, Beta-Alanin, Gama-Amino bütirik asit, Histidin, 3-Metilhistidine, 1-Metilhistidine, Triptofan, Karnozin, Hidroksilizin, Ornitin, Lizin, Etanolamin, Arjinin, yer almaktadır.							

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8213001 **Aminoasit Profili, Serum**								
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1	mL	<0°C	LC-MS/MS	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Çar 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00
	Serum, Dondurulmuş: Profil altında; Taurin, Aspargin, Hidroksiprolin, Threonin, Serin, Aspartik asit, Glutamik asit, Glutamin, Alfa-Amino Adipik asit, Prolin, Glisin, Alanin, Sitrüllin, Alfa-Amino Bütirik asit, Valin, Sistin, Sistatyonin, Metiyonin, İzolösin, Lösin, Tirozin, Fenilalanin, Homosistin, Beta-Alanin, Gama-Amino bütirik asit, Histidin, 3-Metilhistidine, 1-Metilhistidine, Triptofan, Karnozin, Hidroksilizin, Ornitin, Lizin, Etanolamin, Arjinin, yer almaktadır.							
C8729907 **Amip Antijen, Hızlı Test (E. histolytica)**								
	Gaita	**Plastik Kap**	1	gr	2-8°C	İMMUNOKROMATOGRAFİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Gaita: Testin duyarlılığı ve özgüllüğü %40% ve 100'dür. Negatif test sonucu örnekte E. histolytica adezin bulunma olasılığını dışlamaz; antijen düzeyi analitik duyarlılık düzeyinin (0.2 ng/mL) altında olabilir.							
C8729902 **Amip (Entamoeba histolytica) Antijeni**								
	Gaita	**Plastik Kap**	1	gr	2-8°C	EİA	Pzt-Cum 08:00	Pzt-Cum 18:00
C8818018 **AML- MRD Paneli, Kemik İliği**								
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır.							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8818017 **AML- MRD Paneli, Tam Kan**								
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır.							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8818019 **AML- MRD Paneli, Vücut Sıvıları**								
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır.							
	Biyolojik Sıvı	**EDTA-Mor Kapak**	6	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8818015 **AML Tiplendirme, Kemik İliği**								
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır. Test içeriğinde; CD11b, CD117, CD123 Blast, CD14, CD15, CD235a, CD300e, CD34, CD36, CD38, CD41, CD45, CD56, CD61, CD64 ve CD71 bulunmaktadır.							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8818014	**AML Tiplendirme, Tam Kan**							
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır. Test içeriğinde; CD11b, CD117, CD123 Blast, CD14, CD15, CD235a, CD300e, CD34, CD36, CD38, CD41, CD45, CD56, CD61, CD64 ve CD71 bulunmaktadır.							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8818016	**AML Tiplendirme, Vücut Sıvıları**							
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır. Test içeriğinde; CD11b, CD117, CD123 Blast, CD14, CD15, CD235a, CD300e, CD34, CD36, CD38, CD41, CD45, CD56, CD61, CD64 ve CD71 bulunmaktadır.							
	Biyolojik Sıvı	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8214001	**Amonyak**							
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş	**EDTA-Mor Kapak**	1	mL	<0°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş: Kan alınmadan önce laboratuvar ile temasa geçilmelidir. Kan örneği alınması esnasında zorunlu olmadıkça turnike uygulanmamalıdır. Zorunlu durumlarda turnike uygulanması 1 dakikayı geçmemelidir.Kan alındıktan sonra tüpler soğuk su-buz içeren kaba konulur. Plazma en geç 30 dk içerisinde soğuk ortamda ayrılır ve hemen dondurularak transportu sağlanır. Hemolizli örnek analiz için kullanılmaz.							
C8602106	**ANCA (Antinötrofil Sitoplazmik Antikorlar) Profili**							
	Profil içeriğinde; BPI, Cathepsin-G, Elastase, Lactoferrin, Lysozyme, MPO, PR3 parametreleri yer almaktadır.							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	ELİSA	Çar 08:00	Per 18:00
C8215701	**Androstenedion**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Pzt 08:00 Per 08:00	Sal 18:00 Cum 18:00
	Serum: Örnek menstrüel periyoddan 1 hafta önce ya da sonra alınmalıdır							
C8216402	**Angiotensin Converting Enzyme (ACE), BOS**							
	BOS	**BOS Tüpü**	1	mL	2-8°C	KOLORİMETRİK	Pzt-Cum 08:00	Pzt-Cum 18:00
	BOS: ACE inhibitörü içeren antihipertansif ilaçlar (kaptopril, kapril, lopril gibi) zorunlu durumlar dışında kullanılmamalıdır.							
C8216403	**Angiotensin Converting Enzyme (ACE), Serum**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	KOLORİMETRİK	Pzt-Cum 08:00	Pzt-Cum 18:00
	Serum: ACE inhibitörü içeren antihipertansif ilaçlar (kaptopril, kapril, lopril gibi) zorunlu durumlar dışında kullanılmamalıdır. Hemolizli örnek kabul edilmez.							
C8699913	**Anti A1 Lektin**							
	"Kan grubu (ABO) + Reverse Gruplama" testi ile birlikte çalışılır.							
	Tam Kan (EDTA) (TM)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	JEL SANTRİFÜGASYON	Pzt-Cum 12:00	1 gün sonra

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8818061	**Anti CD20 Tedavi Takibi, Kemik İliği**							
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Test içeriğinde; CD19, CD20, CD21, CD24, CD27, CD38, CD45, Lenfosit sayısı(#), Lenfosit (%) ve Lökosit sayısı bulunmaktadır.							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8818060	**Anti CD20 Tedavi Takibi, Tam Kan**							
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Test içeriğinde; CD19, CD20, CD21, CD24, CD27, CD38, CD45, Lenfosit sayısı(#), Lenfosit (%) ve Lökosit sayısı bulunmaktadır.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8818062	**Anti CD20 Tedavi Takibi, Vücut Sıvıları**							
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Test içeriğinde; CD19, CD20, CD21, CD24, CD27, CD38, CD45, Lenfosit sayısı(#), Lenfosit (%) ve Lökosit sayısı bulunmaktadır.							
	Biyolojik Sıvı	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8634101	**Anti-Adacık Hücre Antikoru (ICA)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	İFT	Pzt 08:00 Çar 08:00	Çar 18:00 Cum 18:00
C8499922	**Anti-Adalimumab Antikoru ²**							
	Serum	**Jelli Tüp**	3	mL	2-8°C	ELİSA	Sal 08:00	2 hafta sonra
C8660201	**Anti-Aktin Antikoru ³**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	İFT	Sal 08:00	1 hafta sonra
C8351609	**Anti-Bazal Membran Antikor, Epidermal**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	İFT	Sal 08:00 Cum 08:00	Çar 18:00 Pzt 18:00
C8351610	**Anti-Bazal Membran Antikor, Tubular ²**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	İFT	Sal 08:00	1 hafta sonra
C8614603	**Anti-Beta-2 Glikoprotein 1 Antikoru, IgA**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	ELİSA	Sal 08:00 Per 08:00	Çar 18:00 Cum 18:00

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8614601	**Anti-Beta-2 Glikoprotein 1 Antikoru, IgG**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	EİA	Sal 08:00 Per 08:00	Çar 18:00 Cum 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8614602	**Anti-Beta-2 Glikoprotein 1 Antikoru, IgM**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	EİA	Sal 08:00 Per 08:00	Çar 18:00 Cum 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8719906	**Antibiyotik Duyarlılık Testi**							
	Bakteri identifikasyon testi ile birlikte çalışılmalıdır.							
	Genç Bakteri Kökeni	**Kültür Plağı**	0		18-24°C	MİKRODİLÜSYON	Pzt-Cmt 08:00	2 gün sonra 17:00
C8352040	**Anti-Büllöz Pemfigoid BP180 Antikoru**							
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	EİA	Sal 08:00	Çar 18:00
C8352041	**Anti-Büllöz Pemfigoid BP230 Antikoru**							
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	EİA	Sal 08:00	Çar 18:00
C8602103	**Anti-c-ANCA (Anti-Proteinaz-III (PR3) Antikoru**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	EİA	Pzt 08:00 Çar 08:00	Sal 18:00 Per 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8925663	**Anti-C1q Antikoru**							
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	ELISA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8634102	**Anti-Çinko Transporter 8 Antikoru (ZnT8) ²**							
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	ELİSA	Sal 08:00	2 hafta sonra
	Serum: Hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8688601	**Anti-D Titrasyonu**							
	Antikor tanımlama sonucu anti-D ile uyumlu olmalıdır. Anlaşmalı kurumlardan gelen örnekler için "İmmünohematoloji Testleri Bilgi Formu" eksiksiz doldurulmalı ve hekim tarafından kaşeli/imzalı olarak örnek ile beraber gönderilmelidir.							
	Serum ve EDTA Tam Kan	**Jelli Tüp + EDTA**	10	mL	2-8°C	JEL SANTRİFÜGASYON	Pzt 12:00 Çrş 12:00	Sal 18:00 Per 18:00

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8621501	**Anti-Deoksiribonükleaz Antikor (Anti-DNAse B)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	NEFELOMETRİ	Cum 09:00	Cum 18:00
C8614604	**Anti-Desmoglein 1 Antikoru, IgG**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	ELİSA	Cum 08:00	Pzt 18:00
C8614606	**Anti-Desmoglein 3 Antikoru, IgG**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	ELİSA	Cum 08:00	Pzt 18:00
C8458801	**Antidiüretik Hormon (ADH)**							
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	<0°C	RİA	Cum 08:00	Per 18:00
C8625616	**Anti-Doku Transglutaminaz Antikoru, IgA**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	EİA	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Sal 18:00 Per 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8625615	**Anti-Doku Transglutaminaz Antikoru, IgG**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	EİA	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Sal 18:00 Per 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8622502	**Anti-ds DNA, EIA**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	ELİSA	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Sal 18:00 Per 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8622501	**Anti-ds DNA, IFT**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	İFT	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Sal 18:00 Per 18:00 Pzt 18:00

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8625504	**Anti-Düz Kas Antikoru (ASMA)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	İFT	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Sal 18:00 Per 18:00 Pzt 18:00
C8623509	**Anti-ENA Histon Antikoru** [1] [3]							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	İMMUNOBLOTTİNG	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Pzt 18:00 Sal 18:00
	Serum: Analiz; hemoliz, ikter ve lipemiden etkilenmektedir.							
C8623506	**Anti-ENA J0-1 Antikoru**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	İMMUNOBLOTTİNG	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Pzt 18:00 Sal 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8623514	**Anti-ENA Ku Antikoru**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	İMMUNOBLOTTİNG	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Pzt 18:00 Sal 18:00
	Serum: Analiz; hemoliz, ikter ve lipemiden etkilenmektedir.							
C8351614	**Anti-ENA Mi-2 Antikoru**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	İMMUNOBLOTTİNG	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Pzt 18:00 Sal 18:00
	Serum: Analiz; hemoliz, ikter ve lipemiden etkilenmektedir.							
C8623510	**Anti-ENA Nukleozom Antikoru**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	İMMUNOBLOTTİNG	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Pzt 18:00 Sal 18:00
	Serum: Analiz; hemoliz, ikter ve lipemiden etkilenmektedir.							
C8623512	**Anti-ENA PM/Scl Antikoru**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	İMMUNOBLOTTİNG	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Pzt 18:00 Sal 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR	TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8351608	**Anti-ENA Ribozomal P Protein Antikoru**						
	Serum	**Jelli Tüp**	1 mL	2-8°C	İMMUNOBLOTTİNG	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Pzt 18:00 Sal 18:00
C8623504	**Anti-ENA RNP/Sm Antikoru**						
	Serum	**Jelli Tüp**	1 mL	2-8°C	İMMUNOBLOTTİNG	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Pzt 18:00 Sal 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.						
C8623511	**Anti-ENA Ro-52 Antikoru**						
	Serum	**Jelli Tüp**	1 mL	2-8°C	İMMUNOBLOTTİNG	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Pzt 18:00 Sal 18:00
	Serum: Analiz; hemoliz, ikter ve lipemiden etkilenmektedir.						
C8623505	**Anti-ENA ScL70 Antikoru**						
	Serum	**Jelli Tüp**	1 mL	2-8°C	İMMUNOBLOTTİNG	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Pzt 18:00 Sal 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.						
C8623507	**Anti-ENA Sentromer (CENP B) Antikoru**						
	Serum	**Jelli Tüp**	1 mL	2-8°C	İMMUNOBLOTTİNG	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Pzt 18:00 Sal 18:00
C8623503	**Anti-ENA Sm Antikoru**						
	Serum	**Jelli Tüp**	1 mL	2-8°C	İMMUNOBLOTTİNG	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Pzt 18:00 Sal 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.						
C8623501	**Anti-ENA SsA (Ro) Antikoru**						
	Serum	**Jelli Tüp**	1 mL	2-8°C	İMMUNOBLOTTİNG	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Pzt 18:00 Sal 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.						

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8623502	**Anti-ENA SsB (La) Antikoru**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	İMMUNOBLOTTİNG	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Pzt 18:00 Sal 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8625604	**Anti-Endomisyum Antikoru (EMA) IgA**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	İFT	Sal 08:00 Cum 08:00	Çar 18:00 Pzt 18:00
C8625605	**Anti-Endomisyum Antikoru (EMA) IgG**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	İFT	Sal 08:00 Cum 08:00	Çar 18:00 Pzt 18:00
C8552001	**Anti-Faktör Xa Aktivitesi (HMW/LMW-heparin)**							
	LMW-Heparin enjeksiyonundan sonra 4. saatte kan örneği alınmalıdır. Plazma örneği en az iki ayrı tüpe bölünerek dondurulmalıdır.							
	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	**Sitrat-Mavi Kapak**	0.5	mL	<0°C	KROMOJENİK	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8614804	**Anti-Fosfatidilserin Antikoru, IgG**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	EİA	Pzt 08:00	Çar 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8614803	**Anti-Fosfatidilserin Antikoru, IgM**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	EİA	Pzt 08:00	Çar 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8676506	**Antifosfolipid Antikor Sendromu Paneli**							
	Test içeriğinde; Lupus Antikoagulanı (LA), Anti-Kardiyolipin IgG Antikoru (ACA IgG), Anti-Kardiyolipin IgM Antikoru (ACA IgM), Anti-Beta-2 Glikoprotein 1 antikoru, IgG ve Anti-Beta-2 Glikoprotein 1 antikoru, IgM yer almaktadır.Test panelinde tanımlı tüm örnek türleri gereklidir.							
	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	**Sitrat-Mavi Kapak**	1	mL	<0°C		Pzt 08:00	Çar 18:00
	Serum	**Jelli Tüp**	3	mL	2-8°C			
C8614806	**Anti-Fosfolipid Antikoru, IgG**							
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	EİA	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Sal 18:00 Per 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8614805	**Anti-Fosfolipid Antikoru, IgM**							
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	EİA	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Sal 18:00 Per 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8719902	**Antifungal Duyarlılık, Otomatize**							
	Fungal identifikasyon testi ile birlikte çalışılır.							
	Genç Mantar Kökeni	**Kültür Plağı**	0		18-24°C	MİKRODİLÜSYON	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra 18:00
C8625602	**Anti-Gliadin Antikoru IgA (Deamine)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	EİA	Pzt 08:00 Per 08:00	Sal 18:00 Cum 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8625603	**Anti-Gliadin Antikoru IgG (Deamine)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	EİA	Pzt 08:00 Per 08:00	Sal 18:00 Cum 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8625606	**Anti-Glutamik Asit Dekarboksilaz Antikoru**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	EİA	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Sal 18:00 Per 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8699914	**Anti-H Lektin**							
	"Kan grubu (ABO) + Reverse Gruplama" testi ile birlikte çalışılır.							
	Tam Kan (EDTA) (TM)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	JEL SANTRİFÜGASYON	Pzt-Cum 12:00	1 gün sonra
C8818081	**Anti-HMGCR Antikoru ²**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	NÖTRALİZASYON	Sal 08:00 Çar 08:00 Per 08:00	1 hafta sonra
C8499923	**Anti-İnfliximab Antikoru ²**							
	Serum	**Jelli Tüp**	3	mL	2-8°C	Floresans İmmunoassay(FIA)	Sal 08:00	2 hafta sonra
C8625617	**Anti-Karbonik Anhidraz Antikoru ²**							
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	İFT	Sal 08:00	1 hafta sonra

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8614702	**Anti-Kardiyolipin IgG Antikoru (ACA IgG)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	EİA	Sal 08:00 Per 08:00	Çar 18:00 Cum 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8614701	**Anti-Kardiyolipin IgM Antikoru (ACA IgM)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	EİA	Sal 08:00 Per 08:00	Çar 18:00 Cum 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8687001	**Antikor Tanımlama**							
	Antikor tarama testi pozitif olmalıdır. Anlaşmalı kurumlardan gelen örnekler için "İmmünohematoloji Testleri Bilgi Formu" eksiksiz doldurulmalı ve hekim tarafından kaşeli/imzalı olarak örnek ile beraber gönderilmelidir.							
	Serum ve EDTA Tam Kan	**Jelli Tüp + EDTA**	10	mL	2-8°C	JEL SANTRİFÜGASYON	Pzt 08:00 Çar 08:00	Sal 18:00 Per 18:00
C8637602	**Anti-Liver Kidney Mikrozomal Antikor (anti-LKM)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	İFT	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Sal 18:00 Per 18:00 Pzt 18:00
C8625501	**Anti-Mitokondri Antikoru (AMA)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	İFT	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Sal 18:00 Per 18:00 Pzt 18:00
C8625505	**Anti-Mitokondri Antikoru (AMA) Subgrupları**							
	Bu test altında; -Mitokondri Antikoru (AMA), -M2, -M4, -M9 yer almaktadır.							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	İMMUNOBLOTTİNG	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Sal 18:00 Per 18:00 Pzt 18:00
C8387302	**Anti-MOG (Miyelin Oligodendrosit Glikoprotein)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	IFA	Sal 08:00	Çar 18:00
C8684923	**Anti-MOG (Miyelin oligodendrosit glikoprotein), BOS**							
	BOS	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	0.5	mL	2-8°C	IFA	Sal 08:00	Çar 18:00

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8301828 **Antimon, İdrar (24 saat)**								
	24 Saatlik İdrar	**24 Saatlik İdrar Kabı**	5	mL	2-8°C	İCP-MS	Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00
C8301813 **Antimon (Sb)**								
	Plazma (Heparin)	**Sodyum Heparin-Lacivert Kapak**	2	mL	2-8°C	İCP-MS	Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00
C8301812 **Antimon (Sb), Tam Kan**								
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	İCP-MS	Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00
C8301829 **Antimon (Sb)/Kreatinin Oranı, İdrar (Spot)**								
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	5	mL	2-8°C	ICP-MS	Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00
C8352020 **Anti-Mullerian Hormon (AMH/MIS)**								
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	ECLİA	Pzt-Cum 12:00	Pzt-Cum 18:00
	Serum: Örnekler 2 saat içerisinde santrifüjle ayrılmalıdır. Bu test için örnek stabilitesi 2-8 C de 3 gündür. 3 gün içerisinde çalışılmayacak örneklerin dondurulması gerekmektedir.							
C8351607 **Anti-MuSK Antikor (Anti Muscle Spesifik Kinase) ³**								
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	ELİSA	Sal 08:00	Çar 18:00
C8625626 **Anti-NMO-IgG Antikoru (Anti-Aquaporin 4 Antikoru), BOS (IFA)**								
	BOS	**BOS Tüpü**	1	mL	2-8°C	İFT	Sal 08:00	Çar 18:00
C8602101 **Anti-Nötrofil Sitoplazmik Antikor (ANCA)**								
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	İFT	Çar 08:00	Cum 18:00
C8603801 **Antinükleer Antikor (ANA)**								
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	İFT	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Çar 18:00 Cum 18:00 Pzt 18:00

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8602102	**Anti-p-ANCA (Miyeloperoksidaz (MPO)) Antikoru**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	EİA	Pzt 08:00 Çar 08:00	Sal 18:00 Per 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8625503	**Anti-Parietal Hücre Antikoru [1] [3]**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	İFT	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Sal 18:00 Per 18:00 Pzt 18:00
C8667105	**Anti-Saccharomyces cerevisiae Antikoru (ASCA), IgA**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8667106	**Anti-Saccharomyces cerevisiae Antikoru (ASCA), IgG**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8606001	**Antistreptolizin O (ASO) [1] [3]**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 14:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Kan alındıktan sonra serum en geç 2 saat içinde hücrelerden ayırılmalıdır.							
C8614610	**Anti-Strongyloides stercoralis Antikoru, IgG [2]**							
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	EİA	Sal 08:00	2 hafta sonra
C8351612	**Anti-Tirozin Fosfataz (IA2) Antikoru [2] [3]**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	RİA	Pzt 08:00	2 hafta sonra Çar 18:00
	Serum: Hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8530101	**Antitrombin III**							
	Plazma örneği en az iki ayrı tüpe bölünerek dondurulmalıdır. Hemolizli, lipemik, ikterik ve fibrin içeren numuneler analiz için kullanılmaz.							
	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	**Sitrat-Mavi Kapak**	0.5	mL	<0°C	KROMOJENİK	Sal 08:00 Per 08:00	Per 18:00 Pzt 18:00

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8530102	**Antitrombin III Antijen**							
	Plazma örneği en az iki ayrı tüpe bölünerek dondurulmalıdır. Hemolizli, lipemik, ikterik ve fibrin içeren numuneler analiz için kullanılmaz.							
	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	**Sitrat-Mavi Kapak**	1	mL	<0°C	NEFELOMETRİ	Cum 08:00	Sal 18:00
	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş: Belirgin hemolizli, lipemik, ikterik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8217201	**Apolipoprotein A1** [1] [3]							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	TÜRBİDİMETRİ	Sal 08:00 Per 08:00	Çar 18:00 Cum 18:00
	Serum: Örnek en az 8 saat açlıkta alınmalıdır. Kan alındıktan sonra serum en geç 2 saat içinde hücrelerden ayırılmalıdır.							
C8217204	**Apolipoprotein A2** [3]							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	NEFELOMETRİ	Sal 08:00 Per 08:00	Çar 18:00 Cum 18:00
C8217202	**Apolipoprotein B**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	TÜRBİDİMETRİ	Sal 08:00 Per 08:00	Çar 18:00 Cum 18:00
	Serum: Örnek en az 8 saat açlıkta alınmalıdır. Kan alındıktan sonra serum en geç 2 saat içinde hücrelerden ayırılmalıdır.							
C8217205	**Apolipoprotein E** [2]							
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	NEFELOMETRİ	Sal 08:00	1 hafta sonra
C8573001	**aPTT**							
	Plazma (Sitrat)	**Sitrat-Mavi Kapak**	1	mL	2-8°C	KOAGÜLOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8573002	**aPTT Karışım Testi**							
	Plazma örneği en az iki ayrı tüpe bölünerek dondurulmalıdır.							
	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	**Sitrat-Mavi Kapak**	5	mL	<0°C	KOAGÜLOMETRİ	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8272602	**Araşidonik Asit** [2]							
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	GC-MS	Sal 08:00	1 hafta sonra

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8749107	**ARB incelenmesi ve Tüberküloz Kültürü [1] [3]**							
	Swab ile alınan sürüntü örnekleri uygun değildir.							
	Açlık Mide Sıvısı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	5	mL	2-8°C	MİKROSKOPİ/ KÜLTÜR	Pzt-Cum 12:00	54 gün sonra 18:00
	Balgam	**Plastik Kap**	5	mL	2-8°C	MİKROSKOPİ/ KÜLTÜR		
	Biyolojik Sıvı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	5	mL	2-8°C	MİKROSKOPİ/ KÜLTÜR		
	Biyopsi Materyali	**Plastik Kap**	0		2-8°C	MİKROSKOPİ/ KÜLTÜR		
	BOS	**BOS Tüpü**	5	mL	2-8°C	MİKROSKOPİ/ KÜLTÜR		
	Bronkoalveoler Lavaj	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	5	mL	2-8°C	MİKROSKOPİ/ KÜLTÜR		
	Diğer	**Plastik Kap**	0		2-8°C	MİKROSKOPİ/ KÜLTÜR		
	Doku	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	0		2-8°C	MİKROSKOPİ/ KÜLTÜR		
	Eklem Sıvısı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	5	mL	2-8°C	MİKROSKOPİ/ KÜLTÜR		
	Perikardiyal Sıvı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	5	mL	2-8°C	MİKROSKOPİ/ KÜLTÜR		
	Periton Sıvısı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	5	mL	2-8°C	MİKROSKOPİ/ KÜLTÜR		
	Plevra Sıvısı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	5	mL	2-8°C	MİKROSKOPİ/ KÜLTÜR		
	Sabah 1. İdrar	**Plastik Kap**	50	mL	2-8°C	MİKROSKOPİ/ KÜLTÜR		
	Transtrakeal Aspirat	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	5	mL	2-8°C	MİKROSKOPİ/ KÜLTÜR		
	Balgam: Balgam örneği sabah alınan ilk balgam örneği olmalıdır. Öksürük ile derinden gelen balgam, ağızda bekletilmeden geniş ağızlı örnek kabına alınır. Alınan örnek laboratuvara hemen ulaştırılmalı, bu mümkün değilse 2-8°C'de bekletilmelidir. Belirgin olarak tükürükten ibaret görülen örnekler çalışmaya alınmaz. Örnek alımından önce ağızın su ile çalkalanması testi etkilemesi nedeniyle uygun değildir.							
C8265704	**Arilsülfataz A, Lökosit**							
	Lizozomal Enzim Testleri İstek Formu eksiksiz doldurulmalı ve örnek ile birlikte gönderilmeli.							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	10	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt 08:00	Cum 18:00
	Tam Kan (EDTA): Numune hafta içi günlerde ve mümkünse kurye/kargo zamanına yakın olarak alınmalıdır. Aşırı hemolizli örnekler kabul edilmez.							
C8217501	**Arsenik (As) [1] [3]**							
	Tam Kan (Heparin)	**Sodyum Heparin-Lacivert Kapak**	5	mL	2-8°C	İCP-MS	Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00
C8217504	**Arsenik (As) / Kreatinin Oranı, İdrar (Spot)**							
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	5	mL	2-8°C	ICP-MS	Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8217505	**Arsenik, İdrar (24 saat)** [1] [3]							
	24 Saatlik İdrar	**24 Saatlik İdrar Kabı**	5	mL	2-8°C	İCP-MS	Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00
C8684909	**Ascaris lumbricoides Antikoru** [3]							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	<0°C	ELİSA	Sal 08:00	2 hafta sonra
C8200301	**Asetaminofen (Parasetamol)**							
	Serum	**Jelsiz Tüp**	0.3	mL	2-8°C	TÜRBİDİMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Kan örneği, separatör jel içermeyen tüplere alınmalıdır.Heparin plazma da kullanılabilir.Hemolizli örnekler kabul edilmez.							
C8625610	**Asetilkolin Reseptör Antikoru**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	RİA	Cum 08:00	Çar 18:00
C8200903	**Aseton, Kantitatif**							
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	1	mL	2-8°C	GC-FİD	Pzt-Cum 08:00	8 gün sonra
C8406001	**Asit Fosfataz**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	ENZİMATİK	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Örnek oda sıcaklığında tamamen pıhtılaştıktan sonra santrifüj edilmelidir.							
C8406601	**Asit Fosfataz, Prostatik**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	ENZİMATİK	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8445001	**Aspartat Aminotransferaz (AST)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Kan alındıktan sonra serum en geç 2 saat içinde hücrelerden ayırılmalıdır.							
C8779946	**Aspergillus DNA (PCR), Balgam**							
	Balgam	**Plastik Kap**	2	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum	3 gün sonra
C8779947	**Aspergillus DNA (PCR), Biyopsi Materyali**							
	Biyopsi Materyali	**Plastik Kap**	0		2-8°C	PCR	Pzt-Cum	3 gün sonra

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8661117	**Aspergillus DNA (PCR), BOS**							
	BOS	**BOS Tüpü**	1	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum	3 gün sonra
C8779948	**Aspergillus DNA (PCR), Bronkoalveoler Lavaj**							
	Bronkoalveoler Lavaj	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	5	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum	3 gün sonra
	Bronkoalveoler Lavaj: Bronkoalveolar Lavaj örnek miktarı 5 ml'den az olmamalıdır.							
C8779949	**Aspergillus DNA (PCR), Doku**							
	Doku	**Plastik Kap**	1	gr	2-8°C	PCR	Pzt-Cum	3 gün sonra
C8779950	**Aspergillus DNA (PCR), Püy**							
	Püy (cerahat)	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	2	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum	3 gün sonra
C8925691	**Aspergillus DNA (PCR), Serum**							
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	REAL TIME PCR	Pzt-Cum 08:00	3 gün sonra 18:00
C8779951	**Aspergillus DNA (PCR), Tam Kan**							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum	3 gün sonra
C8660601	**Aspergillus fumigatus Antikoru ³**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	EIA	Cum 08:00	Pzt 18:00
C8744901	**Aspergillus Galaktomannan Antijeni**							
	Bronkoalveoler Lavaj	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	1	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
	Plazma (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	1	mL	2-8°C	CLIA		
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	CLIA		
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8749103	**Atipik Pnömoni Paneli (PCR)**							
	Bu panel içerisinde; Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila testleri çalışılmaktadır. Stabilite: Alınmış örnekler 4 gün 2-8°C' de saklanabilir. Örnekler daha uzun süre saklanmak istenirse -20°C' de saklanmalıdır.							
	Balgam	**Plastik Kap**	2	mL	2-8°C	MULTİPLEX PCR	Pzt 08:00 Per 08:00	Sal 18:00 Cum 18:00
	Bronkoalveoler Lavaj	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	2	mL	2-8°C	MULTİPLEX PCR		
	Transtrakeal Aspirat	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	2	mL	2-8°C	MULTİPLEX PCR		

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8252501 **Bakır (Cu) [1] [3]**								
	Plazma (Heparin)	**Sodyum Heparin-Lacivert Kapak**	2	mL	2-8°C	AAS	Sal 08:00 Per 08:00	Çar 18:00 Cum 18:00
C8252503 **Bakır (Cu), Doku [2]**								
	Doku	**Laboratuvara danışınız**	0.25	gr	<0°C	ICP-MS	Sal 08:00	2 hafta sonra
	Doku: Doku örneği yaklaşık 1-2 cm uzunluğunda (en az 200-250 mg) olmalı ve hemen dondurulmalıdır. Dondurma işlemi herhangi bir sıvı içerisinde olmamalıdır.							
C8252504 **Bakır (Cu), Eritrosit**								
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	İCP-MS	Sal 08:00 Cum 08:00	Cum 18:00 Pzt 18:00
	Tam Kan (EDTA): Test için EDTA-Tam kan gerekmektedir.							
C8252506 **Bakır (Cu), İdrar (24 saat)**								
	24 Saatlik İdrar, (HCl ile)	**24 Saatlik İdrar Kabı**	10	mL	2-8°C	AAS	Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00
C8252505 **Bakır (Cu)/Kreatinin Oranı, İdrar (Spot)**								
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	10	mL	2-8°C	AAS	Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00
C8707701 **Bakteri İdentifikasyonu, Otomatize**								
	İdentifiye edilecek bakterinin saf kültürü yapılarak transfer edilmelidir (24 saatlik). Karışık kültürler çalışmaya alınmaz.							
	Genç Bakteri Kökeni	**Kültür Plağı**	0		18-24°C	K/T	Pzt-Cmt 08:00	3 gün sonra 17:00
C8706002 **Balgam Kültürü**								
	Balgam	**Plastik Kap**	5	mL	2-8°C	K/T/D	Pzt-Cmt 12:00	3 gün sonra 17:00
	Balgam: Örnek alınmadan önce ağız ve dişler su ile gargara yapılarak çalkalanmalıdır.5-10 ml balgam örneği steril, sızdırmayan bir kap içerisine alınır.Hasta derin bir şekilde öksürtüldükten sonra alınan örnekler daha değerlidir.Balgam verilmesinin zor olduğu durumlarda balgam oluşumu ekspektoran bir ilaç ile sağlanabilir.Uygun olmayan örnekler Belirgin olarak tükrükten ibaret olan örnekler çalışmaya alınmaz.Kültür örneği antibiyotik kullanımından önce alınmalıdır.							
C8818033 **B-ALL MRD Paneli, Kemik İliği**								
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır.							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8818032	**B-ALL MRD Paneli, Tam Kan**							
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır.							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8818034	**B-ALL MRD Paneli, Vücut Sıvıları**							
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır.							
	Biyolojik Sıvı	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8818030	**B-ALL Tiplendirme, Kemik İliği**							
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır. Test içeriğinde; CD10, CD123, CD19, CD20, CD22, CD304, CD34, CD38, CD45, CD58, CD66c, CD73 ve CD81 bulunmaktadır.							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8818029	**B-ALL Tiplendirme, Tam Kan**							
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır. Test içeriğinde; CD10, CD123, CD19, CD20, CD22, CD304, CD34, CD38, CD45, CD58, CD66c, CD73 ve CD81 bulunmaktadır.							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8818031	**B-ALL Tiplendirme, Vücut Sıvıları**							
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır. Test içeriğinde; CD10, CD123, CD19, CD20, CD22, CD304, CD34, CD38, CD45, CD58, CD66c, CD73 ve CD81 bulunmaktadır.							
	Biyolojik Sıvı	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8660908	**Bartonella henselae Antikoru, IgG ²**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8660909	**Bartonella henselae Antikoru, IgM**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8661102	**Bartonella quintana Antikoru, IgG**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	İFT	Sal 08:00	2 hafta sonra

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8666810 **Bcl-2 Paneli**								
Test içeriğinde; BCL2, CD10, CD19, CD20, CD34 ve CD45 bulunmaktadır.								
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cum 08:00	4 gün
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ		
C8415505 **Bence-Jones Proteini, Kalitatif**								
Pozitif sonuçların "İmmunfiksasyon Elektroforezi (IFE), İdrar, Kantitatif" testi ile doğrulanması önerilir.								
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	10	mL	2-8°C	MANUEL	Sal 08:00 Çar 08:00 Per 08:00	1 hafta sonra 18:00
C8460002 **Benzen (Benzol)**								
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	4	mL	2-8°C	GC-MS	Sal 08:00	1 hafta sonra
Tam Kan (EDTA): Oda sıcaklığında taşınan örnek reddedilir.								
C8732706 **Benzen, İdrar (Spot)**								
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	5	mL	2-8°C	GC-FİD	Çar 08:00	10 gün sonra
C8301843 **Berilyum, İdrar (Spot)**								
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	5	mL	2-8°C	İCP-MS	Per 08:00	10 gün sonra
C8252304 **Beta-Crosslaps (Beta-CTx)**								
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1	mL	<0°C	ECLİA	Çar 08:00	Per 18:00
Serum, Dondurulmuş: Örnek en az 8 saat açlıkta ve sabah saat 10:00' dan önce alınmalıdır.Kan alındıktan sonra serum en geç 2 saat içinde hücrelerden ayırılmalıdır.								
C8265703 **Beta-Galaktosidaz, Lökosit**								
Lizozomal Enzim Testleri İstek Formu eksiksiz doldurulmalı ve örnek ile birlikte gönderilmeli.								
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	20	mL	2-8°C	FLUOROMETRİ	Pzt 08:00	Cum 18:00
Tam Kan (EDTA): Numune hafta içi günlerde ve mümkünse kurye/kargo zamanına yakın olarak alınmalıdır. Aşırı hemolizli örnekler kabul edilmez.								
C8296302 **Beta-Glukosidaz, Lökosit**								
Lizozomal Enzim Testleri İstek Formu eksiksiz doldurulmalı ve örnek ile birlikte gönderilmeli.								
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	8	mL	2-8°C	FLUOROMETRİ	Pzt 08:00	Cum 18:00
Tam Kan (EDTA): Numune hafta içi günlerde ve mümkünse kurye/kargo zamanına yakın olarak alınmalıdır. Aşırı hemolizli örnekler kabul edilmez.								
C8470201 **Beta-hCG (İnsan Koryonik Gonadotropin)**								
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8308001	**Beta-Heksozaminidaz A**							
	Lizozomal Enzim Testleri İstek Formu eksiksiz doldurulmalı ve örnek ile birlikte gönderilmeli.							
	Plazma (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	1	mL	2-8°C	FLUOROMETRİ	Pzt 08:00	Cum 18:00
C8238001	**Beta-Karoten** [2]							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Sal 08:00	1 hafta sonra
	Serum: Örnek ortalama 10-12 saatlik açlıkta alınmalı ve ışıktan korunmalıdır.							
C8265701	**Beta-N-Asetil-Glukozaminidaz (NAG)** [2]							
	İdrar, Dondurulmuş	**Plastik Kap**	5	mL	<0°C	ENZİMATİK/KOLORİMETRİ	Sal 08:00	2 hafta sonra
C8415510	**Beta-Trace Protein**							
	Biyolojik Sıvı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	0.5	mL	2-8°C	NEFELOMETRİ	Pzt-Cum 08:00	Pzt-Cum 18:00
C8223203	**Beta-2-Mikroglobulin, İdrar (Spot)**							
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	5	mL	2-8°C	NEFELOMETRİ	Cum 08:00	Pzt 18:00
C8223204	**Beta-2-Mikroglobulin, İdrar (24 saat)**							
	24 Saatlik İdrar	**24 Saatlik İdrar Kabı**	10	mL	2-8°C	NEFELOMETRİ	Cum 08:00	Pzt 18:00
C8223201	**Beta-2-Mikroglobulin, Serum**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	NEFELOMETRİ	Cum 08:00	Pzt 18:00
	Serum: Örnek oda sıcaklığında tamamen pıhtılaştıktan sonra santrifüj edilmelidir.							
C8237401	**Bikarbonat**							
	Serum	**Jelli Tüp (Bikarbonat)**	0.5	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Kan örneğinin jelli tüp içerisine alınması, en geç 2 saat içinde santrifüj edilmesi ve santrifüj işleminden sonra tüp kapağının açılmadan transfer edilmesi önerilir.							
C8225001	**Bilirubin, Direkt** [1] [3]							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Örnek ışıktan korunmalıdır.Kan alındıktan sonra serum en geç 2 saat içinde hücrelerden ayırılmalıdır.							
C8225101	**Bilirubin, Total**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.1	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8459101	**Biotin (Vitamin H)**							
	Serum, Dondurulmuş	**Trombin-Turuncu Kapak**	0.5	mL	<0°C	LC-MS/MS	Cum 08:00	Pzt 18:00
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	0.5	mL	<0°C	LC-MS/MS		
	Serum, Dondurulmuş: Örnek ışıktan korunmalıdır.							
C8459103	**Biotin (Vitamin H), İdrar**							
	İdrar, Dondurulmuş	**Plastik Kap**	1	mL	<0°C	LC-MS/MS	Cum 08:00	Pzt 18:00
	İdrar, Dondurulmuş: Örnek ışıktan korunmalıdır.							
C8412006	**Bisfenol A**							
	Numune alırken polikarbonat plastik kullanmaktan kaçının. Polipropilen kaplarda toplayın ve saklayın. Işık korumasına gerek yoktur. Numune oda sıcaklığına dayanıksızdır. Oda sıcaklığında gelen örnekler red edilecektir.							
	İdrar, Dondurulmuş	**Plastik Kap**	10	mL	<0°C	GC-MS	Pzt 08:00	10 gün sonra
C8226101	**Biyotinidaz, Serum**							
	Aşırı hemolizli örnekler kabul edilmez.							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1	mL	<0°C	ENZİMATİK	Pzt 08:00 Sal 08:00 Çar 08:00 Per 08:00 Cum 08:00	Çar 18:00 Per 18:00 Cum 18:00 Pzt 18:00 Sal 18:00
	Serum, Dondurulmuş: Serum örnekleri dondurulmuş olarak transfer edilmelidir.							
C8226102	**Biyotinidaz, Tarama Testi**							
	Kapiller Kan	**Filtre Kağıdı**	0		18-24°C	FOTOMETRİ	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Çar 18:00 Cum 18:00 Pzt 18:00
	Kapiller Kan: Kapiller kan, bu test için 0-1 ay arasındaki bebeklerde topuk bölgesinden alınmalıdır.Kanın, kart üzerindeki işaretli bölgenin tamamı dolacak şekilde sadece kartın ön yüzünden emdirilmesine dikkat edilmelidir.Topuktan alınacak örnekler için topuğun yan kısımları seçilmelidir.Örnek alındıktan sonra, kartlar yatay şekilde ve güneş ışığına maruz bırakılmadan oda sıcaklığında 2-3 saat kurutulmalıdır.Bu test, yenidoğan tarama amaçlı yapılmakta olup 1 aydan büyük hastalarda Biyotinidaz, Serum testinin yapılması önerilmektedir.							
C8779952	**BK Virus DNA (PCR), İdrar, Kantitatif**							
	İdrar	**Steril Tüp**	2	mL	2-8°C	PCR	Pzt 08:00 Çar 08:00	Sal 18:00 Per 18:00

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8779953	**BK Virus DNA (PCR), Plazma, Kantitatif**							
	Plazma (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	PCR	Pzt 08:00 Çar 08:00	Sal 18:00 Per 18:00
C8818071	**Blast Paneli, Kemik İliği**							
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır. Test içeriğinde; CD117, CD19, CD34, CD45 ve CD7 bulunmaktadır.							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8818070	**Blast Paneli, Tam Kan**							
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır. Test içeriğinde; CD117, CD19, CD34, CD45 ve CD7 bulunmaktadır.							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	FLOW SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8818072	**Blast Paneli, Vücut Sıvıları**							
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır. Test içeriğinde; CD117, CD19, CD34, CD45 ve CD7 bulunmaktadır.							
	Biyolojik Sıvı	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	FLOW SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8818068	**Blastik Plasmositoid Dendritik Hücre Lösemi Paneli, Kemik İliği**							
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır. Test içeriğinde; CD123 Blast, CD303, CD304, CD4+ (T-Lenfosit), CD45, CD56, HLA-DR+ ve TCL1 bulunmaktadır.							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8818067	**Blastik Plasmositoid Dendritik Hücre Lösemi Paneli, Tam Kan**							
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır. Test içeriğinde; CD123 Blast, CD303, CD304, CD4+ (T-Lenfosit), CD45, CD56, HLA-DR+ ve TCL1 bulunmaktadır.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8818069	**Blastik Plasmositoid Dendritik Hücre Lösemi Paneli, Vücut Sıvıları**							
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır. Test içeriğinde; CD123 Blast, CD303, CD304, CD4+ (T-Lenfosit), CD45, CD56, HLA-DR+ ve TCL1 bulunmaktadır.							
	Biyolojik Sıvı	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8388003	**B-Natriüretik Peptid (NT-proBNP)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 14:00	Pzt-Cmt 18:00
C8388001	**B-Natriüretik Peptid (NT-proBNP) (STAT)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	FLUOROMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	Pzt-Cmt 18:00

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8706001 **Boğaz Kültürü**								
	Boğaz Sürüntüsü	**Jelli Swap**	0		18-24°C	K/T	Pzt-Cmt 12:00	2 gün sonra 17:00
	Boğaz Sürüntüsü: Örnek alımından önce herhangi bir şey yenmemiş olmalıdır.Gargara ya da dezenfektan bir madde kullanılmamalıdır.Hasta, yüzü ışığa dönük olarak oturtulur.Ağız iyice açılır.Ağızdan derin nefes alırken dil basacağı ile bastırılır.Jelli transport besiyerinden eküvyon çubuğu çıkarılarak; ağız mukozasına ve dile dokunmadan, tükrükle temas ettirilmeksizin tonsiller (bademcikler), farenks ve nazofarenkse ve varsa lezyona bastırılıp döndürülerek örnek alınır.Aynı anda hem boğaz kültürü hem de Strep-A testi olan hastalarda aynı anda hem pamuklu hem de rayon swabla örnek alınır.Örneği aldıktan sonra: yalnızca kültür örneği varsa pamuklu eküvyon çubuk jelli besiyeri içerisine aktarılarak laboratuvara gönderilir.Dondurulmuş örnekler kabul edilmez.							
C8661503 **Bordetella pertussis Antikoru, IgA ²**								
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	EİA	Sal 08:00	2 hafta sonra
C8779819 **Bordetella pertussis DNA (PCR)**								
	Nazofaringeal Aspirat	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	2	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Çar-Cmt 18:00 Pzt 18:00
	Nazofarinks Sürüntüsü	**Nucliswab**	0		2-8°C	PCR		
C8661504 **Bordetella pertussis Toksin Antikoru, IgG**								
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8660914 **Borrelia burgdorferi Antikoru, IgG Doğrulama (Lyme hastalığı)**								
	Profil içeriğinde; Borrelia IgG p100, Borrelia IgG VIsE, Borrelia IgG p58, Borrelia IgG p41, Borrelia IgG p39, Borrelia IgG OspA, Borrelia IgG OspC ve Borrelia IgG p18 parametreleri yer almaktadır.							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	İMMUNOBLOTTİNG	Pzt 08:00	Çar 18:00
C8660906 **Borrelia burgdorferi Antikoru, IgG (Lyme hastalığı)**								
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	EIA, CLIA	Sal 08:00 Per 08:00	Çar 18:00 Cum 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8661803 **Borrelia burgdorferi Antikoru, IgM Doğrulama (Lyme hastalığı)**								
	Profil içeriğinde; Borrelia IgM p100, Borrelia IgM VIsE, Borrelia IgM p58, Borrelia IgM p41, Borrelia IgM p39, Borrelia IgM OspA, Borrelia IgM OspC ve Borrelia IgM p18 parametreleri yer almaktadır.							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	İMMUNOBLOTTİNG	Pzt 08:00	Çar 18:00
C8661802 **Borrelia burgdorferi Antikoru, IgM (Lyme hastalığı)**								
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	EIA, CLIA	Sal 08:00 Per 08:00	Çar 18:00 Cum 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8747601	**Borrelia burgdorferi DNA (PCR)**							
	Biyopsi Materyali	**Plastik Kap**	0		2-8°C	PCR	Sal 08:00	Çar 18.00
	İdrar	**Steril Tüp**	2	mL	2-8°C	PCR		
	Plazma (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	2-8°C	PCR		
	Sinoviyal sıvı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	2	mL	2-8°C	PCR		
C8779962	**Borrelia burgdorferi DNA (PCR), BOS**							
	BOS	**BOS Tüpü**	1	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	Sal-Cmt 18:00
C8707507	**BOS kültürü**							
	BOS	**BOS Tüpü**	0.3	mL	18-24°C	K/T/D	Pzt-Cmt 12:00	6 gün sonra 17:00
	BOS: Örnek Alım Özellikleri: Herhangi bir madde içermeyen steril tüp veya kaplara alınmalıdır. BOS örneği fazla bekletilmeden çalışılması gereken bir örnektir.Alındıktan sonra zaman kaybetmeksizin laboratuvara ulaştırılması gerekir. Uygun olmayan koşullar: Donmuş veya pıhtılı örnekler, kültür örnekleri için buzdolabında beklemiş örnekler, hücre sayımı için santrifüj edilmiş örnekler, steril olmayan ya da sızdıran kapla örneğin laboratuvara ulaşması uygun değildir.							
C8818065	**Bronkalveolar Lavaj Paneli (BAL), Flow Sitometri**							
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Örnek alındıktan sonra 12 saat içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır. Test içeriğinde; CD14, CD16, CD19, CD24, CD3, CD4+ (T-Lenfosit), CD45 ve CD8 (T-Lenfosit) bulunmaktadır.							
	Bronkoalveoler Lavaj	**EDTA-Mor Kapak**	10	mL	2-8°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8665817	**Brucella agglütinasyonu (Rose Bengal) Brucella abortus**							
	Hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kabul edilmez.							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	AGLUTİNASYON	Pzt-Cum 08:00	Salı-Cmt 18:00
C8665818	**Brucella agglütinasyonu (Rose Bengal) Brucella mellitensis**							
	Hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kabul edilmez							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	AGLUTİNASYON	Pzt-Cum 08:00	Salı-Cmt 18:00
C8665819	**Brucella Aglütinasyonu (CAPT)**							
	Hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kabul edilmez							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	AGLUTİNASYON	Pzt-Cum 08:00	Salı-Cmt 18:00
C8631804	**Brucella Aglütinasyonu, Coombs'lu**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	AGLUTİNASYON	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Çar-Cmt 18:00 Sal 18:00
	Serum: Hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kabul edilmez.							

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8631801	**Brucella Aglütinasyonu (Wright)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	AGLUTİNASYON	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Çar-Cmt 18:00 Sal 18:00
	Serum: Hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kabul edilmez.							
C8665816	**Brucella Aglütinasyonu (Wright), Merkaptoetanollü**							
	Hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kabul edilmez.							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	AGLUTİNASYON	Pzt-Cum 08:00	Çar-Cmt 18:00
C8662205	**Brucella Antikoru, IgG**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	EIA, CLIA	Sal 08:00 Cum 08:00	Çar 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8662204	**Brucella Antikoru, IgM**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	EIA, CLIA	Sal 08:00 Cum 08:00	Çar 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8779815	**Brucella DNA (PCR)**							
	Biyolojik Sıvı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	2	mL	2-8°C	REAL TİME PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
	Biyopsi Materyali	**Plastik Kap**	0		2-8°C	REAL TİME PCR		
	Tam Kan (EDTA) (PCR)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	REAL TİME PCR		
C8779967	**Brucella DNA (PCR), BOS**							
	BOS	**BOS Tüpü**	1	mL	2-8°C	REAL TİME PCR	Pzt-Cum 08:00	Sal-Cmt 18:00
C8708144	**Burun Kültürü**							
	Burun Salgısı	**Jelli Swap**	0		2-8°C	K/T/D	Pzt-Cmt 12:00	3 gün sonra 17:00
C8378920	**Busulfan, Plazma**							
	Plazma (Heparin)	**Heparin-Yeşil Kapak**	1	mL	<0°C	LC-MS/MS	Pzt-Cmt	4 saat sonra
	Plazma (Heparin): İlk 24 saat içerisinde çalışılamayacak olan örneklerin dondurulması önerilir. İlk kan örneği , IV Busulfan infüzyonunun bitişinden hemen sonra alınmalıdır. Diğer kan örnekleri de , infüzyon bitişinden 1 saat , 2 saat ve 4 saat sonra alınmalıdır. Busulfan test bilgileri için formun eksiksiz doldurulması gerekmektedir.							

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8300301	**Büyüme Hormonu (GH)**							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1	mL	<0°C	CLIA	Sal 08:00 Per 08:00	Çar 18:00 Cum 18:00
	Serum, Dondurulmuş: Örnek en az 8 saat açlıkta alınmalıdır.Örnek alınmadan önce hasta 30 dakika istirahat ettirilmelidir.							
C8043509	**Büyüme Hormonu (GH) Supresyon Testi (OGTT Eşliğinde)**							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1	mL	<0°C	FOTOMETRİ, CLİA	Sal 08:00 Per 08:00	Çar 18:00 Cum 18:00
	Serum, Dondurulmuş: Hasta örnek vermeden önce en az 8 saat aç olmalıdır.Örnek alınmadan önce hasta 30 dakika istirahat ettirilmelidir.Örnek ile birlikte Fonksiyon Testleri Örnek Alma İzlem Formu da gönderilmelidir.Erişkinlerde 100 gr glukoz, çocuklarda (15 yaşından küçüklerde) ise 1,75 gr/kg glukoz (maksimum 75 gr olmalıdır) ağızdan çözelti şeklinde verilir.Glukoz çözeltisi verilmeden hemen önce 0. dk örneği alınır.Çözelti verildikten sonra 30., 60., 90., 120. ve, 180. dk'da kan örnekleri alınır. Alınan tüm örneklerde GH testleri ile birlikte glukoz testleri de çalışılır.							
C8614001	**C Reaktif Protein (CRP)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Kan alındıktan sonra serum en geç 2 saat içinde hücrelerden ayırılmalıdır.							
C8614003	**C Reaktif Protein (hsCRP), Ultrasensitif**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8614005	**C Reaktif Protein (mikro-CRP) (STAT)**							
	Kapiller Kan	**Kapiller Tüp**	0		2-8°C	sandwich immunodetection	Pzt-Cmt 14:00	Pzt-Cmt 18:00
C8630401	**CA 125**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.2	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Örnek oda sıcaklığında tamamen pıhtılaştıktan sonra santrifüj edilmelidir.							
C8630001	**CA 15-3**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.2	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Örnek oda sıcaklığında tamamen pıhtılaştıktan sonra santrifüj edilmelidir.							
C8630101	**CA 19-9**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.2	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Örnek oda sıcaklığında tamamen pıhtılaştıktan sonra santrifüj edilmelidir.. Aşırı hemolizli örnekler kullanılmaz							
C8631611	**CA 242 ²**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	EİA	Sal 08:00	2 hafta sonra

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8631601 **CA 50 ²**								
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Sal 08:00	2 hafta sonra
C8631604 **CA 72-4**								
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	ECLİA	Pzt 08:00 Cum 08:00	Sal 18:00 Pzt 18:00
C8352015 **Calprotectin, Gaita**								
	Örnek stabilitesi 2-8°C de 3 gündür. Donmuş örnekler çalışmaya uygun değildir.							
	Gaita	**Plastik Kap**	5	gr	2-8°C	EİA	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Sal 18:00 Per 18:00 Pzt 18:00
C8789903 **Campylobacter Antijeni**								
	Gaita	**Plastik Kap**	5	gr	2-8°C	İMMUNOKROMATOGRAFİ	Pzt-Cum 08:00	Sal-Cmt 18:00
C8662804 **Candida albicans Antikoru**								
	Bu test altında; Candida albicans Antikoru, IgA, Candida albicans Antikoru, IgG, Candida albicans Antikoru, IgM yer almaktadır.							
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	EİA	Cum 08:00	Pzt 18:00
C8748101 **Candida DNA (PCR)**								
	Bu panel içerisinde; Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis, Candida tropicalis ve Candida spp. bulunmaktadır.							
	Aft Materyali	**Plastik Kap**	0		2-8°C	MULTİPLEKS PCR	Pzt-Cum	3 gün sonra
	Biyopsi Materyali	**Plastik Kap**	0		2-8°C	MULTİPLEKS PCR		
	Deri Kazıntısı	**Plastik Kap**	0		2-8°C	MULTİPLEKS PCR		
	Diğer	**Laboratuvara danışınız**	0		2-8° C	MULTİPLEKS PCR		
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	2-8°C	MULTİPLEKS PCR		
C8254201 **Cannabinoids (Esrar ve Metabolitleri) ²**								
	İdrar	**Plastik Kap**	10	mL	2-8°C	GC-MS	Sal 08:00	10 gün sonra
	Serum	**Jelli Tüp**	3	mL	2-8°C	GC-MS		
	Serum: Analiz; THC, THC-COOH ve 11-OH-THC içermektedir.							
	İdrar: Analiz; THC, THC-COOH ve 11-OH-THC içermektedir.							

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8237301	**Carbohydrate Deficient Transferrin (CDT) [2]**							
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	HPLC	Sal 08:00	1 hafta sonra
	Serum: CDT, Kronik alkol kullanımı için araştırılan bir testtir.							
C8636301	**CD34 Kök Hücre Sayımı [1] [3]**							
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir. (Tel: 0216 500 4717). Test içeriğinde; CD34, CD45, Hücre Canlılığı ve Lökosit Sayısı bulunmaktadır.							
	Aferez Örneği	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	2	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	1 gün sonra 18:00
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ		
	Kordon Kanı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	2	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ		
	Periferik Kök Hücre	**Steril cam tüp**	1	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ		
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ		
C8925680	**CD4/CD8 Oranı, Periferik Kan**							
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir. Test içeriğinde; CD3, CD4+, CD45, CD8+, CD4/CD8, Lenfosit Sayısı ve Lökosit Sayısı bulunmaktadır.							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	3 gün sonra
C8925682	**CD4/CD8 Oranı, Vücut Sıvıları**							
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir. Test içeriğinde; CD3, CD4+, CD45, CD8+, CD4/CD8, Lenfosit Sayısı ve Lökosit Sayısı bulunmaktadır.							
	Biyolojik Sıvı	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	3 gün sonra
C8237801	**CEA (Karsinoembriyonik Antijen)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Örnek oda sıcaklığında tamamen pıhtılaştıktan sonra santrifüj edilmelidir.							
C8660902	**Chlamydia pneumoniae Antikoru, IgG**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8660905	**Chlamydia pneumoniae Antikoru, IgM**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	EIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8748601	**Chlamydia pneumoniae DNA (PCR)**							
	Balgam	**Plastik Kap**	2	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	4 gün sonra
	Boğaz Sürüntüsü	**Nucliswab**	0		2-8°C	PCR		
	Bronkoalveoler Lavaj	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	5	mL	2-8°C	PCR		
	Transtrakeal Aspirat	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	5	mL	2-8°C	PCR		
C8663102	**Chlamydia psittaci Antikoru**							
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	İFT	Sal 08:00	Çar 18:00
C8727001	**Chlamydia trachomatis Antijeni**							
	Örneklerin alımı için Chlamydia trachomatis testine özel swap ya da Jelsiz dacron veya rayon swap kullanılmalıdır.							
	İdrar	**Plastik Kap**	20	mL	2-8°C	İMMUNOKROMATOGRAFİ	Pzt-Cum 08:00 Cmt 08:00	Sal-Cmt 18:00 Pzt 18:00
	Konjuktival Sürüntü	**Dacron/ Rayon Swab**	0		2-8°C	İMMUNOKROMATOGRAFİ		
	Prostat sıvısı	**Dacron/ Rayon Swab**	0		2-8°C	İMMUNOKROMATOGRAFİ		
	Servikal Sürüntü	**Dacron/ Rayon Swab**	0		2-8°C	İMMUNOKROMATOGRAFİ		
	Üretral Akıntı	**Dacron/ Rayon Swab**	0		2-8°C	İMMUNOKROMATOGRAFİ		
	Üretral Akıntı: Örnek alma işlemi öncesinde, hastaların en az 1 saat boyunca idrar yapmamaları gerekir. Prostat sıvısı: Örnek alma işlemi öncesinde, hastaların en az 1 saat boyunca idrar yapmamaları gerekir. İdrar: Örnek alma işlemi öncesinde, hastaların en az 1 saat boyunca idrar yapmamaları gerekir.							
C8660907	**Chlamydia trachomatis Antikoru, IgA ²**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	İFT	Sal 08:00	1 hafta sonra
C8660903	**Chlamydia trachomatis Antikoru, IgG**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8660904	**Chlamydia trachomatis Antikoru, IgM**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8749101	**Chlamydia trachomatis DNA (PCR)**							
	Alınan sürüntü örnekleri nucli swap ile transfer edilmelidir.							
	Doku	**Plastik Kap**	0		2-8°C	PCR	Per 08:00	Cum 18:00
	Konjuktival Sürüntü	**Nucliswab**	0		2-8°C	PCR		
	Prostat sıvısı	**Nucliswab**	0		2-8°C	PCR		
	Servikal Sürüntü	**Nucliswab**	0		2-8°C	PCR		
	Steril İdrar	**Plastik Kap**	2	mL	2-8°C	PCR		
	Üretral Akıntı	**Nucliswab**	0		2-8°C	PCR		
C8616201	**CH-50 Kompleman Hemolitik Aktivitesi**							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1	mL	<0°C	TÜRBİDİMETRİ	Sal 08:00	2 hafta sonra 18:00
C8623526	**CIDP/Nodo Paranodopati**							
	BOS	**BOS Tüpü**	0.5	mL	2-8°C	İFA	Çar 08:00	2 hafta sonra
	Plazma (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	0.5	mL	2-8°C	İFA		
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	İFA		
C8382501	**Civa (Hg)** [1] [3]							
	Tam Kan (Heparin)	**Sodyum Heparin-Lacivert Kapak**	2	mL	2-8°C	İCP-MS	Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00
C8382524	**Civa (Hg)/Kreatinin Oranı, İdrar (Spot)**							
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	5	mL	2-8°C	ICP-MS	Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00
C8382525	**Civa, İdrar (24 saat)**							
	24 Saatlik İdrar	**24 Saatlik İdrar Kabı**	5	mL	2-8°C	İCP-MS	Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8780234	**Clonidine/L-Dopa Büyüme Hormonu Uyarı Testi**							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1	mL	<0°C	CLIA	Per 08:00	Cum 18:00
	Serum, Dondurulmuş: Bu test için önceden laboratuvardan randevu alınmalıdır.Örnek ile birlikte Fonksiyon Testleri Örnek Alma İzlem Formu da gönderilmelidir.Hasta örnek vermeden önce en az 8 saat aç olmalıdır. Örnek almadan önce hasta 30 dk. istirahat ettirilir.Clonidine testi için; 0. dakika kan örneği aç olarak alındıktan sonra 5ug/kg (max 300 ug) Clonidine ağız yoluyla uygulanır.Daha sonra 30, 60, 90, 120. dakikalarda kan örnekleri alınarak serumları ayırılır ve donmuş olarak transport edilir.Alınan örneklerden GH testi çalışılır. L-Dopa testi için; 0. dakika kan örneği aç olarak alındıktan sonra yetişkinler için 500 mg, çocuklar (15 yaşından küçükler) için 10 mg/kg L-DOPA ağızdan verilir. (Çocuklar için L-DOPA miktarı 500 mg'ı geçmemelidir).Daha sonra 30, 60, 90, 120. dakikalarda kan örnekleri alınarak serumları ayırılır ve donmuş olarak transport edilir.Alınan örneklerden GH testi çalışılır.							
C8732402	**Clostridium difficile Toksin A + B**							
	Gaita	**Plastik Kap**	1	gr	2-8°C	İMMUNOKROMATOGRAFİ	Pzt-Cum 08:00 Cmt 08:00	Sal-Cmt 18:00 Pzt 18:00
	Gaita: Örneklerin alındıkları kaplar, %10 formalin, SAF, veya PVA koruyucu gibi herhangi bir madde içermemelidir. Swabla gelen örnekler de uygun değildir							
C8780110	**Clostridium difficile Toksin A/B DNA (PCR)**							
	Gaita	**Plastik Kap**	1	gr	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	2 gün sonra
C8237303	**Congenital Glycosylation Disorder (CDG-transferrin)**							
	Testin hangi amaçla istendiğini mutlaka belirtiniz. Önceden CDG tanısı konulmuş ve klinik takibi yapılmak isteniyor ise lütfen belirtiniz.							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	2	mL	<0°C	Affinity Chromatography-Mass Spectrometry (MS)	Sal 08:00	1 ay sonra
C8688002	**Coombs, Direkt (Monospesifik)**							
	Direkt coombs (polispesifik) testi pozitif sonuç vermiş olmalıdır.							
	Tam Kan (EDTA) (TM)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	JEL SANTRİFÜGASYON	Pzt-Cmt	2 saat sonra
C8688001	**Coombs, Direkt (Polispesifik)**							
	Tam Kan (EDTA) (TM)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	JEL SANTRİFÜGASYON	Pzt-Cmt	2 saat sonra
C8688501	**Coombs, İndirekt**							
	Test istenen bireyde gebelik olup olmadığı, gebelik mevcut ise gebelik haftası, anti-D profilaksi yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise tarihinin belirtilmesi, kan grubu sonucu bilgisi ve transfüzyon/transplantasyon yapılıp yapılmadığı bilgisi gerekmektedir. Anlaşmalı kurumlardan gelen örnekler için "İmmünohematoloji Testleri Bilgi Formu" eksiksiz doldurulmalı ve hekim tarafından kaşeli/imzalı olarak örnek ile beraber gönderilmelidir.							
	Serum ve EDTA Tam Kan	**Jelli Tüp + EDTA**	4	mL	2-8°C	JEL SANTRİFÜGASYON	Pzt 12:00 Çar 12:00	Sal 18:00 Per 18:00
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	0			JEL SANTRİFÜGASYON		

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8688502	**Coombs, İndirekt, Titrimetrik**							
	Test istenen bireyde gebelik olup olmadığı, gebelik mevcut ise gebelik haftası, Anti-D profilaksi yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise tarihinin belirtilmesi,kan grubu sonucu bilgisi ve transfüzyon/transplantasyon yapılıp yapılmadığı bilgisi gerekmektedir. Anlaşmalı kurumlardan gelen örnekler için "İmmünohematoloji Testleri Bilgi Formu" eksiksiz doldurulmalı ve hekim tarafından kaşeli/imzalı olarak örnek ile beraber gönderilmelidir.							
	Serum ve EDTA Tam Kan	**Jelli Tüp + EDTA**	4	mL	2-8°C	Jel Santrifügasyon	Pzt 12:00 Çrş 12:00	Sal 18:00 Per 18:00
C8249105	**Copeptin (CT-ProAVP) ² ³**							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1	mL	<0°C	TRACE	Sal 08:00	2 hafta sonra
C8388701	**Cotinin, Serum (Nikotin Metaboliti) ²**							
	Serum	**Jelsiz Tüp**	2	mL	2-8°C	GC-MS	Sal 08:00	1 hafta sonra
C8663801	**Coxiella burnetii Antikoru (Q fever) ²**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	KBR	Sal 08:00	2 hafta sonra
C8468101	**C-Peptid**							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1	mL	<0°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum, Dondurulmuş: Örnek aç olarak alınmalıdır.İlk 24 saatte çalışmaya alınmayacak örnekler dondurulmalıdır.							
C8468102	**C-Peptid Stimülasyon Testi**							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1	mL	<0°C	CLIA	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Sal 18:00 Per 18:00 Pzt 18:00
	Serum, Dondurulmuş: Bu test için laboratuvardan randevu alınmalıdır. Hasta örnek vermeden önce en az 8 saat aç olmalıdır.							
C8468103	**C-Peptid, Tokluk**							
	Serum, Tokluk (Dondurulmuş)	**Jelli Tüp**	1	mL	<0°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum, Tokluk (Dondurulmuş): İlk 24 saatte çalışmaya alınmayacak örnekler dondurulmalıdır.							
C8040007	**CRH Stimulasyon Testi**							
	Bu test için önceden laboratuvardan randevu alınmalıdır. Örnek ile birlikte Fonksiyon Testleri Örnek Alma İzlem Formu da gönderilmelidir. Erişkinlerde (> 18 yaş) 100 µg, CRH, Çocuklarda (< 18 yaş) 1 µg /kg CRH i.v. olarak verilir. CRH verilmeden hemen önce 1 kez, CRH verildikten sonra 15., 30. ve 60. dakikalarda alınan EDTA'lı plazma ve serum örneklerinde ACTH ve kortizol yanıtı aranır. ACTH için EDTA'lı tüpe alınan örnek, alındıktan hemen sonra buz banyosunda bekletilir. Soğutuculu santrifüjde plazmanın 15 dakika içerisinde ayrılması sağlanır. Soğutuculu santrifüj yoksa örneğin buz banyosunda bekletilerek ayrılması sağlanır.							
	Serum ve Plazma (EDTA), Dondurulmuş	**Jelli Tüp + EDTA**	2	mL		CLIA	Pzt 14:00 Çar 14:00 Cum 14:00	Pzt 18:00 Çar 18:00 Cum 18:00

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8690401	**Crossmatch**							
	Tam Kan (EDTA)(CROSS)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	JEL SANTRİFÜGASYON	Her gün	2 saat sonra
C8732700	**Cryptococcus Neoformans Antijeni, BOS**							
	BOS	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	1	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8732699	**Cryptococcus Neoformans Antijeni, Serum**							
	Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8732801	**Cryptosporidium Antijeni**							
	Gaita	**Plastik Kap**	5	mL	2-8°C	İMMUNOKROMATOGRAFİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Gaita: Yalnızca sıvı (diyareik) gaita örneklerinde çalışılır. Katı gaita örneklerinde çalışılmaz.							
C8260001	**Cyanide (Siyanür) ²**							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Çar 08:00	8 gün sonra
	Tam Kan (EDTA): Test için EDTA-Tam kan gerekmektedir.							
C8351601	**Cyclic Citrullinated Peptid Antikoru (anti-CCP)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8631608	**Cyfra 21-1 ²**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	ECLİA	Sal 08:00	1 hafta sonra
C8664401	**Cytomegalovirus (CMV) Antikoru, IgG ¹ ³**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	CMİA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8664501	**Cytomegalovirus (CMV) Antikoru, IgM**							
	Plazma (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	0.5	mL	2-8°C	CMİA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	CMİA		
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz. Plazma (EDTA): Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8749702	**Cytomegalovirus (CMV) DNA (PCR), Amniyotik Sıvı, Kantitatif**							
	Amniyotik Sıvı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	2	mL	2-8°C	PCR	Sal 08:00 Cum 08:00	Çar 18:00 Cmt 18:00
C8779985	**Cytomegalovirus (CMV) DNA (PCR), Balgam, Kantitatif**							
	Balgam	**Plastik Kap**	2	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	2 gün sonra
	Balgam: Örneklerin laboratuvara transferi 3 günden uzun sürecek ise dondurulmalıdır.							
C8780091	**Cytomegalovirus (CMV) DNA (PCR), Biyolojik Sıvı, Kantitatif**							
	Biyolojik Sıvı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	2	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	2 gün sonra
	Biyolojik Sıvı: Örneklerin laboratuvara transferi 3 günden uzun sürecek ise dondurulmalıdır.							
C8779986	**Cytomegalovirus (CMV) DNA (PCR), BOS, Kantitatif**							
	BOS	**BOS Tüpü**	2	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	Sal-Cmt 18:00
	BOS: Örneklerin laboratuvara transferi 3 günden uzun sürecek ise dondurulmalıdır.							
C8779987	**Cytomegalovirus (CMV) DNA (PCR), Bronkoalveoler Lavaj, Kantitatif**							
	Bronkoalveoler Lavaj	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	10	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	2 gün sonra
	Bronkoalveoler Lavaj: Örneklerin laboratuvara transferi 3 günden uzun sürecek ise dondurulmalıdır.							
C8779988	**Cytomegalovirus (CMV) DNA (PCR), Doku, Kantitatif**							
	Doku	**Plastik Kap**	0		2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	4 gün sonra
	Doku: Biyopsi örnekleri nucliswap içinde gönderilmelidir.							
C8779989	**Cytomegalovirus (CMV) DNA (PCR), Gaita, Kantitatif**							
	Gaita	**Plastik Kap**	5	gr	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	4 gün sonra
	Gaita: Örneklerin laboratuvara transferi 3 günden uzun sürecek ise dondurulmalıdır.							
C8779990	**Cytomegalovirus (CMV) DNA (PCR), İdrar, Kantitatif**							
	İdrar	**Steril Tüp**	10	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	2 gün sonra
	İdrar: Örneklerin laboratuvara transferi 3 günden uzun sürecek ise dondurulmalıdır.							

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8779991	**Cytomegalovirus (CMV) DNA (PCR), Plazma, Kantitatif**							
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	<0°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	2 gün sonra
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş: Heparin-plazma örneği uygun değildir.							
C8790002	**Cytomegalovirus (CMV) DNA (PCR), Transtrakeal Aspirat, Kantitatif**							
	Transtrakeal Aspirat	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	2	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	2 gün sonra
C8664402	**Cytomegalovirus (CMV) IgG Avidite**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	ELFA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnek analiz için kullanılmaz. Avidite, antijen üzerinde yer alan çok sayıdaki epitop ile antikor moleküllerinin bağlanma bölgeleri arasındaki bağlanma gücüdür. IgG antikor avidite testleri, primer enfeksiyonun olası etiyolojisini ve süresini belirlemede ve primer enfesiyonun re-enfeksiyon, reaktivasyon ya da aşılama sonrası yanıttan ayırımında kullanılmaktadır. Çalışılan avidite testlerinde öncelikle o virüs için IgG düzeyi saptanmakta ve IgG pozitif olanlarda daha sonra Avidite ölçümleri için işlemlere devam edilmektedir. Dolayısı ile IgG Avidite testleri viral IgG'si pozitif olanlarda çalışılmalı ve bu örnekler Avidite testi çalışılmak üzere gönderilmelidir.							
C8616101	**C1 Esteraz İnhibitör, Antigen**							
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	TÜRBİDİMETRİ	Sal 08:00	Per 18:00
C8616102	**C1-Esteraz İnhibitör, Fonksiyonel**							
	Plazma örneği en az iki ayrı tüpe bölünerek dondurulmalıdır. Hemolizli, lipemik, ikterik ve fibrin içeren numuneler analiz için kullanılmaz.							
	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	**Sitrat-Mavi Kapak**	0.5	mL	<0°C	KOAGÜLOMETRİ	Çar 08:00	Cum 18:00
C8721001	**Çini Mürekkebi (Indian Ink) Boyama**							
	Örnekler oda sıcaklığında 24 saat stabil olup, dondurulmuş örnekler analiz için kabul edilmez.							
	Biyolojik Sıvı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	1	mL	18-24°C	MİKROSKOPİ	Pzt-Cmt 08:00	1 gün sonra
	BOS	**BOS Tüpü**	1	mL	18-24°C	MİKROSKOPİ		
	İdrar	**Plastik Kap**	1	mL	18-24°C	MİKROSKOPİ		
C8463001	**Çinko (Zn)**							
	Hemolizli örnek analiz için kullanılmaz.							
	Plazma (Heparin)	**Sodyum Heparin-Lacivert Kapak**	2	mL	2-8°C	AAS	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Sal 18:00 Per 18:00 Pzt 18:00
C8463002	**Çinko (Zn), Eritrosit**							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	İCP-MS	Sal 08:00 Cum 08:00	Cum 18:00 Pzt 18:00
	Tam Kan (EDTA): Test için EDTA-Tam kan gerekmektedir.							

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8463006	**Çinko (Zn), İdrar (24 saat)** [1] [3]							
	24 Saatlik İdrar	**24 Saatlik İdrar Kabı**	5	mL	2-8°C	AAS	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Sal 18:00 Per 18:00 Pzt 18:00
C8463005	**Çinko (Zn)/Kreatinin Oranı, İdrar (Spot)**							
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	5	mL	2-8°C	AAS	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Sal 18:00 Per 18:00 Pzt 18:00
C8272601	**Çok Uzun Zincirli Yağ Asitleri**							
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	GC-MS	Sal 12:00	10 gün sonra
	Serum: Örnek, yetişkinlerde sabah açlığında, çocuklarda en az 4-5 saatlik açlık sonrası alınmalıdır. Test kapsamında; Dokosanoik asit (Behenik asit) (C22:0), Tetrakosanoik asit (Lignoserik asit) (C24:0), Hekzakosanoik asit (C26:0), C24/C22 oranı, C26/C22 oranı yer almaktadır.							
C8105001	**Dansite, İdrar**							
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	5	mL	18-24°C	REFRAKTOMETRİ	Pzt-Cmt	2 saat sonra
C8623528	**Daratumumab Interferans Testi (Kappa+ Lambda)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	5	mL	2-8°C	MALDI-TOF+IFE	Çar 08:00	6 gün sonra
C8818077	**Daratumumab İnterferans Testi (MALDI-TOF)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	5	mL	2-8°C	MALDI-TOF+IFE	Çar 08:00	6 gün sonra
C8537901	**D-Dimer**							
	Plazma (Sitrat)	**Sitrat-Mavi Kapak**	1	mL	2-8°C	IMMÜNOTÜRBİDİMETRİK	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8537903	**D-Dimer Sinoviyal (Eklem) Sıvı**							
	Venöz tromboemboli (VTE) ve Dissemine intravasküler koagülopati (DIC) tanı ve takibinde kullanılmaktadır.							
	Eklem Sıvısı	**Sitrat-Mavi Kapak**	1	mL	2-8°C	İMMUNOASSAY	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8537902	**D-Dimer (STAT)**							
	Venöz tromboemboli (VTE) ve Dissemine intravasküler koagülopati (DIC) tanı ve takipinde kullanılmaktadır.							
	Tam Kan (Sitrat)	**Sitrat-Mavi Kapak**	2	mL	18-24°C	İMMUNOASSAY	Pzt-Cmt 14:00	Pzt-Cmt 18:00

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8262601	**Dehidroepiandrosteron (DHEA), Serbest**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Çar 08:00	Per 18:00
C8262602	**Dehidroepiandrosteron (DHEA), Tükrük**							
	Tükürük	**Laboratuvara danışınız**	0.5	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Çar 08:00	Per 18:00
C8262701	**Dehidroepiandrosteron Sülfat (DHEA-S)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.2	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8040044	**Deksametazon**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Sal 08:00	1 hafta sonra
C8040004	**Deksametazon Supresyon Testi**							
	Serum,ilaç sonrası	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum,ilaç sonrası: 1 mg deksametazon saat 23:00-24:00 arası ağızdan alınır. Bir sonraki sabah saat 08:00'de alınan kan örneğinde kortizol yanıtı aranır.							
C8213501	**Delta-Aminolevülinik asit (Delta-ALA)**							
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	10	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Per 08:00	1 hafta sonra
	Spot İdrar: Örnek ışıktan korunmalıdır.							
C8355001	**Demir Bağlama Kapasitesi**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Diurnal varyasyon nedeniyle örnek en geç sabah saat 10:30'da ve aç olarak alınmalıdır.Hemolizli örnek kabul edilmez							
C8354001	**Demir (Fe)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Diürnal varyasyon nedeniyle örnek en geç sabah saat 10:30'da ve aç olarak alınmalıdır.Hemolizli örnek kabul edilmez.							
C8354003	**Demir (Fe), Doku ²**							
	Doku	**Laboratuvara danışınız**	1	gr	<0°C	AAS	Sal 08:00	1 hafta sonra
	Doku: Doku örneği yaklaşık 1-2 cm uzunluğunda olmalı ve hemen dondurulmalıdır. Dondurma işlemi herhangi bir sıvı içerisinde olmamalıdır.							
C8354005	**Demir (Fe), İdrar (Spot)**							
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	5	mL	2-8°C	İCP-MS	Per 08:00	10 gün sonra
	Spot İdrar: Işık koruması gerekmez.							

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8680303	**Dengue Virus (Flavivirus) Antikoru, IgM ²**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	EİA	Sal 08:00	1 hafta sonra
C8252301	**Deoksipiridinolin ³**							
	Sabah saat 10:00 dan önce birinci sabah idrarı verilmesi önerilir. Örnek ışıktan korunmalıdır.							
	Sabah 1. İdrar, Dondurulmuş	**Plastik Kap**	5	mL	<0°C	CLIA	Çar 08:00	Per 18:00
C8459702	**Diamin Oksidaz**							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1	mL	<0°C	EIA	Sal 08:00	Çar 18:00
	Serum, Dondurulmuş: Hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kabul edilmez.							
C8215008	**Dickkopf 3 (DKK3)**							
	Spot idrarda çalışılması uygundur. Örnek dondurulmuş olmalı ve transferi dondurulmuş olarak gerçekleştirilmelidir. Eğer mümkünse hassasiyeti arttığı için (daha konsantre olduğundan) sabah ilk idrar önerilmektedir.							
	İdrar, Dondurulmuş	**Plastik Kap**	2	mL	<0°C	ELISA	Pzt 08:00 Çar 08:00	10 gün sonra
C8630503	**Dietil Keton, İdrar (Spot)**							
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	5	ml	2-8°C	GC-MS	Pzt-Cum 08:00	8 gün sonra
C8016201	**Digoksin**							
	Serum	**Jelsiz Tüp**	1	mL	2-8°C	KİMS	Pzt-Cmt 14:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Kan örneği, separatör jel içermeyen tüplere alınmalıdır.Heparin plazma da kullanılabilir.Hemolizli örnekler kabul edilmez.							
C8265101	**Dihidrotestosteron**							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelsiz Tüp**	0.5	mL	<0°C	LC-MS/MS	Per 08:00	Cum 18:00
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	0.5	mL	<0°C	LC-MS/MS		
C8600440	**Diklofenak (Diclofenac) ²**							
	Serum	**Jelsiz Tüp**	1	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Sal 08:00	1 hafta sonra
C8630504	**Diklorometan, İdrar (Spot)**							
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	5	ml	2-8°C	GC-MS	Pzt-Cum 08:00	8 gün sonra

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8664801	**Diphtheria Antikoru, IgG ²**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	EİA	Sal 08:00	1 hafta sonra
C8780235	**DMSA Ağır Metal Tarama Testi (Kurşun, Civa)**							
	Spot idrar ve 4 saatlik idrar	**Plastik Kap**	5	mL	2-8°C	ICP-MS	Sal 08:00 Çar 08:00 Per 08:00	1 hafta sonra
	Spot idrar ve 4 saatlik idrar: DMSA öncesi alınan spot idrarda ve DMSA sonrası toplanan 4 saatlik idrarda atılan civa ve kurşun değerleri ölçülerek kişinin ağır metal yükü hakkında bilgi sağlanır. Hasta, toplama işlemine başlamadan önceki 1 hafta boyunca deniz ürünleri yememelidir. Eğer gadolinyum veya iyot içeren kontrast madde uygulanmışsa, örnek toplama işlemi en az 4 gün sonra yapılmalıdır. Örnekleme, 8 saatlik açlık sonrasında yapılmalıdır. Hasta test sırasında sigara içmemelidir. Örnekler (ilaç almadan önce ve ilaç sonrası) etiketlenmeli ve laboratuvara birlikte gönderilmelidir. Test, olası yan etkileri önlemek amacıyla bir doktor gözetiminde klinikte yapılmalıdır.							
C8818201	**DNA Ploidi İndeks**							
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir.							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cum 08:00	3 gün sonra
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ		
C8690301	**Donör Kanının Serolojik İncelemesi**							
	Form	**.**	0					
	Serum ve EDTA Tam Kan	**Jelli Tüp + EDTA**	0					
C8238407	**Dopamin, İdrar (24 saat)**							
	24 Saatlik İdrar, (HCl ile)	**24 Saatlik İdrar Kabı**	10	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Sal 08:00	Çar 18:00
	24 Saatlik İdrar, (HCl ile): İdrar koruyucusu olarak 10 mL, 6 N HCl kullanılmalıdır.							
C8238406	**Dopamin, Plazma**							
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş	**EDTA-Mor Kapak**	1	mL	<0°C	LC-MS/MS	Sal 08:00 Cum 08:00	Cum 18:00 Sal 18:00
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş: Test için EDTA-plazma örneği gerekmektedir. Hemolizli örnekler kabul edilmez. Örnek alınmadan önce 4 saat birşey yenilmemeli, sigara ve kahve içilmemelidir. Örnek alınmadan önce hasta 30 dakika istirahat ettirilmelidir. Örnek, alındıktan hemen sonra buzlu su içerisinde bekletilmeli ve 30 dakika içerisinde mümkünse soğutuculu santrifüjde plazma ayrılmalı ve hemen dondurulmalıdır.							
C8238411	**Dopamin/Kreatinin Oranı, İdrar (Spot)**							
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	1	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Sal 08:00	Çar 18:00

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8010101	**Drug Abuse Tarama Testi**							
	Drug abuse screening test (ilaç/madde tarama testi) nin kişinin tıbbi tanı ve tedavi süreçlerine katkı sağlaması amacıyla kullanılması önerilmektedir.							
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	5	mL	2-8°C	İMMUNOKROMATOGRAFİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Spot İdrar: Drug abuse tarama testi kapsamında idrarda; Metadon, Kokain, Opiyatlar, Trisiklik antidepresanlar (TCA), Benzodiazepines, Amfetamin, Barbituratlar, Fensiklidin (PCP), Ekstazi (MDMA), Marihuana (THC), Sentetik kannabinoid (K2) ve Metamfetamin (MET) bakılır.							
C8668203	**Echinococcus Antikoru, IgG**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	EIA	Sal 08:00	Çar 18:00
C8729904	**Echinococcus Antikoru, Total (IHA)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	İHA	Pzt 08:00 Per 08:00	Sal 18:00 Cum 18:00
	Serum: Hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kabul edilmez.							
C8719005	**Echinococcus DNA (PCR)**							
	Doku	**Plastik Kap**	0		2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
	Kist Sıvısı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	0		2-8°C	PCR		
C8779994	**Echinococcus DNA (PCR), BOS**							
	BOS	**BOS Tüpü**	1	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	Sal-Cmt 18:00
C8704702	**E.coli DNA (EPEC,EHEC,ETEC), (PCR)**							
	Gaita	**Plastik Kap**	5	gr	2-8°C	REAL TİME PCR	Sal 08:00	1 hafta sonra
C8704701	**E.coli O157:H7 Antijeni**							
	Gaita	**Plastik Kap**	1	gr	2-8°C	İMMUNOKROMATOGRAFİ	Pzt-Cmt 08:00	3 gün sonra 18:00
C8499908	**Elastaz, Pankreatik (Gaita)** [3]							
	Koruyucu içermeyen gaita örneğinden çoklu yerden örnekleme yapılmalıdır. Örnek dondurularak gönderilmelidir. Bebeklerde bebek bezinden örnek alınmamalıdır.							
	Gaita, Dondurulmuş	**Plastik Kap**	5	gr	<0°C	EİA	Pzt 08:00 Per 08:00	Sal 18:00 Cum 18:00

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8623500 **ENA Profili**								
	Profil altında; anti JO-1, anti RNP, anti SCL-70, anti Sm, anti SsA (Ro), anti SsB (La), anti CENP, anti-Ro-52, anti-nucleosome, anti-histone, anti ribozomal P protein, anti-PmScl, anti-Mi-2, anti-Ku antikorları yer almaktadır.							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	İMMUNOBLOTTİNG	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Pzt 18:00 Sal 18:00
C8729903 **Entamoeba histolytica Antikoru**								
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	İHA	Çar 08:00	Per 18:00
C8749108 **Enterik Panel**								
	Bu panel içerisinde; Campylobacter grup (C. coli, C. jejuni, C. lari), Rotavirus A, Salmonella spp., Yersinia enterocolitica, Clostridium difficile toxin A/B, Enteroaggregative E.coli (EAEC), Enteroinvasive E. coli (EIEC)/Shigella, Enteropathogenic E. coli (EPEC), Enterotoxigenic E. coli (ETEC) lt/st, Plesiomonas shigelloides, Shiga-like toxin producing E.coli (STEC) stx1/stx2, Shiga-like toxin producing E.coli (STEC) O157:H7, Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio vulnificus, Adenovirus F40/41, Astrovirus, Norovirus GI, Norovirus GII, Sapovirus (GI, GII, GIV, GV), Cryptosporidium spp., Cyclospora cayetanensis, Entamoeba histolytica ve Giardia lamblia bulunmaktadır.							
	Gaita	**Plastik Kap**	1	gr	2-8°C	REAL TIME PCR	Pzt-Cum 08:00 Cmt 08:00	Sal-Cmt 18:00 Cmt 18:00
C8717201 **Enterobius vermicularis (Selofan Bant ile)**								
	Selofan Bant	**Selofan Band**	0		2-8°C	MİKROSKOPİ	Pzt-Cum 08:00	Sal-Cmt 18:00
	Selofan Bant: Örnek sabah duşa veya tuvalete gitmeden önce alınmalıdır. Lama yapışık olan selofan bantın bir kısmı lamdan ayrılarak perianal bölgenin en az 3-4 farklı alanına yapıştırılarak çekilmeli ve tekrar lama yapıştırılarak laboratuvara getirilmelidir.							
C8665812 **Enterovirus Antikoru (Coxsackie, ECHO), IgA**								
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	EİA	Sal 08:00	2 hafta sonra
C8665813 **Enterovirus Antikoru (Coxsackie, ECHO), IgG**								
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	EİA	Sal 08:00	2 hafta sonra
C8665814 **Enterovirus Antikoru (Coxsackie, ECHO), IgM**								
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	EİA	Sal 08:00	2 hafta sonra
C8925658 **Enterovirus RNA (PCR), Biyopsi Materyali**								
	Biyopsi Materyali	**Plastik Kap**	0		2-8°C	REAL TİME PCR	Sal 08:00	1 hafta sonra
C8925657 **Enterovirus RNA (PCR), BOS**								
	BOS	**BOS Tüpü**	2	mL	2-8°C	REAL TİME PCR	Sal 08:00	1 hafta sonra

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8925659	**Enterovirus RNA (PCR), Gaita**							
	Gaita	**Plastik Kap**	5	gr	2-8°C	REAL TİME PCR	Sal 08:00	1 hafta sonra
C8919002	**Eozinofil Aranması**							
	Gaita	**Plastik Kap**	1	gr	2-8°C	MİKROSKOPİ	Pzt-Cum 08:00	Pzt-Cum 18:00
C8499907	**Eozinofilik Katyonik Protein (ECP)**							
	Serum (ECP)	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	CLIA	Çar 09:00	Per 18:00
	Serum (ECP): Kan örneği jelli tüpe alındıktan sonra tüp yavaşça alt üst edilir. 1-2 saat oda ısısında bekletildikten sonra 1000-1300xg de 10 dakika santrifüj edilerek serum ayrılır. Tüm bu işlemlerin oda ısısında yapılması önemlidir.							
C8666402	**Epstein-Barr Virus Antikoru, (EBV)-EBNA IgG**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	CMİA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Pzt-Per 18:00 Cum 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8666403	**Epstein-Barr Virus Antikoru, (EBV)-EBNA IgM**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	ELİSA	Cum 08:00	Pzt 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8666502	**Epstein-Barr Virus Antikoru, (EBV)-VCA IgG**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	CMİA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Pzt-Per 18:00 Cum 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8666501	**Epstein-Barr Virus Antikoru, (EBV)-VCA IgM**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Pzt-Per 18:00 Cum 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8780165	**Epstein-Barr Virus (EBV) DNA (PCR), Biyolojik Sıvı, Kantitatif**							
	Biyolojik Sıvı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	2	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	2 gün sonra
C8780002	**Epstein-Barr Virus (EBV) DNA (PCR), BOS, Kantitatif**							
	BOS	**BOS Tüpü**	0.5	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	Sal-Cmt 18:00

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR	TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8790001	**Epstein-Barr Virus (EBV) DNA (PCR), Doku, Kantitatif**						
	Doku	**Plastik Kap**	0	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	4 gün sonra
C8780163	**Epstein-Barr Virus (EBV) DNA (PCR), Kemik İliği, Kantitatif**						
	Kemik İliği	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	2 mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	2 gün sonra
C8780003	**Epstein-Barr Virus (EBV) DNA (PCR), Plazma, Kantitatif**						
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş	**EDTA-Mor Kapak**	2 mL	<0°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	2 gün sonra
C8666504	**Epstein-Barr Virus (EBV) Profili**						
	EBV profilinde; EA, IgG, EBNA, IgG, p22 Ag, VCA, IgG , gp125, VCA, IgG , p19, VCA ,IgM, gp125, VCA, IgM, p19 araştırılmaktadır.						
	Serum	**Jelli Tüp**	1 mL	2-8°C	İMMUNOBLOTTİNG	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Sal 18:00 Per 18:00 Pzt 18:00
C8666301	**Epstein-Barr Virus (EBV)-EA, Antikor**						
	Serum	**Jelli Tüp**	1 mL	2-8°C	CLIA	Sal 08:00 Per 08:00	Çar 18:00 Cum 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.						
C8818021	**Eritro Lösemi Paneli, Kemik İliği**						
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır. Test içeriğinde; CD117, CD235a, CD34, CD36, CD38, CD45 ve CD71 bulunmaktadır.						
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	5 mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8818020	**Eritro Lösemi Paneli, Tam Kan**						
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır. Test içeriğinde; CD117, CD235a, CD34, CD36, CD38, CD45 ve CD71 bulunmaktadır.						
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	5 mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8818022	**Eritro Lösemi Paneli, Vücut Sıvıları**						
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır. Test içeriğinde; CD117, CD235a, CD34, CD36, CD38, CD45 ve CD71 bulunmaktadır.						
	Biyolojik Sıvı	**EDTA-Mor Kapak**	6 mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8266801	**Eritropoietin**						
	Serum	**Jelli Tüp**	1 mL	2-8°C	CLIA	Pzt 08:00 Cum 08:00	Sal 18:00 Cum18:00
	Serum: Sabah saat 7.30-12.00 arasında kan alınmalıdır. Aşırı hemolizli örnek analiz için kullanılmaz. (Hemoglobin >100 mg/dL)						

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8636190 **Eritrosit Omega-3 İndeksi**								
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	2-8°C	GC-MS	Çar 08:00	7 gün sonra
C8780230 **Eritrosit Osmotik Direnci (EMA Bağlama Testi (Band 3 Assay))**								
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	AKIM SİTOMETRİ	Sal 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Sal 18:00
	Tam Kan (EDTA): Hemolizli ve pıhtılı örnekler kabul edilmez.							
C8565101 **Eritrosit Sedimentasyon Hızı (ESR)**								
	Tam Kan	**Sitrat-Siyah Kapak**	2	mL	2-8°C	WESTERGREN	Pzt-Cmt	1 saat sonra
	Tam Kan: Test için Sitrat-Tam kan gerekmektedir.							
C8684913 **Escitalopram İlaç Düzeyi**								
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Sal 08:00	2 hafta sonra
C8267001 **Estradiol (E2)**								
	Serum	**Jelli Tüp**	0.2	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8267701 **Estriol (E3), Free**								
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	0.5	mL	<0°C	CLIA	Pzt 09:00 Per 09:00	Sal 18:00 Cum 18:00
C8267901 **Estron (E1) ²**								
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	0.3	mL	<0°C	ELISA	Sal 08:00	17 gün sonra
C8205501 **Etanol (Etil Alkol)**								
	Numuneler sodyum florür (gri kapaklı) tüplerde (3 ayrı tüp) toplanacaktır. Tüplerden biri santrifüj edilerek plazması sekonder tüpe aktarılacaktır (Test numunesi). Diğer tüplere herhangi bir işlem uygulanmayacaktır (Şahit numuneler). Test numunesi ve Şahit numunelerin kapakları analize dek kesinlikle açılmamalıdır. Numunenin ne zaman alındığı ve tüplerin kapağının açılıp açılmadığı numuneyi gönderen birim tarafından beyan edilmelidir. Sekonder tüpteki test numunesi plazma olarak ve şahit numunelerden bir tanesi tam kan olarak, bilgileri doldurulup imzaları tamamlanmış Etanol Analizi Kan Numunesi Alma ve Teslim Tutanağı ile beraber gönderilmelidir. Kan numunesini alan birim, şahit numunelerden diğerini florürlü tam kan olarak kilitli derin dondurucuda -20°C'de en az 1 yıl saklamalıdır. Kan numunesi alınacak bölgenin dezenfeksiyonunda alkol içeren dezenfektan kullanılması yasaktır. Dezenfeksiyon işleminin povidon iyot (Baticon) veya benzalkonyum klorür (Zefiran) bazlı antiseptikler ile yapılması gereklidir. Etanol testi numuneleri soğuk zincir koşullarında, kırılma/sızıntı riski olmayan, güvenlik etiketi bulunan kaplarda ve kilitli transfer çantalarında olacak şekilde ulaştırılmalıdır. Numuneler, transfer edilene dek 2–8°C aralığında tutulmalıdır. Numune kabulü sonrası 4 saat içinde analizi yapılamayan numune; santrifüj sonrası sekonder tüpte, analiz yapılıncaya kadar en fazla 14 gün süreyle +4 °C'de saklanır.							
	Tam Kan (NaF)	**Florür-Gri Kapak**	2	mL	2-8°C	ENZİMATİK	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8665820 **Etilen Glikol, Plazma**								
	Plazma (Heparin)	**Heparin-Yeşil Kapak**	1	mL	2-8°C	GC-MS	Cum 08:00	10 gün sonra
	Plazma (NaF)	**Florür-Gri Kapak**	1	mL	2-8°C	GC-MS		

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8016801	**Etosüksimid (Ethosuximide) ²**							
	Serum	**Jelsiz Tüp**	1	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Sal 08:00	1 hafta sonra
	Serum: Kan örneği separatör jel içermeyen tüplere alınmalıdır.							
C8029931	**Everolimus**							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Pzt-Cum 12:00	Pzt-Cum 18:00
C8521001	**Faktör II**							
	Plazma örneği en az iki ayrı tüpe bölünerek dondurulmalıdır.							
	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	**Sitrat-Mavi Kapak**	0.5	mL	<0°C	KOAGÜLOMETRİ	Pzt 08:00	Cum 18:00
C8525001	**Faktör IX**							
	Plazma örneği en az iki ayrı tüpe bölünerek dondurulmalıdır.							
	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	**Sitrat-Mavi Kapak**	0.5	mL	<0°C	KOAGÜLOMETRİ	Pzt 08:00 Cum 08:00	Pzt 18:00 Cum 18:00
C8524602	**Faktör IX İnhibitör Testi**							
	Plazma örneği en az iki ayrı tüpe bölünerek dondurulmalıdır.							
	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	**Sitrat-Mavi Kapak**	2	mL	<0°C	KOAGÜLOMETRİ	Çar 08:00	Cum 18:00
C8573003	**Faktör İnhibitör Tarama Testi**							
	Plazma örneği en az iki ayrı tüpe bölünerek dondurulmalıdır.							
	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	**Sitrat-Mavi Kapak**	2	mL	<0°C	KOAGÜLOMETRİ	Sal 08:00	2 hafta sonra 18:00
C8522001	**Faktör V**							
	Plazma örneği en az iki ayrı tüpe bölünerek dondurulmalıdır.							
	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	**Sitrat-Mavi Kapak**	0.5	mL	<0°C	KOAGÜLOMETRİ	Pzt 08:00 Cum 08:00	Pzt 18:00 Cum 18:00
C8523001	**Faktör VII**							
	Plazma örneği en az iki ayrı tüpe bölünerek dondurulmalıdır.							
	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	**Sitrat-Mavi Kapak**	0.5	mL	<0°C	KOAGÜLOMETRİ	Pzt 08:00 Cum 08:00	Pzt 18:00 Cum 18:00

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8524001 **Faktör VIII**								
Plazma örneği en az iki ayrı tüpe bölünerek dondurulmalıdır.								
	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	**Sitrat-Mavi Kapak**	0.5	mL	<0°C	KOAGÜLOMETRİ	Pzt 08:00 Cum 08:00	Pzt 18:00 Cum 18:00
C8533501 **Faktör VIII İnhibitör**								
Plazma örneği en az iki ayrı tüpe bölünerek dondurulmalıdır.								
	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	**Sitrat-Mavi Kapak**	2	mL	<0°C	KOAGÜLOMETRİ	Çar 08:00	Cum 18:00
C8526001 **Faktör X**								
Plazma örneği en az iki ayrı tüpe bölünerek dondurulmalıdır.								
	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	**Sitrat-Mavi Kapak**	0.5	mL	<0°C	KOAGÜLOMETRİ	Pzt 08:00 Cum 08:00	Pzt 18:00 Cum 18:00
C8527001 **Faktör XI**								
Plazma örneği en az iki ayrı tüpe bölünerek dondurulmalıdır.								
	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	**Sitrat-Mavi Kapak**	0.5	mL	<0°C	KOAGÜLOMETRİ	Pzt 08:00 Cum 08:00	Pzt 18:00 Cum 18:00
C8528001 **Faktör XII**								
Plazma örneği en az iki ayrı tüpe bölünerek dondurulmalıdır.								
	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	**Sitrat-Mavi Kapak**	0.5	mL	<0°C	KOAGÜLOMETRİ	Pzt 08:00 Cum 08:00	Pzt 18:00 Cum 18:00
C8529001 **Faktör XIII (Fibrin Stabilizing Factor)**								
Plazma örneği en az iki ayrı tüpe bölünerek dondurulmalıdır.								
	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	**Sitrat-Mavi Kapak**	0.5	mL	<0°C	KROMOJENİK	Pzt 08:00 Cum 08:00	Pzt 18:00 Cum 18:00
C8684912 **Fasciola hepatica Antikoru, IgG**								
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	EIA/BLOT	Sal 08:00	17 gün sonra

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8403001 **Fenilalanin**								
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1	mL	<0°C	LC-MS/MS	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Çar 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00
C8015405 **Fenilglioksilik Asit, İdrar (Spot)**								
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	5	mL	2-8°C	HPLC	Pzt-Cum 08:00	8 gün sonra
C8403002 **Fenilketonüri Tarama Testi (PKU)**								
	Kapiller Kan	**Filtre Kağıdı**	0		18-24°C	LC-MS/MS	Pzt-Cum 08:00	3 gün sonra
	Kapiller Kan: Test içeriğinde; Fenilalanin, Tirozin ve Fenilalanin/Tirozin oranı yer almaktadır. Kapiller Kan: Kapiller kan, 0-6 ay arasındaki bebeklerde topuk bölgesinden alınmalıdır.1 yaşından büyük hastalarda ise el parmağından alınması tercih edilmektedir.6 ay-1 yaş arasındaki çocuklarda örnek alınacak bölgeyi seçerken, hastanın ağırlığına göre karar verilmeli, ağırlığı 10 kg'dan az olan çocuklarda topuk bölgesi, fazla olanlarda el parmağı tercih edilmelidir.Kanın, kart üzerindeki işaretli bölgenin tamamı dolacak şekilde emdirilmesine dikkat edilmelidir.Topuktan alınacak örnekler için topuğun yan kısımları seçilmelidir.Örnek alındıktan sonra, kartlar yatay şekilde ve güneş ışığına maruz bırakılmadan oda sıcaklığında 2-3 saat kurutulmalıdır.Metabolik tarama kapsamında; -Aminoasit metabolizması hastalıkları, -Üre siklüsü defektleri, -Organik asidemiler, -Yağ asidi oksidasyon defektleri araştırılmaktadır.Hasta sonuçları, ayrıntılı bilgi içerecek şekilde raporlanmaktadır.							
C8018501 **Fenitoin (Phenytoin)**								
	Serum	**Jelsiz Tüp**	0.5	mL	2-8°C	PETİNİA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8018502 **Fenitoin (Phenytoin), Serbest ²**								
	Serum	**Jelsiz Tüp**	1	mL	2-8°C	HPLC	Sal 08:00	1 hafta sonra
	Serum: Kan örneği, separatör jel içermeyen tüplere alınmalıdır.							
C8018401 **Fenobarbital (Phenobarbital)**								
	Serum	**Jelsiz Tüp**	1	mL	2-8°C	PETİNİA	Pzt-Cmt 14:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Kan örneği, separatör jel içermeyen tüplere alınmalıdır.							
C8207506 **Fenol/Kreatinin Oranı, İdrar (Spot)**								
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	20	mL	2-8°C	HPLC	Pzt-Cum 08:00	8 gün sonra
C8272801 **Ferritin**								
	Serum	**Jelli Tüp**	0.2	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Örnek, 0-2 yaş çocuklarda minimum 4 saat, yetişkinlerde ortalama 10-12 saat açlıkta alınmalıdır. Plazma örnekleri ve hemolizli örnekler kullanılmaz.							
C8302012 **Fetal Hemoglobin (Anne kanı)**								
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	HPLC	Pzt-Per 08:00	Sal-Cum 18:00

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8538501 **Fibrinojen**								
	Plazma (Sitrat)	**Sitrat-Mavi Kapak**	2	mL	<0°C	KOAGÜLOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8599903 **Fibronektin ²**								
	Plazma (Sitrat)	**Sitrat-Mavi Kapak**	2	mL	2-8°C	NEFELOMETRİ	Sal 08:00	1 hafta sonra
C8616113 **Fibrozis-4 (FIB-4) Skoru**								
	Kan alındıktan sonra serum en geç 2 saat içinde hücrelerden ayırılmalıdır. Hemolizli örnekler kullanılmamalıdır. Test panelinde tanımlı tüm örnek türleri gereklidir.							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C		Pzt-Cmt 08:00	Pzt-Cmt 18:00
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak (CBC)**	2	mL	2-8°C			
C8391804 **Fitanik Asit, Serum**								
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	GC-MS	Sal 12:00	10 gün sonra
C8273502 **Florür/Kreatinin Oranı, İdrar (Spot)**								
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	5	mL	2-8°C	İSE	Sal 08:00	1 hafta sonra
C8780223 **Flukonazol (Fluconazole), Serum**								
	Serum	**Jelsiz Tüp**	1	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Cum 08:00	Pzt 18:00
C8274601 **Folik Asit**								
	Serum	**Jelli Tüp**	0.2	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Örnek ışıktan korunmalıdır. Açlık örneği tercih edilmelidir. Hemolizli örnekler kullanılmaz.							
C8274602 **Folik Asit, Eritrosit**								
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	2-8°C	ECLİA	Sal 08:00	1 hafta sonra
	Tam Kan (EDTA): Test için EDTA-Tam kan gerekmektedir.							
C8300101 **Folikül Stimülan Hormon (FSH)**								
	Serum	**Jelli Tüp**	0.2	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8630508 **Formaldehit**								
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	10	mL	2-8°C	GC-FİD	Pzt-Cum 08:00	8 gün sonra

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8614808	**Fosfolipaz A2 Reseptör Antikoru(Anti-PLA2R), IgG [2]**							
	Hemolizli örnek kabul edilmez.							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	İFT	Sal 08:00	2 hafta sonra
C8410001	**Fosfor (P), İnorganik [1] [3]**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Örnek aç olarak alınmalıdır.Kan alındıktan sonra serum en geç 2 saat içinde hücrelerden ayırılmalıdır.							
C8410503	**Fosfor (P), İnorganik, İdrar (Spot)**							
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	2	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8410502	**Fosfor (P), İnorganik, İdrar (24 saat)**							
	24 Saatlik İdrar, (HCl ile)	**24 Saatlik İdrar Kabı**	2	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	24 Saatlik İdrar, (HCl ile): İdrar koruyucusu olarak 10 mL, 6 N HCl kullanılmalıdır.							
C8666802	**Francisella tularensis (Tularemi) Antikoru, IgG [2]**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	ELİSA	Per 08:00	Cum 18:00
C8666803	**Francisella tularensis (Tularemi) Antikoru, IgM**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	ELISA	Per 08:00	Cum 18:00
C8298502	**Fruktozamin**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Sal 08:00 Per 08:00	Çar 18:00 Cum 18:00
C8707702	**Fungal İdentifikasyon, Otomatize**							
	Genç Mantar Kökeni	**Kültür Plağı**	0		18-24°C	OTOMATİZE	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra 17:00
C8704501	**Gaita Kültürü**							
	Gaita	**Plastik Kap**	1	gr	2-8°C	K/T/D	Pzt-Cmt 12:00	3 gün sonra 17:00
	Gaita: Örnek Alım Özellikleri: Dışkı örneğinde mukus, kan, püy varsa inceleme özellikle bu kısımlardan yapılmalıdır.Bulguların ortaya çıkmasından sonra alınan 1-2 gr. taze dışkı örneği hemen bir enterik transport besiyerine (Cary blair) aktarılır.Aktif ishali olan çocuklar ve erişkin hastalarda rektal sürüntü örneği alınması uygundur.Uygun olmayan koşullar: Temiz olmayan ya da sızdıran kapla örneğin laboratuvara ulaşması, 24 saat içerisinde 1'den fazla örnek gönderilmesi, uygun koruyucu olmaksızın örneğin bekletilmesi, buzdolabında 48 saatten fazla bekletilmiş ve dondurulmuş örnekler.							

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8720801 **Gaitada Parazit Aranması**								
	Gaita	**Plastik Kap**	1	gr	2-8°C	MİKROSKOPİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8916001 **Gaitada Sindirim**								
	Gaita	**Plastik Kap**	1	gr	2-8°C	MİKROSKOPİ	Pzt-Cmt 14:00	Pzt-Cmt 18:00
C8265706 **Galaktoserebrosidaz, Lökosit**								
	Lizozomal Enzim Testleri İstek Formu eksiksiz doldurulmalı ve örnek ile birlikte gönderilmeli.							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	8	mL	2-8°C	FLUOROMETRİ	Pzt 08:00	Cum 18:00
	Tam Kan (EDTA): Numune hafta içi günlerde ve mümkünse kurye/kargo zamanına yakın olarak alınmalıdır. Aşırı hemolizli örnekler kabul edilmez.							
C8276001 **Galaktoz, Serbest ²**								
	Kapiller Kan	**Filtre Kağıdı**	0		18-24°C	FOTOMETRİ	Sal 08:00	2 hafta sonra
C8297701 **Gama Glutamil Transferaz (GGT)**								
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	ENZİMATİK	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Kan alındıktan sonra serum en geç 2 saat içinde hücrelerden ayırılmalıdır.							
C8352001 **Gangliosid Profili**								
	Gangliosid profilinde; GD1a-IgG Antikoru, GD1a-IgM Antikoru, GD1b-IgG Antikoru, GD1b-IgM Antikoru, GM1-IgG Antikoru, GM1-IgM Antikoru, GM2-IgG Antikoru, GM2-IgM Antikoru, GM3-IgG Antikoru, GM3-IgM Antikoru, GQ1b-IgG Antikoru, GQ1b-IgM Antikoru, GT1b-IgG Antikoru, GT1b-IgM Antikoru araştırılmaktadır.							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	İMMUNOBLOTTİNG	Pzt 08:00	Sal 18:00
C8392515 **Gansiklovir (Ganciclovir) ²**								
	Serum	**Jelsiz Tüp**	2	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Sal 08:00	1 hafta sonra
	Serum: Kan örneği, separatör jel içermeyen tüplere alınmalıdır.							
C8294101 **Gastrin**								
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1	mL	<0°C	CLIA	Çar 08:00	Per 18:00
	Serum, Dondurulmuş: Örnek en az 8 saat açlıkta alınmalıdır.Serum 2 saat içinde hücrelerden ayırılmalıdır.							
C8719905 **Genişletilmiş Antifungal Duyarlılık Testi**								
	Özellikle yoğun bakım hastalarına ait antifungal direnç varlığı düşünülen klinik örneklerde endikedir.Genişletilmiş Antifungal Duyarlılık Testinde çalışılan antifungaller: Amphotericin B, 5-Flucytosine, Anidulafungin, Caspofungin, Micafungin, Flucanazole, Itraconazole, Posaconazole, Voriconazole'dir.Fungal identifikasyon testi ile birlikte çalışılır.							
	Genç Mantar Kökeni	**Kültür Plağı**	0		18-24°C	MİKRODİLÜSYON	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra 17:00
C8708128 **Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL) ve sinerji (E test)**								
	Genç Bakteri Kökeni	**Kültür Plağı**	0		18-24°C	MİKRODİLÜSYON	Pzt-Cmt 12:00	3 gün sonra 17:00

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8749102	**Genital Panel (PCR)**							
	Bu panel içerisinde; Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoae, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Herpes Simplex Virus 1, Herpes Simplex Virus 2, Mycoplasma hominis, Treponema pallidum bulunmaktadır.							
	Konjuktival Süruntü	**Nucliswab**	0		2-8 °C	MULTİPLEX PCR	Sal 08:00 Per 08:00 Cmt 08:00	Çar 18:00 Cum 18:00 Pzt 18:00
	Orofarengeal Süruntü	**Nucliswab**	0		2-8°C	MULTİPLEX PCR		
	Prostat sıvısı	**Nucliswab**	0		2-8 °C	MULTİPLEX PCR		
	Rektal Süruntü	**Nucliswab**	0		2-8°C	MULTİPLEX PCR		
	Sabah 1. İdrar	**Steril Tüp**	1.5	mL	2-8 °C	MULTİPLEX PCR		
	Semen	**Plastik Kap**	1.5	mL	2-8 °C	MULTİPLEX PCR		
	Servikal Süruntü	**Nucliswab**	0		2-8 °C	MULTİPLEX PCR		
	Üretral Akıntı	**Nucliswab**	0		2-8 °C	MULTİPLEX PCR		
C8017001	**Gentamisin (Gentamycin)**							
	Serum	**Jelsiz Tüp**	1	mL	2-8°C	İMMUNOASSAY	Pzt 12:00 Çar 12:00	8 gün sonra
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	İMMUNOASSAY		
C8019706	**Gıda İntolerans Testi (108 parametre)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	İMMUNOBLOTTİNG	Çar 08:00	1 hafta sonra 18:00
C8019710	**Gıda İntolerans Testi (216 parametre)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	İMMUNOBLOTTİNG	Çar 08:00	1 hafta sonra 18:00
C8019707	**Gıda İntolerans Testi (54 parametre)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	İMMUNOBLOTTİNG	Çar 08:00	1 hafta sonra 18:00
C8727202	**Giardia Antijeni**							
	Gaita	**Plastik Kap**	1	gr	2-8°C	İMMUNOKROMATOGRAFİ	Pzt-Cum 08:00 Cmt 08:00	Pzt-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8227001	**Gizli kan, Gaita**							
	Gaita	**Plastik Kap**	1	gr	2-8°C	İMMUNOKROMATOGRAFİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Gaita: Zorunlu durumlar dışında testten 1 hafta öncesinden itibaren, aspirin veya diğer anti-romatizmal ilaçlar, ağrı kesiciler, ateş düşürücüler alınmamalı veya hekiminin bu durumdan haberi olmalıdır. Testten 2 gün öncesinden itibaren supozituar (fitil) ilaçlar kullanılmamalıdır. Testi yaptıracak kişi adet dönemindeyse, idrarından kan geliyorsa, kanayan hemoroidi veya anal fissürü varsa ve dışkı yaparken zorluk çekiyorsa laboratuvarı bilgilendirmeli, mümkünse bu durumlar geçtikten sonra testi yaptırmalıdır. Örnekler 2 saat oda ısısında, 3 gün 2-8°C'de saklanabilir.							

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8109901	**Glikozaminoglikan (Mukopolisakkarid)**							
	İdrar, Dondurulmuş	**Plastik Kap**	5	mL	<0°C	FOTOMETRİ	Sal 08:00	Cum 18:00
	İdrar, Dondurulmuş: Sabah idrarı tercih edilir.							
C8625613	**Glomerüler Bazal Membran Antikoru**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	İFT	Pzt 08:00	Çar 18:00
C8294301	**Glukagon ²**							
	Plazma, Dondurulmuş	**EDTA-Mor Kapak (Trasylol)**	2	mL	<0°C	RİA	Sal 08:00	17 gün sonra
	Plazma, Dondurulmuş: Hasta gece boyunca aç kalmalıdır. Laboratuvardan EDTA-Trasylol (APROTININ) tüpünü edinin. Örnek alındıktan sonra 30 dakika içinde santrifüjlenmelidir.Örnek santrifüj edilip plazma ayrılır ve laboratuvara plazma olarak transfer edilir.							
C8300302	**Glukagon Uyarı Testi (Büyüme Hormonu)**							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	4	mL	<0°C	CLIA	Sal 08:00 Per 08:00	Çar 18:00 Cum 18:00
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1	mL	<0°C	CLIA		
	Serum, Dondurulmuş: Örnek aç olarak alınmalı, örnek alınmadan önce hasta 30 dakika istirahat ettirilmelidir. Örnek ile birlikte Fonksiyon Testleri Örnek Alma İzlem Formu da gönderilmelidir.Uyarı yapılmadan önce 1 kez, uyarı yapıldıktan sonra 60, 120, 150, 180, dk'larda alınan kan örneklerinden GH testi çalışılır.							
	Serum, Dondurulmuş: Örnek aç olarak alınmalı, örnek alınmadan önce hasta 30 dakika istirahat ettirilmelidir. Örnek ile birlikte Fonksiyon Testleri Örnek Alma İzlem Formu da gönderilmelidir. Uyarı yapılmadan önce 1 kez, uyarı yapıldıktan sonra 90, 120, 150, 180, 210 ve 240. dk'larda alınan kan örneklerinden GH ve Kortizol testi çalışılır. Büyüme hormonu (GH) için örnek dondurulmalıdır. Kortizol testi için örnek 2-8 °C de transfer edilmelidir.							
C8294701	**Glukoz, Açlık ¹**							
	Plazma (NaF)	**Florür-Gri Kapak**	0.5	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	FOTOMETRİ		
	Plazma (NaF): Örnek en az 8 saat açlıkta alınmalıdır. Kan alındıktan sonra serum en geç 2 saat içinde hücrelerden ayırılmalıdır.							
	Serum: Örnek en az 8 saat açlıkta alınmalıdır. Kan alındıktan sonra serum en geç 2 saat içinde hücrelerden ayırılmalıdır.							
C8294705	**Glukoz, Biyolojik Sıvı**							
	Biyolojik Sıvı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	0.5	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8294704	**Glukoz, BOS**							
	BOS	**BOS Tüpü**	0.5	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8294703	**Glukoz, İdrar (Spot) ¹ ³**							
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	1	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8294707	**Glukoz, Random** [1]							
	Plazma (NaF)	**Florür-Gri Kapak**	0.5	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	FOTOMETRİ		
C8295002	**Glukoz, Tokluk (2. Saat)** [1]							
	Plazma (NaF), Tokluk	**Florür-Gri Kapak**	0.5	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum, Tokluk	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	FOTOMETRİ		

Plazma (NaF), Tokluk: Tokluk kan şekeri, standart bir öğünden 2 saat sonra kan alınarak tayin edilir.

Serum, Tokluk: Tokluk kan şekeri, standart bir öğünden 2 saat sonra kan alınarak tayin edilir.

C8295105	**Glukoz Tolerans Testi, Hamileler İçin, 100 gr (OGTT)**							
	Form	**.**	0			FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Plazma (NaF)	**Florür-Gri Kapak**	1	mL	2-8°C	FOTOMETRİ		
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	FOTOMETRİ		

Plazma (NaF): Örnek ortalama 10-16 saatlik açlıkta alınmalı ve testin başlangıç saatleri 08:00-10:00 arasında olmalıdır. Test süresince bir şey yenip içilmemeli, sigara kullanılmamalı ve aşırı efor sarfedilmemelidir.

Serum: Örnek ortalama 10-16 saatlik açlıkta alınmalı ve testin başlangıç saatleri 08:00-10:00 arasında olmalıdır. Test süresince bir şey yenip içilmemeli, sigara kullanılmamalı ve aşırı efor sarfedilmemelidir.
100 gr glukoz oral olarak verilir. Glukoz verilmeden hemen önce 1 kez, glukoz verildikten sonra 60., 120. ve 180. dakikada alınan kan örneklerinde glukoz testi çalışılır. Örnek ile birlikte Fonksiyon Testleri Örnek Alma İzlem Formu da gönderilmelidir.

C8295107	**Glukoz Tolerans Testi, Hamileler İçin, 50 gr (OGTT)**							
	Plazma (NaF)	**Florür-Gri Kapak**	0.5	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	FOTOMETRİ		
C8295106	**Glukoz Tolerans Testi, Hamileler İçin, 75 gr (OGTT)**							
	Plazma (NaF)	**Florür-Gri Kapak**	1	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	FOTOMETRİ		

Plazma (NaF): Örnek ortalama 10-16 saatlik açlıkta alınmalı ve testin başlangıç saatleri 08:00-10:00 arasında olmalıdır. Test süresince bir şey yenip içilmemeli, sigara kullanılmamalı ve aşırı efor sarfedilmemelidir.

Serum: Örnek ortalama 10-16 saatlik açlıkta alınmalı ve testin başlangıç saatleri 08:00-10:00 arasında olmalıdır. Test süresince bir şey yenip içilmemeli, sigara kullanılmamalı ve aşırı efor sarfedilmemelidir.
75 gr glukoz oral olarak verilir. Glukoz verilmeden hemen önce 1 kez, glukoz verildikten sonra 60. ve 120. dakikalarda alınan kan örneklerinde glukoz testi çalışılır. Örnek ile birlikte Fonksiyon Testleri Örnek Alma İzlem Formu da gönderilmelidir.

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8294810	**Glukoz Tolerans Testi, Oral, 75 gr (OGTT)**							
	Plazma (NaF)	**Florür-Gri Kapak**	1	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	FOTOMETRİ		
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	FOTOMETRİ		
	Plazma (NaF): Örnek ortalama 10-16 saatlik açlıkta alınmalı ve testin başlangıç saatleri 08:00-10:00 arasında olmalıdır. Test süresince bir şey yenip içilmemeli, sigara kullanılmamalı ve aşırı efor sarfedilmemelidir. Serum: Örnek ortalama 10-16 saatlik açlıkta alınmalı ve testin başlangıç saatleri 08:00-10:00 arasında olmalıdır. Test süresince bir şey yenip içilmemeli, sigara kullanılmamalı ve aşırı efor sarfedilmemelidir. 75 gr glukoz oral olarak verilir. Glukoz verilmeden hemen önce 1 kez, glukoz verildikten sonra 60. ve 120. dakikalarda alınan kan örneklerinde glukoz testi çalışılır. Örnek ile birlikte Fonksiyon Testleri Örnek Alma İzlem Formu da gönderilmelidir.							
C8295501	**Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz (G6PD)**							
	Örnek, tam kan sayımı sonucu ile birlikte gönderilmelidir.							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Sal 08:00 Per 08:00	Çar 18:00 Cum 18:00
C8294809	**Glukoz-75 g (180. Dakika)**							
	Plazma (NaF), 180. Dakika	**Florür-Gri Kapak**	0.3	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum 180. Dakika	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	FOTOMETRİ		
C8294811	**Glukoz-75 g (240. Dakika)**							
	Plazma (NaF), 240. Dakika	**Florür-Gri Kapak**	0.3	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum 240. Dakika	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	FOTOMETRİ		
C8294807	**Glukoz-75 g (30. Dakika)**							
	Plazma (NaF), 30. Dakika	**Florür-Gri Kapak**	0.3	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum 30. Dakika	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	FOTOMETRİ		
C8294812	**Glukoz-75 g (300.Dakika)**							
	Plazma (NaF), 300. Dakika	**Florür-Gri Kapak**	0.5	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum 300. Dakika	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	FOTOMETRİ		
C8294808	**Glukoz-75 g (90. Dakika)**							
	Plazma (NaF), 90. Dakika	**Florür-Gri Kapak**	0.3	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum 90. Dakika	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	FOTOMETRİ		

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8042601	**GnRH (LH-RH) Stimülasyon Testi-1**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.2	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Bu test için önceden laboratuvardan randevu alınmalıdır.Erişkinler için 100 ug GnRH IV, çocuklar için (15 yaşından küçükler) 2.5 ug/kg GnRH IV olarak verilir.İlaç verilmeden önce alınan kan örneğinde ve ilaç verildikten sonra 30, 60, 90 ve 120. dakikalarda alınan kan örneklerinde LH ve FSH testleri çalışılır.							
C8042602	**GnRH (LH-RH) Stimülasyon Testi-2 (Kızlar için)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.2	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Bu test için önceden laboratuvardan randevu alınmalıdır. Erişkinler için 100 ug GnRH IV, çocuklar için (15 yaşından küçükler) 2.5 ug/kg GnRH IV olarak verilir. İlaç verilmeden alınan kan örneğinde LH, FSH ve E2 testleri çalışılır. İlaç verildikten sonra 30 ve 60. dakikalarda alınan kan örneklerinde LH ve FSH, 60. dakikada alınan kan örneğinde E2 testi çalışılır.							
C8042603	**GnRH (LH-RH) Stimülasyon Testi-3 (Erkekler için)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Bu test için önceden laboratuvardan randevu alınmalıdır.Erişkinler için 100 ug GnRH IV, çocuklar için (15 yaşından küçükler) 2.5 ug/kg GnRH IV olarak verilir.İlaç verilmeden alınan kan örneğinde LH, FSH ve Testosteron testleri çalışılır.İlaç verildikten sonra 30 ve 60. dakikalarda alınan kan örneklerinde LH ve FSH, 60. dakikada alınan kan örneğinde Testosteron testi çalışılır.							
C8708101	**Gonokok Kültürü**							
	Servikal Sürüntü	**Jelli Swap**	0		18-24°C	K/T/D	Pzt-Cmt 12:00	4 gün sonra 17:00
	Üretral Akıntı	**Jelli Swap**	0		18-24°C	K/T/D		
	Vaginal Akıntı	**Jelli Swap**	0		18-24°C	K/T/D		
	Üretral Akıntı: Örnek alımı öncesinde hastanın son 2 saat içerisinde idrar yapmamış olması gerekmektedir.Erkeklerde distal üretradan gelen eksüda steril gazlı bez ile uzaklaştırıldıktan sonra ince uçlu metal dakron eküvyon üretradan 2 cm kadar içeriye itilir.Hafif hareketler ile 2-3 kez döndürülerek örnek alınarak kömür içeren Amies transport besiyerine yerleştirilerek en kısa sürede laboratuvara gönderilir. Vaginal Akıntı: Kadınlarda endoserviks kanalına sonra ince uçlu metal dakron eküvyonla 1-2 cm girilmelidir.Daha sonra hafif hareketler ile 2-3 kez döndürülerek örnek alınarak kömür içeren Amies transport besiyerine yerleştirilerek en kısa sürede laboratuvara gönderilir. Servikal Sürüntü: Kadınlarda endoserviks kanalına sonra ince uçlu metal dakron eküvyonla 1-2 cm girilmelidir.Daha sonra hafif hareketler ile 2-3 kez döndürülerek örnek alınarak kömür içeren Amies transport besiyerine yerleştirilerek en kısa sürede laboratuvara gönderilir.							
C8708147	**GSBL Pozitif/ Karbapenem Dirençli Organizma Aranması**							
	Bu test ile GSBL (Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz) üreten E.coli, Klebsiella spp., P. mirabilis türlerinin yanı sıra Karbapenemlere dirençli Enterobacterales, Pseudomonas spp, Acinetobacter spp. üremesi araştırılır.							
	Diğer	**Laboratuvara danışınız**	0		18-24°C	K/T/D	Pzt-Cum 12:00	3 gün sonra 17:00
	Orofarengeal Sürüntü	**Jelli Swap**	0		18-24°C	K/T/D		
	Rektal Sürüntü	**Jelli Swap**	0		18-24°C	K/T/D		
C8378907	**Gümüş ²**							
	Plazma (Heparin)	**Sodyum Heparin-Lacivert Kapak**	2	mL	2-8°C	İCP-MS	Sal 08:00	2 hafta sonra
C8301842	**Gümüş, İdrar (Spot)**							
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	5	mL	2-8°C	ICP-MS	Per 08:00	10 gün sonra
	Spot İdrar: Örnek ışıktan korunmalıdır.							

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8818057	**Hairy Cell Lösemi, MRD Paneli, Kemik İliği**							
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır.							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8818056	**Hairy Cell Lösemi, MRD Paneli, Tam Kan**							
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır.							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8818058	**Hairy Cell Lösemi, MRD Paneli, Vücut Sıvıları**							
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır.							
	Biyolojik Sıvı	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8301001	**Haptoglobin**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	NEFELOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8751704	**HBV Entecavir Direnci ²**							
	Plazma (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	PCR, DNA DİZİ ANALİZİ	Sal 08:00 Çar 08:00 Per 08:00	1 hafta sonra
C8751702	**HBV Lamivudin Direnci (YMDD Motifi) (PCR) ²**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	PCR	Sal 08:00 Çar 08:00 Per 08:00	1 hafta sonra
C8751706	**HBV Tenofovir Direnci ²**							
	Plazma (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	PCR, DNA DİZİ ANALİZİ	Sal 08:00 Çar 08:00 Per 08:00	1 hafta sonra
C8390401	**HCV Genotip**							
	HCV Genotip testinin çalışılabilmesi için HCV RNA düzeyinin 100 IU/mL ve üzerinde olması gerekmektedir. HCV Genotip testinde; 1a, 1b, 1(c-k), 2, 3, 4, 5 ve 6 tipleri saptanmaktadır.							
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	<0°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	2 hafta sonra
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş: Test için EDTA-Plazma gerekmektedir. Plazma, ayrıldıktan sonra kısa süre içerisinde dondurulmalıdır.							

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8308002	**Heksozaminidaz, Total**							
	Lizozomal Enzim Testleri İstek Formu eksiksiz doldurulmalı ve örnek ile birlikte gönderilmeli.							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	10	mL	2-8°C	FLUOROMETRİ	Pzt 08:00	Cum 18:00
	Tam Kan (EDTA): Numune hafta içi günlerde ve mümkünse kurye/kargo zamanına yakın olarak alınmalıdır. Aşırı hemolizli örnekler kabul edilmez.							
C8779802	**Helicobacter DNA (PCR)**							
	Biyopsi Materyali	**Plastik Kap**	0		2-8°C	REAL TİME PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
	Gaita	**Plastik Kap**	5	gr	2-8°C	REAL TİME PCR		
C8745002	**Helicobacter pylori Antijeni (HpSA)**							
	Gaita	**Plastik Kap**	2	mL	2-8°C	İMMUNOKROMATOGRAFİ	Pzt-Cum 08:00 Cmt 08:00	Sal-Cmt 18:00 Pzt 18:00
C8667702	**Helicobacter pylori Antikoru, IgA**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	EİA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8667701	**Helicobacter pylori Antikoru, IgG [1] [3]**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	EİA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8301301	**Helicobacter pylori Üre Nefes Testi (13C-Üre)**							
	"HP Üre nefes testi hasta sorgulama formu" eksiksiz doldurulmalıdır. Testin yapılacağı günün öncesi gece açlığı gerekmektedir. Test yapılmadan önce ve test sırasında 0. (bazal) ve 30. dakika üfleme zamanı arasında herhangi bir şey yemek, içmek ve sigara kullanmak yasaktır. Bazı ilaçların kullanılması, HP Üre Solunum Testinde yalancı negatif sonuçlara neden olabilmektedir. Bu ilaç grupları şunlardır: -Bizmut içeren ilaçlar, antibiyotikler (Son 4 hafta içinde kullanılması), -Proton Pompa İnhibitörleri, H-2 Reseptör Blokerleri (Son 1-2 hafta içinde kullanılması). Helicobacter pylori eradikasyon tedavisi alan hastalar tedavileri tamamlandıktan en az 4 hafta sonra örnek verebilir. Testin tekrarı gerekiyorsa, en erken bir gün sonra yapılır. 12 yaşından küçük çocuklar için laboratuvara danışınız.							
	Nefes	**Özel Torba**	0		18-24°C	İNFRARED SPEKTROSKOPİ	Pzt-Cum 12:00	Pzt-Cum 18:00
C8818066	**Hemafagositik Sendrom Paneli**							
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Örnek alındıktan sonra 12 saat içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır. Test içeriğinde; CD107a, CD19, CD3, CD45, CD56, CD8 (T-Lenfosit) ve Perforin bulunmaktadır.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8303601	**Hemoglobin A1c (HbA1c)**							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak (HbA1c)**	2	mL	2-8°C	HPLC	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8306901 **Hemoglobin, İdrar**								
	İdrar	**Plastik Kap**	2	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Sal 08:00 Çar 08:00 Per 08:00	1 hafta sonra 18:00
C8305101 **Hemoglobin, Plazma (Serbest)**								
	Bu test için örnek stabilitesi 2-8 C de 7 gündür.							
	Plazma (Heparin)	**Heparin-Yeşil Kapak**	2	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Plazma (Heparin): Test için Heparin-Plazma örneği gerekmektedir. Serum örnekleri de kullanılabilir. Ancak plazma örnekleri tercih edilmelidir. Kan alımında hemolizden kaçınılmalıdır.							
C8302011 **Hemoglobin Varyant Analizi**								
	Örnek miktarı 5 mL'den az olmamalıdır. Soğuk zincire uygun transferi gerekir. Hemoglobin varyantları kan alımını takiben 5 gün içinde analiz edilir.							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	2-8°C	HPLC	Pzt-Per 08:00	Sal-Cum 18:00
C8307001 **Hemosiderin, İdrar (Demir boyası) ²**								
	İdrar	**Plastik Kap**	10	mL	2-8°C	MİKROSKOPİ	Sal 08:00	2 hafta sonra
C8190401 **Heparin-PF4 (HIT) Antikoru**								
	Kan örnekleri separatör jel içermeyen tüplere alınmalıdır. Hemolizli ve lipemik örnekler ret kriteridir. Bu test için örnek stabilitesi 2-8 C de 48 saat, -20°C' de 14 gündür.							
	Serum	**Jelsiz Tüp**	2	mL	18-24°C	LFİA	Pzt-Cum 08:00	Pzt-Cum 18:00
C8670801 **Hepatit A Antikoru (anti-HAV), Total**								
	Plazma (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	1	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8670901 **Hepatit A Antikoru, IgM (anti-HAV IgM)**								
	Plazma (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	1	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8751701 **Hepatit B Virus (HBV) DNA (PCR), Kantitatif**								
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	<0°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	4 gün sonra
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş: Kan örneği alındıktan sonra kısa süre içerisinde santrifüj edilmeli ve elde edilen plazma hemen dondurulmalıdır.							
C8751703 **Hepatit B Virus (HBV) Genotip (PCR)**								
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	<0°C	REAL TİME PCR	Sal 08:00 Çar 08:00 Per 08:00	2 hafta sonra 18:00

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8670401	**Hepatit Bc Antikoru (anti-HBc), Total**							
	Plazma (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	1	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8670501	**Hepatit Bc Antikoru, IgM (anti-HBc IgM)**							
	Plazma (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	1	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8735001	**Hepatit Be Antijeni (HBeAg)**							
	Plazma (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	1	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8670701	**Hepatit Be Antikoru (anti-HBe)**							
	Plazma (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	1	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8734001	**Hepatit Bs Antijeni (HBsAg)**							
	Plazma (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	1	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8670601	**Hepatit Bs Antikoru (anti-HBs)**							
	Plazma (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	1	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8680301	**Hepatit C Antikoru (anti-HCV)**							
	Plazma (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	1	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8752203	**Hepatit C Virus (HCV) RNA (PCR), Kantitatif**							
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	<0°C	RT-PCR	Pzt 08:00	Çar 18:00
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş: Test için EDTA-Plazma gerekmektedir. Plazma, ayrıldıktan sonra kısa süre içerisinde dondurulmalıdır.							
C8779825	**Hepatit D Virus (HDV) RNA (PCR), Kantitatif**							
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	<0°C	PCR	Pzt 08:00	1 hafta sonra
C8669205	**Hepatit D Virüs antikoru (Anti-HDV), Total**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	ELİSA	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Sal 18:00 Per 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8684902	**Hepatit E Antikoru, IgG (anti-HEV IgG)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	EİA	Sal 08:00	Çar 18:00
C8684903	**Hepatit E Antikoru, IgM (anti-HEV IgM)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	EİA	Sal 08:00	Çar 18:00
C8779827	**Hepatit E Virus (HEV) RNA (PCR)**							
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	<0°C	PCR	Pzt: 12:00	2 hafta sonra 18:00
C8738001	**Hepatitis Delta (HDV) Antijeni**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	EİA	Pzt 08:00 Per 08:00	Sal 18:00 Cum 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8669605	**Herpes Simplex IgG ASI (Antikor Spesifik İndeks) ²**							
	Serum ve BOS	**Jelli Tüp ve BOS Tüpü**	1	mL	2-8°C	EİA	Sal 08:00	1 hafta sonra
C8780153	**Herpes Simplex Virus (HSV) DNA Tip 1&2 (PCR), Aft Materyali**							
	Aft Materyali	**Plastik Kap**	0		2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
	Aft Materyali: Deri sürüntüsü/kazıntısı, mukoza sürüntüsü/kazıntısı örnekleri steril eküvyon ile alındıktan sonra en az 2-3 ml nükleik asit taşıma tamponu içerisinde saklanır ve bu şekilde transfer edilir.							
C8661122	**Herpes Simplex Virus (HSV) DNA Tip 1&2 (PCR), Amniyotik Sıvı**							
	Amniyotik Sıvı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	1	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	Sal-Cmt 18:00
C8780154	**Herpes Simplex Virus (HSV) DNA Tip 1&2 (PCR), BOS**							
	BOS	**BOS Tüpü**	1	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	Sal-Cmt 18:00
	BOS: BOS, biyolojik sıvı taşıma tüpleri içerisinde transfer edilir. BOS örneği raporlaması 3 gün içerisinde yapılmaktadır.							
C8780157	**Herpes Simplex Virus (HSV) DNA Tip 1&2 (PCR), Doku**							
	Doku	**Plastik Kap**	0		2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
	Doku: Biyopsi materyali; 2-3 ml nükleik asit taşıma tamponu içerisinde saklanır ve bu şekilde transfer edilir.							
C8780158	**Herpes Simplex Virus (HSV) DNA Tip 1&2 (PCR), Göz Salgısı**							
	Göz Salgısı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	0		2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8790003	**Herpes Simplex Virus (HSV) DNA Tip 1&2 (PCR), Konjuktival Süruntü**							
	Konjuktival Süruntü	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	0		2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
C8780159	**Herpes Simplex Virus (HSV) DNA Tip 1&2 (PCR), Plazma**							
	Plazma (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
C8780160	**Herpes Simplex Virus (HSV) DNA Tip 1&2 (PCR), Serum**							
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
C8780161	**Herpes Simplex Virus (HSV) DNA Tip 1&2 (PCR), Servikal Süruntü**							
	Servikal Süruntü	**Nucliswab**	0		2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
C8780162	**Herpes simplex virus (HSV) DNA Tip 1&2 (PCR), Vezikül Sıvısı**							
	Vezikül Sıvısı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	0		2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
C8669501	**Herpes Simplex Virus (HSV) Tip 1 Antikoru, IgG**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	EİA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8669502	**Herpes Simplex Virus (HSV) Tip 1 Antikoru, IgM**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	EİA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8669601	**Herpes Simplex Virus (HSV) Tip 2 Antikoru, IgG**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	EİA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8669602	**Herpes Simplex Virus (HSV) Tip 2 Antikoru, IgM**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	EİA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8666400	**Heterofil Antikor (Monospot)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.2	mL	2-8°C	AGLUTİNASYON	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kabul edilmez.							

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8670302	**HIV Antikoru (1/2) + p24 Antijeni [1] [3]**							
	Plazma (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	1	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8749155	**Hızlı Üreyen Tüberküloz Dışı Mycobacteri Antibiyotik Duyarlılığı**							
	Genç Bakteri Kökeni	**Kültür Plağı**	0		18-24°C	MİKRODİLÜSYON	Pzt-Cmt 08:00	1 hafta sonra 18:00
C8443004	**Hidroksipiren**							
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	2	mL	2-8	HPLC	Pzt-Cum 08:00	8 gün sonra
C8378903	**Hipoksantin, İdrar [2]**							
	Spot İdrar, Dondurulmuş	**Plastik Kap**	5	mL	<0°C	LC-MS/MS	Sal 08:00	2 hafta sonra
	24 Saatlik İdrar, Dondurulmuş	**Plastik Kap**	5	mL	<0°C	LC-MS/MS		
	24 Saatlik İdrar, Dondurulmuş: Örnek hemen dondurulmalıdır.							
	Spot İdrar, Dondurulmuş: Örnek hemen dondurulmalıdır.							
C8392109	**Hippürik Asit/Kreatinin Oranı, İdrar (Spot)**							
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	2	mL	2-8°C	HPLC	Pzt-Cum 08:00	8 gün sonra
C8308801	**Histamin [3]**							
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	<0°C	LC-MS/MS	Per 08:00	Cum 18:00
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş: Test için EDTA-plazma örneği gerekmektedir. Örnek alındıktan sonra kısa süre içerisinde soğutuculu santrifüjde plazmanın ayrılması sağlanmalıdır. Soğutuculu santrifüj yoksa; örnek, su-buz karışımı içeren bir kabın içerisinde bekletilerek plazmanın ayrılması sağlanır ve plazma hemen dondurulur. Soğuk zincir kritik öneme sahiptir. Hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kabul edilmez.							
C8308803	**Histamin, Gaita**							
	Yüksek doz Biotin kullanımı test sonuçlarını etkileyebilir.5 mg/gün üzerinde biotin kullananların test öncesi en az 1 gün ara vermesi önerilir.							
	Gaita, Dondurulmuş	**Plastik Kap**	5	gr	<0°C	EIA	Per 08:00	2 hafta sonra
C8308804	**Histamin/Kreatinin Oranı, İdrar (Spot)**							
	Spot İdrar, Dondurulmuş	**Plastik Kap**	10	mL	<0°C	LC-MS/MS	Per 08:00	Cum 18:00
C8681605	**HLA B27 Alttiplendirme [2]**							
	Bu test için Genetik Onam Formu doldurulmalıdır.							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	6	mL	18-24°C	PCR-SSP	Sal 08:00	2 hafta sonra

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8681603 **HLA B27 (Flow Sitometri)**								
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cum 08:00	2 gün sonra 18:00
C8260702 **Holotranskobalamin** [2]								
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	2	mL	<0°C	CLIA	Sal 08:00	Çar 18:00
C8391810 **Homogentisik Asit/Kreatinin Oranı, İdrar (Spot)**								
	Spot İdrar, Dondurulmuş	**Plastik Kap**	10	mL	<0°C	GC-MS	Sal 08:00 Per 08:00 Cmt 08:00	Pzt 18:00 Çar 18:00 Cum 18:00
C8219901 **Homosistein**								
	Plazma (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	1	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Sal 18:00 Per 18:00 Pzt 18:00
	Plazma (EDTA): Örnek alındıktan sonra uygun santrifüj koşullarında plazma hemen ayrılmalıdır. Ayrılmaz ise test sonuçlarında yalancı yükseklikler görülebilmektedir. Eğer hemen ayrılamıyor ise de alınan kan örneği buz içerisinde maksimum 1 saat bekletilebilir.							
C8315001 **Homovanilik Asit (HVA) (24 saat)** [1] [3]								
	24 Saatlik İdrar, (HCl ile)	**24 Saatlik İdrar Kabı**	5	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Pzt 08:00 Per 08:00	Sal 18:00 Cum 18:00
	24 Saatlik İdrar, (HCl ile): İdrar koruyucusu olarak 10 mL, 6 N HCl kullanılmalıdır.							
C8315002 **Homovanilik Asit (HVA)/Kreatinin Oranı, İdrar (Spot)**								
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	5	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Pzt 08:00 Per 08:00	Sal 18:00 Cum 18:00
C8780008 **HPV DNA Tiplendirme (PCR), Biyopsi Materyali**								
	HPV DNA Tiplendirme (PCR) testi; HPV 6, HPV 11, HPV 16, HPV 18, HPV 26, HPV 31, HPV 33, HPV 35, HPV 39, HPV 42, HPV 43, HPV 44, HPV 45, HPV 51, HPV 52, HPV 53, HPV 56, HPV 58, HPV 59, HPV 66, HPV 68, HPV 73, HPV 81 ve HPV 82 tiplerini içermektir.							
	Biyopsi Materyali	**Plastik Kap**	0		2-8°C	PCR	Pzt-Cum 12:00	10 gün sonra
C8818099 **HPV DNA Tiplendirme (PCR), Konsantre İdrar**								
	HPV DNA Tiplendirme (PCR) testi; HPV 6, HPV 11, HPV 16, HPV 18, HPV 26, HPV 31, HPV 33, HPV 35, HPV 39, HPV 42, HPV 43, HPV 44, HPV 45, HPV 51, HPV 52, HPV 53, HPV 56, HPV 58, HPV 59, HPV 66, HPV 68, HPV 73, HPV 81 ve HPV 82 tiplerini içermektir.							
	İdrar	**Steril Tüp**	30	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 12:00	7 gün sonra

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR	TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8780010	**HPV DNA Tiplendirme (PCR), Liqui-Prep**						
	HPV DNA Tiplendirme (PCR) testi; HPV 6, HPV 11, HPV 16, HPV 18, HPV 26, HPV 31, HPV 33, HPV 35, HPV 39, HPV 42, HPV 43, HPV 44, HPV 45, HPV 51, HPV 52, HPV 53, HPV 56, HPV 58, HPV 59, HPV 66, HPV 68, HPV 73, HPV 81 ve HPV 82 tiplerini içermektir.						
	Liqui-Prep	**Laboratuvara danışınız**	0	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 12:00	10 gün sonra
C8780011	**HPV DNA Tiplendirme (PCR), Parafin Kesit**						
	HPV DNA Tiplendirme (PCR) testi; HPV 6, HPV 11, HPV 16, HPV 18, HPV 26, HPV 31, HPV 33, HPV 35, HPV 39, HPV 42, HPV 43, HPV 44, HPV 45, HPV 51, HPV 52, HPV 53, HPV 56, HPV 58, HPV 59, HPV 66, HPV 68, HPV 73, HPV 81 ve HPV 82 tiplerini içermektir.						
	Parafin Kesit	**Plastik Kap**	0	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 12:00	10 gün sonra
C8780012	**HPV DNA Tiplendirme (PCR), Sürüntü**						
	HPV DNA Tiplendirme (PCR) testi; HPV 6, HPV 11, HPV 16, HPV 18, HPV 26, HPV 31, HPV 33, HPV 35, HPV 39, HPV 42, HPV 43, HPV 44, HPV 45, HPV 51, HPV 52, HPV 53, HPV 56, HPV 58, HPV 59, HPV 66, HPV 68, HPV 73, HPV 81 ve HPV 82 tiplerini içermektir.						
	Sürüntü	**Nucliswab**	0	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 12:00	10 gün sonra
	Sürüntü: HPV örnekleri derin sürüntü/kazıntı olarak alınmalı ve nucli swap ile transfer edilmelidir.						
C8780013	**HPV DNA Tiplendirme (PCR), Thin Prep**						
	HPV DNA Tiplendirme (PCR) testi; HPV 6, HPV 11, HPV 16, HPV 18, HPV 26, HPV 31, HPV 33, HPV 35, HPV 39, HPV 42, HPV 43, HPV 44, HPV 45, HPV 51, HPV 52, HPV 53, HPV 56, HPV 58, HPV 59, HPV 66, HPV 68, HPV 73, HPV 81 ve HPV 82 tiplerini içermektir.						
	Thin Prep	**Thin Prep**	0	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 12:00	10 gün sonra
C8668801	**HTLV-I/II Antikoru ²**						
	Serum	**Jelli Tüp**	1 mL	2-8°C	EİA	Sal 08:00	2 hafta sonra
C8669604	**Human Herpes Virus Tip 6 Antikoru, IgG ²**						
	Serum	**Jelli Tüp**	1 mL	2-8°C	EİA	Sal 08:00	1 hafta sonra
C8669603	**Human Herpes Virus Tip 6 Antikoru, IgM ²**						
	Serum	**Jelli Tüp**	1 mL	2-8°C	EİA	Sal 08:00	1 hafta sonra
C8732709	**Human Herpes Virus 6 (HHV 6) DNA (PCR), BOS, Kantitatif**						
	BOS	**BOS Tüpü**	1 mL	2-8°C	PCR	Pzt 08:00 Çar 08:00 Per 08:00	Sal 18:00 Per 18:00 Cum 18:00

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8780199	**Human Herpes Virus 6 (HHV 6) DNA (PCR), Kantitatif**							
	Balgam	**Plastik Kap**	0		2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	4 gün sonra
	Biyopsi Materyali	**Plastik Kap**	5	gr	2-8°C	PCR		
	Tam Kan (EDTA) (PCR)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	PCR		
C8780018	**Human Herpes Virus 8 (HHV 8) DNA (PCR), Biyopsi Materyali**							
	Biyopsi Materyali	**Plastik Kap**	0		2-8°C	PCR	Pzt 08:00 Cum 08:00	4 gün sonra
C8780194	**Human Herpes Virus 8 (HHV 8) DNA (PCR), Diğer Örnekler**							
	Diğer	**Laboratuvara danışınız**	0		2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
C8780019	**Human Herpes Virus 8 (HHV 8) DNA (PCR), Parafin Kesit**							
	Parafin Kesit	**Plastik Kap**	0		2-8°C	PCR	Pzt 08:00 Cum 08:00	1 hafta sonra
C8780020	**Human Herpes Virus 8 (HHV 8) DNA (PCR), Serum**							
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
C8780021	**Human Herpes Virus 8 (HHV 8) DNA (PCR), Tam Kan**							
	Tam Kan (EDTA) (PCR)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
C8753901	**Human Immunodeficiency Virus (HIV1) RNA, Kantitatif** [1] [3]							
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	<0°C	PCR	Sal 08:00 Per 08:00	Çar 18:00 Cum 18:00

Plazma (EDTA), Dondurulmuş: Test için EDTA-Plazma gerekmektedir.
Plazma ayrıldıktan sonra kısa süre içerisinde dondurulmalıdır.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8905008	**Hücre Sayımı / Tiplendirme (Vücut sıvıları- Otomatize)**							
	BOS	**EDTA-Mor Kapak**	6	mL	18-24°C	OTOMATİZE HÜCRE SAYIM SİSTEMİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Bronkoalveoler Lavaj	**EDTA-Mor Kapak**	6	mL	18-24°C	OTOMATİZE HÜCRE SAYIM SİSTEMİ		
	Perikardiyal Sıvı	**EDTA-Mor Kapak**	6	mL	18-24°C	OTOMATİZE HÜCRE SAYIM SİSTEMİ		
	Periton Sıvısı	**EDTA-Mor Kapak**	6	mL	18-24°C	OTOMATİZE HÜCRE SAYIM SİSTEMİ		
	Plevra Sıvısı	**EDTA-Mor Kapak**	6	mL	18-24°C	OTOMATİZE HÜCRE SAYIM SİSTEMİ		
	Sinoviyal sıvı	**EDTA-Mor Kapak**	6	mL	18-24°C	OTOMATİZE HÜCRE SAYIM SİSTEMİ		
C8905007	**Hücre Sayımı, BOS**							
	BOS	**BOS Tüpü**	0		18-24°C	MİKROSKOPİ	Pzt-Cmt 14:00	Pzt-Cmt 18:00
	BOS: BOS örneği, herhangi bir madde içermeyen steril tüp veya kaplara alınmalıdır.BOS örneği fazla bekletilmeden çalışılması gereken bir örnektir.Alındıktan sonra zaman kaybetmeksizin laboratuvara ulaştırılması gerekir.Hücre sayımı Neubauer sayma kamarasında yapılmaktadır.Donmuş veya pıhtılı örnekler uygun değildir.Örneğin steril olmayan ya da sızdıran kapla laboratuvara gönderilmesi uygun değildir.							
C8905005	**Hücre Sayımı, Vücut Sıvıları**							
	Biyolojik Sıvı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	1	mL	18-24°C	MİKROSKOPİ	Pzt-Cmt 14:00	Pzt-Cmt 18:00
	Biyolojik Sıvı: Donmuş veya pıhtılı örnekler uygun değildir. Vücut sıvıları (plevra sıvısı, periton sıvısı, eklem sıvısı, vb) ek olarak EDTA lı tüpe de alınmalıdır.							
C8905002	**Hücre Tiplendirmesi, BOS**							
	BOS	**BOS Tüpü**	0.5	mL	18-24°C	MİKROSKOPİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	BOS: Örnek Alım Özellikleri: BOS örneği, herhangi bir madde içermeyen steril tüp veya kaplara alınmalıdır.BOS örneği fazla bekletilmeden çalışılması gereken bir örnektir.Alındıktan sonra zaman kaybetmeksizin laboratuvara ulaştırılması gerekir. Uygun olmayan koşullar: Donmuş veya pıhtılı örnekler.Örneğin steril olmayan ya da sızdıran kapla laboratuvara ulaşması uygun değildir.							
C8905006	**Hücre Tiplendirmesi, Vücut Sıvıları**							
	Biyolojik Sıvı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	1		18-24°C	MİKROSKOPİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Biyolojik Sıvı: Donmuş veya pıhtılı örnekler uygun değildir.Vücut sıvıları (plevra sıvısı, periton sıvısı, eklem sıvısı, vb) ek olarak EDTA lı tüpe de alınmalıdır.							
C8278401	**IgA**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.2	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cum 12:00 Cmt 12:00	Pzt-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8278405	**IgA Subgrupları**							
	Test içeriğinde; IgA1 ve IgA2 bulunmaktadır.							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1	mL	<0°C	TÜRBİDİMETRİ	Per 08:00	15 gün sonra

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR	TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8278404 **IgD**							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1 mL	2-8°C	TÜRBİDİMETRİ	Per 08:00	Cum 18:00
C8278501 **IgE, Total**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3 mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8352011 **IGF Bağlayan Protein (IGF-BP-3)**							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1 mL	<0°C	CLIA	Sal 08:00 Per 08:00	Çar 18:00 Cum 18:00
C8278402 **IgG**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.2 mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cum 12:00 Cmt 12:00	Pzt-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8278410 **IgG, BOS**							
	BOS	**BOS Tüpü**	1 mL	2-8°C	NEFELOMETRİ	Sal 08:00 Çar 08:00 Per 08:00	1 hafta sonra 18:00
C8623529 **IgG Lambda spesifik MALDI-TOF Analizi**							
	Serum	**Jelli Tüp**	5 mL	2-8°C	MALDI-TOF+IFE	Çar 08:00	6 gün sonra
C8278701 **IgG Subgrupları**							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1 mL	<0°C	NEFELOMETRİ	Per 08:00	Cum 18:00
	Serum, Dondurulmuş: Bu test altında; -IgG1, -IgG2, -IgG3, -IgG4 yer almaktadır.						
C8278702 **IgG1**							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1 mL	<0°C	NEFELOMETRİ	Per 08:00	Cum 18:00
C8278703 **IgG2**							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1 mL	<0°C	NEFELOMETRİ	Per 08:00	Cum 18:00
C8278704 **IgG3**							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1 mL	<0°C	NEFELOMETRİ	Per 08:00	Cum 18:00

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8278705	**IgG4**							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1	mL	<0°C	NEFELOMETRİ	Per 08:00	Cum 18:00
C8278403	**IgM**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.2	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8671002	**Influenza A Antikoru, IgG ²**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	EİA	Sal 08:00	1 hafta sonra
C8779846	**Influenza A, B, H1N1 RNA (Multiplex PCR)**							
	Balgam	**Plastik Kap**	0		2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	2 gün sonra
	Bronkoalveoler Lavaj	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	1	mL	2-8°C	PCR		
	Doku	**Plastik Kap**	0		2-8°C	PCR		
	Nazofaringeal Aspirat	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	1	mL	2-8°C	PCR		
	Nazofarinks Süruntüsü	**Nucliswab**	0		2-8°C	PCR		
	Transtrakeal Aspirat	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	1	mL	2-8°C	PCR		
	Nazofarinks Süruntüsü: Alınan süruntü örnekleri nucli swap ile transfer edilmelidir.							
C8740001	**Influenza Antijeni (A ve B)**							
	Örnek almak için Rayon / dacron swab kullanılmalıdır.Tahta çubuklu, pamuk swablar testi interfere edebileceği için kullanılmamalıdır.Boğaz süruntüsü: Rayon swab üstte işaretli olan yerden dikkatlice açılır.Swab çıkarılarak tonsiller ve farinkse kuvvetlice sürülerek örnek alınır.Ağızdan çıkarılan swab örnek alınan kısım dibe gelecek şekilde steril tüp içerisine veya kağıt ambalajın içine konur.Üst kısım kapatılarak derhal laboratuvara gönderilir.Nasofarinks süruntüsü : Örnek hekim tarafından alınmalıdır.Özel dacron nasofarinks swabı kullanılarak burun ve nasofarinks mukoza yüzeyine kuvvetlice sürterek örnek alınır.Burundan çıkarılan swab, örnek alınan kısım dibe gelecek şekilde steril tüp içerisine veya kağıt ambalajına yerleştirilir.Nasal salgı: Akıntı aspire edilir ve steril örnek kabına aktarılır.Balgam: Öksürük ile alınan balgam steril örnek kabına alınır.							
	Balgam	**Plastik Kap**	0		2-8°C	İMMUNOKROMATOGRAFİ	Pzt-Cmt	2 saat sonra
	Boğaz Süruntüsü	**Dacron/ Rayon Swab**	0		2-8°C	İMMUNOKROMATOGRAFİ		
	Burun Salgısı	**Dacron/ Rayon Swab**	0		2-8°C	İMMUNOKROMATOGRAFİ		
	Nazofaringeal Aspirat	**Dacron/ Rayon Swab**	0		2-8°C	İMMUNOKROMATOGRAFİ		
	Nazofarinks Süruntüsü	**Dacron/ Rayon Swab**	0		2-8°C	İMMUNOKROMATOGRAFİ		
C8671003	**Influenza B Antikoru, IgA ²**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	EİA	Sal 08:00	1 hafta sonra
C8780228	**Invitro T Lenfosit Aktivasyonu Testi**							
	Testin çalışılması için taze örnek gerekmektedir. Örnek alınmadan önce mutlaka laboratuvar ile iletişime geçilmelidir. Örnekler yalnızca Pazartesi günü kabul edilmektedir.							
	Tam Kan (Heparin)	**Heparin-Yeşil Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Sal 08:00	1 hafta sonra

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR	TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8925643	**IVF Başlangıç Paketi (Erkek)**						
	Test içeriğinde; HIV (1&2) antikoru + p24 antijeni, Hepatit Bs Antijeni (HBsAg), Hepatit C Antikoru (anti-HCV) yer almaktadır.						
	Plazma (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	2 mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8925642	**IVF Başlangıç Paketi (Kadın)**						
	Test içeriğinde; Glukoz, Açlık, Hemoglobin A1c (HbA1c), Tam Kan Sayımı, Tiroid Stimülan Hormon (TSH), Triiodotironin, Serbest (FT3), Tiroksin, Serbest (FT4), Vitamin B12, Vitamin D, 25-Hidroksi, HIV (1&2) antikoru + p24 antijeni, Hepatit Bs Antikoru (anti-HBs), Hepatit C Antikoru (anti-HCV), Folik asit yer almaktadır. Test panelinde tanımlı tüm örnek türleri gereklidir.						
	Plazma (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	0			Pzt-Cmt 08:00	Pzt-Cmt 18:00
	Plazma (NaF)	**Florür-Gri Kapak**	0				
	Serum	**Jelli Tüp**	0				
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak (HbA1c)**	0				
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak (CBC)**	0				
C8925645	**IVF Tiroid Paneli**						
	Test içeriğinde; Tiroid Stimülan Hormon (TSH), Triiodotironin, Serbest (FT3), Tiroksin, Serbest (FT4) yer almaktadır.						
	Serum	**Jelli Tüp**	2 mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Mon-Sat 12:00
C8100201	**İdrar Analizi, Tam**						
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	5 mL	18-24°C	MİKROSKOPİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8708601	**İdrar Kültürü**						
	Steril İdrar	**Plastik Kap**	2 mL	2-8°C	K/T/D	Pzt-Cmt 12:00	3 gün sonra 17:00
	Steril İdrar: Alınacak idrar örnekleri; orta idrar, kateter, sistoskopik veya suprapubik idrar örnekleridir. Eğer örnek invaziv bir yöntemle alınmış ise mutlaka belirtilmelidir. Sabah idrarının ya da mesanede en az 3 saat beklemiş idrarın alınması uygundur. Kadınlarda orta idrar alımı: Öncelikle eller yıkanmalıdır. Genital bölge önden arkaya doğru yıkanır. Daha sonra steril temizlik mendilleriyle önden arkaya doğru temizlenir. Steril gazlı bezle kurulanır. İdrarın ilk kısmı tuvalete boşaltılır. Orta idrar kısmı (5-10ml) steril idrar kabına alınır. İdrarın son kısmı tuvalete boşaltılır. Erkeklerde orta idrar alımı: Öncelikle eller yıkanmalıdır. Genital bölge yıkanır. Üretra ağzı steril temizlik mendilleriyle temizlenir. Steril gazlı bezle kurulanır. İdrarın ilk kısmı tuvalete boşaltılır. Orta idrar kısmı (5-10ml) steril idrar kabına alınır. İdrarın son kısmı tuvalete boşaltılır. Suprapubik aspirasyonla idrar örneği alımı: Akşam saat 24.00' den sonra mesane boşaltılmaz. Sabah bol sıvı içirilir. Bundan yaklaşık 3 saat sonra dezenfekte edilmiş suprapubik bölgeden örnek alınır. *Tüm idrar kültürü örnekleri; steril kaplara alınmalıdır. Kültürde üreme olduğunda otomatize cihazlar yardımıyla identifikasyon ve antibiyotik duyarlılık testleri çalışılmakta ve MİK değerleri ile birlikte verilmektedir. Uygun olmayan koşullar: Steril olmayan ya da sızdıran kapla örneğin laboratuvara ulaşması, 24 saat içerisinde birden fazla örnek alınması, örneğin laboratuvara transportunun gecikmesi (oda ısısında 2 saatten fazla, ya da 2-8°C) de 24 saatten fazla beklemiş olması, kateter torbasından örnek alınmış olması). Dondurulmuş örnekler kabul edilmez.						
C8557603	**İlaç Duyarlılık ve Direnç Testi-Abciximab**						
	Kullanılan ilaçları gösteren hasta takip formu mutlaka doldurulmalıdır. Örnek alındıktan sonra örnek en fazla 3 saat içinde laboratuvara ulaşmış olmalıdır. Örneklerin kurye saatine yakın alınması önerilir.						
	Tam Kan	**Laboratuvara danışınız**	2 mL	18-24°C	AGREGOMETRİ	Pzt-Per 08:00 Cum-Cmt 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8557604	**İlaç Duyarlılık ve Direnç Testi-Aspirin**							
	Kan örneği vacutainer sistemle hirudinli tüplere alınmalı ve en fazla 3 saat içinde laboratuvara ulaşmış olmalıdır. Örneklerin kurye saatine yakın alınması önerilir. Antiplatelet ilaçlar için hasta takip formu mutlaka doldurulmalıdır.							
	Tam Kan	**Laboratuvara danışınız**	2	mL	18-24°C	AGREGOMETRİ	Pzt-Per 08:00 Cum-Cmt 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8557605	**İlaç Duyarlılık ve Direnç Testi-Clopidogrel**							
	Kan örneği vacutainer sistemle hirudinli tüplere alınmalı ve en fazla 3 saat içinde laboratuvara ulaşmış olmalıdır.Örneklerin kurye saatine yakın alınması önerilir. Antiplatelet ilaçlar için hasta takip formu mutlaka doldurulmalıdır.							
	Tam Kan	**Laboratuvara danışınız**	2	mL	18-24°C	AGREGOMETRİ	Pzt-Per 08:00 Cum-Cmt 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8666805	**İlaç Duyarlılık ve Direnç Testi-Prasugrel**							
	Kan örneği vacutainer sistemle hirudinli tüplere alınmalı ve en fazla 3 saat içinde laboratuvara ulaşmış olmalıdır. Örneklerin kurye saatine yakın alınması önerilir. Antiplatelet ilaçlar için hasta formu mutlaka doldurulmalıdır. Hemolizli, pıhtılı veya lipemik örnekler kabul edilemez.							
	Tam Kan	**Laboratuvara danışınız**	2	mL	18-24°C	AGREGOMETRİ	Pzt-Per 08:00 Cum-Cmt 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8633403	**İmmünfiksasyon Elektroforezi, BOS**							
	BOS	**BOS Tüpü**	3	mL	2-8°C	ELEKTROFOREZ	Çar 08:00 Cum 08:00	Pzt 18:00 Çar 18:00
C8633406	**İmmünfiksasyon Elektroforezi (İFE), İdrar (24 saat), Kalitatif**							
	24 Saatlik İdrar	**24 Saatlik İdrar Kabı**	10	ml	2-8°C	ELEKTROFOREZ	Pzt-Cmt 08:00	5 gün sonra
C8818091	**İmmünfiksasyon Elektroforezi (İFE), İdrar (24 saat), Kantitatif Hafif Zincirler**							
	24 Saatlik İdrar	**24 Saatlik İdrar Kabı**	10	mL	2-8°C	ELEKTROFOREZ	Pzt-Cmt 08:00	5 gün sonra 18:00
C8633408	**İmmünfiksasyon Elektroforezi (İFE), İdrar (24 saat), Kantitatif Serbest Hafif Zincirler**							
	24 Saatlik İdrar	**24 Saatlik İdrar Kabı**	10	mL	2-8°C	ELEKTROFOREZ	Pzt 08:00 Çar 08:00	Sal 18:00 Per 18:00
C8633405	**İmmünfiksasyon Elektroforezi (İFE), Serum, Kalitatif**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	ml	2-8°C	ELEKTROFOREZ	Pzt-Cmt 08:00	5 gün sonra
C8633407	**İmmünfiksasyon Elektroforezi (İFE), Serum, Kantitatif Monoklonal Protein Belirlenmesi**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	ml	2-8°C	ELEKTROFOREZ	Pzt-Cmt 08:00	5 gün sonra

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8925655	**İmmünfiksasyon Elektroforezi (İmmünglobulin D) ²**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	ELEKTROFOREZ	Salı 08:00	1 hafta sonra
C8633404	**İmmünfiksasyon Elektroforezi (İmmünoglobülin E) ²**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	ELEKTROFOREZ	Sal 08:00	1 hafta sonra
C8500201	**İn vitro Kanama Zamanı**							
	Laboratuvara Danışınız	**.**	0		2-8°C	MANUEL	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8301821	**İndium, Gaita ²**							
	Gaita	**Plastik Kap**	2	gr	2-8°C	İCP-MS	Sal 08:00	2 hafta sonra
C8499921	**İnfliximab, Serum ²**							
	Serum	**Jelli Tüp**	3	mL	2-8°C	Floresans İmmunoassay(FIA)	Sal 08:00	2 hafta sonra
C8633601	**İnhibin A**							
	Hemolizli örnek analiz için kullanılmaz.							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1	mL	<0°C	ELİSA	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Çar 18:00 Cum 18:00 Pzt 18:00
C8352003	**İnhibin B**							
	Hemolizli örnek analiz için kullanılmaz.							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	0.5	mL	<0°C	EİA	Per 08:00	Cuma 18:00
C8352501	**İnsülin**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.2	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Örnek en az 8 saat açlıkta alınmalıdır.							

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8633701	**İnsülin Antikoru**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	RİA	Sal 08:00 Cum 08:00	Çar 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli, lipemik, ikterik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8043522	**İnsülin, (OGTT eşliğinde)**							
	Form	**.**	0			CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum	**Jelli Tüp**	0.2	mL	2-8°C	CLIA		
	Serum: Örnek en az 8 saat açlıkta alınmalıdır.Testin başlangıç saatleri 08:00-10:00 arasında olmalıdır.Örnek ile birlikte Fonksiyon Testleri Örnek Alma İzlem Formu da gönderilmelidir. Hemolizli örnekler de çalışılmamalıdır.							
C8352502	**İnsülin Rezistans İndeksi (HOMA-IR)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	FOTOMETRİ, CLİA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Test içeriğinde glukoz ve insülin yer almaktadır. Örnek en az 10-12 saat açlıkta alınmalıdır.							
C8043511	**İnsülin, Tokluk (2. Saat)**							
	Serum, Tokluk	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum, Tokluk: İnsülin, Tokluk , standart bir öğünden 2 saat sonra kan alınarak tayin edilir.							
C8043402	**İnsülin Tolerans Testi**							
	Form	**.**	0			FOTOMETRİ, CLİA	Per 08:00	Cum 18:00
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	FOTOMETRİ, CLİA		
	Serum: Bu test için önceden laboratuvardan randevu alınmalıdır.Örnek aç olarak alınmalıdır. Örnek ile birlikte Fonksiyon Testleri Örnek Alma İzlem Formu da gönderilmelidir.Büyüme hormonu için örnek dondurulmalıdır.Örnek almadan önce hasta 30 dk. istirahat ettirilir. Erişkinler için 0,05-0,15 U/kg İnsülin IV olarak verilir.İnsülin verilmeden hemen önce hastanın 0. dk. örneği alınır.İnsülin verildikten sonra 15., 30., 45. ve 60. dakikalarda kan örnekleri alınır.Alınan tüm kan örneklerinde glukoz ve GH testi, sadece 0., 30. ve 60 dk kan örneklerinde ise Kortizol testi çalışılır.							
C8043527	**İnsülin; 240.dakika (OGTT eşliğinde)**							
	Serum 240. Dakika	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8043528	**İnsülin; 30.dakika (OGTT eşliğinde)**							
	Serum 30. Dakika	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8043529	**İnsülin; 300.dakika (OGTT eşliğinde)**							
	Serum 300. Dakika	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8043530 **İnsülin; 90.dakika (OGTT eşliğinde)**								
	Serum 90. Dakika	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8684901 **İnterferon Beta Antikor ²**								
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	WB	Sal 08:00	2 hafta sonra
C8684910 **İnterferon Gamma ²**								
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	2	mL	<0°C	ELISA	Sal 08:00	1 hafta sonra
	Serum, Dondurulmuş: Serum örneği hemen ayrılmalı ve dondurulmalıdır.							
C8635302 **İnterleukin 1 Beta (IL-1B)**								
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1	mL	<0°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt 08.00	1 hafta sonra
C8635301 **İnterleukin-6 (IL-6)**								
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	0.5	mL	<0°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8635304 **İnterlökin-2 (IL-2) ²**								
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	2	mL	<0°C	FLOW SİTOMETRİ	Sal 08:00	1 hafta sonra
C8634001 **İntrinsik Faktör Antikoru**								
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	İFT	Çar 08:00	Per 18:00
C8378912 **İyot (I)/ Kreatinin Oranı, İdrar (Spot)**								
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	5	mL	2-8°C	İCP-MS	Pzt 08:00 Per 08:00	Cum 18:00 Sal 18:00
	Spot İdrar: İyot içeren kontrast madde veya ilaç alımı sonrası, örnek en az 5 gün sonra verilmelidir.							
C8378911 **İyot (I), Serum**								
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	ICP-MS	Pzt 08:00 Per 08:00	Cum 18:00 Sal 18:00
C8378913 **İyot, İdrar (24 saat)**								
	24 Saatlik İdrar	**24 Saatlik İdrar Kabı**	5	mL	2-8°C	ICP-MS	Pzt 08:00 Per 08:00	Cum 18:00 Sal 18:00
	24 Saatlik İdrar: İyot içeren kontrast madde veya ilaç alımı sonrası, örnek en az 5 gün sonra verilmelidir.							

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8690009	**İzohemaglutinin (Anti-A, Anti-B Titre)**							
	Serum ve EDTA Tam Kan	**Jelli Tüp + EDTA**	4	mL	2-8°C	JEL SANTRİFÜGASYON	Pzt-Cum 12:00	Pzt-Cum 18:00
C8732705	**İzopropanol, İdrar (Spot)**							
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	5	mL	2-8°C	GC-FİD	Çar 08:00	10 gün sonra
C8779836	**JC Virus DNA (PCR)**							
	İdrar	**Steril Tüp**	1	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	4 gün sonra
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş	**EDTA-Mor Kapak**	1	mL	<0°C	PCR		
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1	mL	<0°C	PCR		
C8780033	**JC Virus DNA (PCR), BOS, Kantitatif**							
	BOS	**BOS Tüpü**	1	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	Sal-Cmt 18:00
C8230001	**Kadmiyum (Cd)** [1] [3]							
	Tam Kan (Heparin)	**Sodyum Heparin-Lacivert Kapak**	2	mL	2-8°C	İCP-MS	Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00
C8230003	**Kadmiyum (Cd)/Kreatinin Oranı, Spot İdrar**							
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	5	mL	2-8°C	ICP-MS	Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00
C8230004	**Kadmiyum, İdrar (24 saat)**							
	24 Saatlik İdrar	**24 Saatlik İdrar Kabı**	5	mL	2-8°C	ICP-MS	Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00
C8210803	**Kalay (Sn)**							
	Plazma (Heparin)	**Sodyum Heparin-Lacivert Kapak**	3	mL	2-8°C	İCP-MS	Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8210807	**Kalay (Sn) / Kreatinin Oranı, Spot İdrar**							
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	5	mL	2-8°C	İCP-MS	Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00
C8230801	**Kalsitonin**							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1	mL	<0°C	CLIA	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Sal 18:00 Per 18:00 Pzt 18:00
	Serum, Dondurulmuş: Örnek en az 12 saat açlıkta alınmalıdır. Serum ayrıldıktan sonra 30 dakika içerisinde dondurulmalıdır.							
C8230800	**Kalsitonin, Washout**							
	Biyopsi Materyali	**Plastik Kap**	1	mL	<0°C	CLIA	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Sal 18:00 Per 18:00 Pzt 18:00
C8231001	**Kalsiyum (Ca)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Heparinli plazma da kullanılabilir. Kalsiyum ile şelat etkisinden dolayı EDTA'lı plazma kullanılmaz. Açlık örneği tercih edilmelidir. Kan örneği alınması esnasında turnike 1 dakikadan daha fazla süre ile uygulanmamalıdır.							
C8233001	**Kalsiyum, İyonize**							
	Serum	**Jelli (İyonize Ca)**	1	ml	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Kan örneği alınması esnasında zorunlu olmadıkça turnike uygulanmamalıdır. Zorunlu durumlarda turnike uygulanması 1 dakikayı geçmemelidir. Kanın hava ile temasını en aza indirebilmek için örneğin jelli tüp içerisine alınması ve santrifüj işleminden sonra tüp kapağının açılmadan transfer edilmesi önerilir.							
C8234002	**Kalsiyum(Ca), İdrar (24 saat)**							
	24 Saatlik İdrar, (HCl ile)	**24 Saatlik İdrar Kabı**	2	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	24 Saatlik İdrar, (HCl ile): İdrar koruyucusu olarak 10 mL, 6 N HCl kullanılmalıdır. Toplama esnasında idrar ışık görmeyen ve serin bir yerde bekletilmelidir.Toplanan idrar miktarı not edilmelidir.							
C8234003	**Kalsiyum / Kreatinin oranı, İdrar (Spot)**							
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	0.3	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8690001	**Kan grubu (AB0) + Reverse Gruplama**							
	Periferik Kök Hücre	**EDTA-Mor Kapak**	1	mL	2-8°C	JEL SANTRİFÜGASYON	Her gün	2 saat sonra
	Tam Kan (EDTA) (TM)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	JEL SANTRİFÜGASYON		

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8704004	**Kan Kültürü (Aerob-Anaerob)**							
	Tam Kan	**Kültür şişesi-Aerob**	0			KÜLTÜR	Pzt-Cmt 12:00	10 gün sonra 17:00
C8501301	**Kan Sayımı; Hematokrit**							
	Kapiller Kan	**Parmak Ucu**	0			MANUEL	Pzt-Cmt	2 saat sonra
C8278407	**Kappa Hafif Zinciri, İdrar (24 saat)**							
	24 Saatlik İdrar	**24 Saatlik İdrar Kabı**	5	mL	2-8°C	NEFELOMETRİ	Pzt 08:00 Çar 08:00	Sal 18:00 Per 18:00
C8278417	**Kappa Hafif Zinciri, Serum**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	NEFELOMETRİ	Pzt 08:00 Çar 08:00	Sal 18:00 Per 18:00
C8602105	**Karaciğer Otoimmün Profil**							
	Profil içeriğinde AMA M2, gp210, LC1, LKM1, SLA, Sp 100 testleri çalışılmaktadır.							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	İMMUNOBLOTTİNG	Pzt 08:00	Sal 18:00
C8015601	**Karbamezapin (Carbamazepine)**							
	Serum	**Jelsiz Tüp**	0.5	mL	2-8°C	PETİNİA	Pzt-Cmt 14:00	Pzt-Cmt 18:00
C8925714	**Karbapenemaz Tiplendirme Testi**							
	Genç Bakteri Kökeni	**Kültür Plağı**	0		18-24°C	İMMUNOKROMATOGRAFİ	Pzt-Cum 10:00	Pzt-Cum 18:00
C8499906	**Karnitin, Serbest**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Sal 08:00	Per 18:00
C8499904	**Karnitin, Total**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Sal 08:00	Per 18:00

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8254407 **Karnitin/Açilkarnitin Analizi (Tandem MS)**								
	Kapiller Kan	**Filtre Kağıdı**	0		18-24°C	LC-MS/MS	Pzt-Cum 08:00	3 gün sonra
	Kapiller Kan: Kapiller kan, 0-6 ay arasındaki bebeklerde topuk bölgesinden alınmalıdır. 1 yaşından büyük hastalarda ise el parmağından alınması tercih edilmektedir. 6 ay-1 yaş arasındaki çocuklarda örnek alınacak bölgeyi seçerken, hastanın ağırlığına göre karar verilmeli, ağırlığı 10 kg'dan az olan çocuklarda topuk bölgesi, fazla olanlarda el parmağı tercih edilmelidir. Kanın, kart üzerindeki işaretli bölgenin tamamı dolacak şekilde emdirilmesine dikkat edilmelidir. Topuktan alınacak örnekler için topuğun yan kısımları seçilmelidir. Örnek alındıktan sonra, kartlar yatay şekilde ve güneş ışığına maruz bırakılmadan oda sıcaklığında 2-3 saat kurutulmalıdır.							
	Metabolik tarama kapsamında; -Aminoasit metabolizması hastalıkları, -Üre siklüsü defektleri, -Organik asidemiler, -Yağ asidi oksidasyon defektleri araştırılmaktadır.							
	Hasta sonuçları, ayrıntılı bilgi içerecek şekilde raporlanmaktadır.							
C8707522 **Kateter Ucu Kültürü**								
	Kateter Ucu	**Plastik Kap**	0		2-8°C	K/T/D	Pzt-Cmt 12:00	4 gün sonra 17:00
	Kateter Ucu: Kateterin ciltten çıkış yeri alkolle silinir ve kateter steril bir pens kullanılarak çıkarılır. Kateterin ucundan itibaren 5 cm'lik bir parçası kesilerek steril bir kap içine konur.							
C8557615 **Kene Kaynaklı Ensefalit, IgG**								
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	EIA	Sal 12:00	14 gün
C8557616 **Kene Kaynaklı Ensefalit, IgM**								
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	EIA	Sal 12:00	14 gün
C8301809 **Kısa Zincirli Yağ Asitleri, Gaita**								
	Bu panel içerisinde; Asetik Asit, Propiyonik Asit, İ-Bütirik Asit, N-Bütirik Asit, İ-Valerik Asit, N-Valerik Asit, N-Kaproik Asit ve N-Heptanoik Asit bulunmaktadır.							
	Gaita, Dondurulmuş	**Plastik Kap**	10	gr	<0°C	GC	Cum 08:00	15 gün sonra
C8217506 **Kinürenik Asit/Kreatinin Oranı, İdrar (Spot)**								
	Spot İdrar, Dondurulmuş	**Plastik Kap**	2	mL	<0°C	LC-MS/MS	Cum 08:00	Pzt 18:00
C8351615 **Kistik Fibrozis Tarama Testi (IRT)**								
	Kapiller Kan	**Filtre Kağıdı**	0		18-24°C	FEİA	Sal 08:00 Per 08:00	Per 18:00 Sal 18:00
	Kapiller Kan: Kapiller kan, bu test için 0-1 ay arasındaki bebeklerde topuk bölgesinden alınmalıdır.Kanın, kart üzerindeki işaretli bölgenin tamamı dolacak şekilde sadece kartın ön yüzünden emdirilmesine dikkat edilmelidir.Topuktan alınacak örnekler için topuğun yan kısımları seçilmelidir.Örnek alındıktan sonra, kartlar yatay şekilde ve güneş ışığına maruz bırakılmadan oda sıcaklığında 2-3 saat kurutulmalıdır.1 aydan büyük hastalar için Kistik Fibrozis Hastalığı klinik şüphesi varsa Ter Testi veya genetik test yapılması önerilmektedir.							
C8600452 **Klobazam (Clobazam) ²**								
	Serum	**Jelsiz Tüp**	2	mL	2-8°C	HPLC	Sal 08:00	1 hafta sonra
C8029916 **Klonazepam (Clonazepam) ²**								
	Serum	**Jelsiz Tüp**	1	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Sal 08:00	1 hafta sonra
	Serum: Kan örneği separatör jel içermeyen tüplere alınmalıdır.							

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8243501 **Klor (Cl)**								
	Serum	**Jelli Tüp**	0.1	mL	2-8°C	İSE	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8243803 **Klor (Cl), Biyolojik Sıvı**								
	Biyolojik Sıvı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	0.5	mL	2-8°C	İSE	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8243802 **Klor (Cl), BOS**								
	BOS	**BOS Tüpü**	0.1	mL	2-8°C	İSE	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8243602 **Klor (Cl), İdrar (spot)**								
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	2	mL	2-8°C	İSE	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8243603 **Klor (Cl), İdrar (24 saat)**								
	24 Saatlik İdrar	**24 Saatlik İdrar Kabı**	2	mL	2-8°C	İSE	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8029938 **Klozapin (Clozapine)**								
	Serum	**Jelsiz Tüp**	1	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Çar 08:00	Per 18:00
	Serum: Kan örneği separatör jel içermeyen tüpe alınmalıdır.							
C8301801 **Kobalt (Co)**								
	Plazma (Heparin)	**Sodyum Heparin-Lacivert Kapak**	2	mL	2-8°C	İCP-MS	Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00
C8301808 **Kobalt (Co)/Kreatinin Oranı, İdrar (Spot)**								
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	5	mL	2-8°C	ICP-MS	Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00
C8249102 **Koenzim Q-10** [3]								
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Pzt 08:00	Sal 18:00
C8263302 **Kolestanol**								
	Plazma (Heparin), Dondurulmuş	**Heparin-Yeşil Kapak**	0.5	mL	<0°C	GC-MS	Pzt 08:00	2 hafta sonra

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8371801	**Kolesterol, HDL** [1]							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Örnek en az 8 saat açlıkta alınmalıdır.							
C8372102	**Kolesterol, LDL (Direkt)**							
	Örnek en az 8 saat açlıkta alınmalıdır.							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.2	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Örnek aç olarak alınmalıdır.							
C8246501	**Kolesterol, Total**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Örnek en az 8 saat açlıkta alınmalıdır.							
C8925639	**Kolesterol, Total, Biyolojik Sıvı**							
	Biyolojik Sıvı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	0.5	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8371901	**Kolesterol, VLDL**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.1	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Örnek aç olarak alınmalıdır.							
C8616011	**Kompleman C1q, Antijen** [3]							
	Hemolizli örnekler kabul edilmez.							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	NEFELOMETRİ	Per 08:00	Cum 18:00
	Serum: Hemolizli örnekler kabul edilmez.							
C8616002	**Kompleman C3**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	NEFELOMETRİ	Sal 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Pzt 18:00
C8616001	**Kompleman C4**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	NEFELOMETRİ	Sal 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Pzt 18:00
C8616005	**Kompleman C5** [3]							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	NEFELOMETRİ	Sal 08:00	1 hafta sonra

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8260704 **Kompleman H ²**								
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	<0°C	İMMUNOPRESİPİTASYON	Sal 08:00	21 gün sonra
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş: Test için EDTA-Plazma gerekmektedir. Kan alındıktan hemen sonra santrifüj edilerek plazma ayrılmalı ve hemen dondurulmalıdır. Örnek hemen laboratuvara transfer edilmelidir.							
C8412005 **Koproporfirin İzomerleri (I ve III) ²**								
	24 Saatlik İdrar	**24 Saatlik İdrar Kabı**	5	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Sal 08:00	1 hafta sonra
	24 Saatlik İdrar: Örnek ışıktan korunmalıdır. 24 saatlik idrar hacmi verilmelidir.							
C8253301 **Kortizol**								
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Kortizol için örnek alım saatleri sabah saat 07:00 - 09:00 ve öğleden sonra saat 15:00 - 17:00 dir.							
C8253002 **Kortizol, Serbest / Kreatinin Oranı, İdrar (Spot)**								
	İdrar serbest kortizol, plasma serbest kortizol seviyeleri ile yakın ilişkili göstermektedir ve adrenokortikal disfonksiyonun özellikle Cushing sendromu gibi farklı hastalıkları açısından hassas bir göstergesidir.							
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	5	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Çar 08:00	Per 18:00
C8253001 **Kortizol, Serbest (24 saat)**								
	24 Saatlik İdrar	**24 Saatlik İdrar Kabı**	5	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Çar 08:00	Per 18:00
C8253302 **Kortizol, Tükrük**								
	Tükürük	**Laboratuvara danışınız**	2	mL	<0°C	ECLİA	Çar 08:00	Per 18:00
	Tükürük: Tükrük örneği almak için özel tüpe ihtiyaç vardır.Özel tüp içindeki tükrük örneği, 2 dakika süreyle 1000xg de santrifüj edilmeli ve özel tüp içerisinde dondurulduktan sonra gönderilmelidir.Özel tüpleri Merkez Laboratuvar örnek kabul biriminden isteyiniz.							
C8414302 **Kortizon**								
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Per 08:00	Cum 18:00
	Serum: Örnek alım saatleri sabah saat 07:00 - 09:00 arasında olmalıdır.							
C8255001 **Kreatin Kinaz (CK), Total**								
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	ENZİMATİK	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8255401 **Kreatin Kinaz İzoenzimleri ³**								
	Hemolizli örnek kabul edilmez.							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	ELEKTROFOREZ	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8255300	**Kreatin Kinaz-MB (CK-MB), Kütle**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 14:00	Pzt-Cmt 18:00
C8256501	**Kreatinin**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8257504	**Kreatinin, Biyolojik Sıvı**							
	Biyolojik Sıvı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	1	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8257003	**Kreatinin, İdrar (Spot)**							
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	2	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8257004	**Kreatinin, İdrar (24 saat)**							
	24 Saatlik İdrar	**24 Saatlik İdrar Kabı**	2	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8257503	**Kreatinin, İdrar (24 saat) (15 Yaş Altı Bireyler)**							
	24 Saatlik İdrar	**24 Saatlik İdrar Kabı**	2	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8257501	**Kreatinin Klirensi**							
	Serum ve 24 Saatlik İdrar	**Jelli tüp ve 24 saatlik idrar kabı**	2	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum ve 24 Saatlik İdrar: Hastanın boy ve kilo bilgileride verilmelidir.							
C8257502	**Kreatinin Klirensi (15 Yaş Altı Bireyler)**							
	Serum ve 24 Saatlik İdrar	**Jelli tüp ve 24 saatlik idrar kabı**	2	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8258501	**Kriyofibrinojen**							
	Kan örneği; 37°C'lik etüvde 10 dk bekletilen 2 adet EDTA-Mor Kapak tüpe alınmalıdır. Tüpler, 37°C'de bekletilerek plazmanın kendiliğinden ayrılması sağlanır. Kendiliğinden ayrılan plazma 2 sekonder tüpe ve her tüpe en az 3 mL olacak şekilde aktarılır. Sekonder tüplere aktarılan plazma örneklerinin transferi oda sıcaklığında yapılmalı. Hemolizli ve lipemik örnek kabul edilmez.							
	Laboratuvara Danışınız	**EDTA-Mor Kapak**	6	mL	18-24°C	MANUEL	Pzt-Cum	1 hafta sonra
C8259501	**Kriyoglobülin**							
	Laboratuvara Danışınız	**Jelsiz Tüp**	8	mL	18-24°C	MANUEL	Pzt-Cum	1 hafta sonra
	Laboratuvara Danışınız: Kan örneği; 37°C'lik etüvde 10 dk bekletilen 2 adet 10 ml'lik jelsiz tüpe alınmalıdır. Tüpler, 37°C'de bekletilerek serumun kendiliğinden ayrılması sağlanır (santrijüj yapılarak serum ayrılmamalıdır). Kendiliğinden ayrılan serumlar 2 sekonder tüpe ve her tüpe en az 4 mL olacak şekilde aktarılır. Sekonder tüplere aktarılan serum örneklerinin transferi oda sıcaklığında yapılmalı. Hemolizli ve lipemik örnek kabul edilmez.”							

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8259502 **Kriyoglobülin, Kantitasyon ve Tiplendirme**								
	Serum	**Jelsiz Tüp**	5	mL	18-24°C	PRESİPİTASYON, İMMUNFİKSASYON	Sal 08:00 Çar 08:00 Per 08:00	2 hafta sonra 18:00
	Serum: Kriyoglobülin kantitasyon ve tiplendirilmesi, kalitatif olarak pozitif tespit edilen örneklerde uygulanmalıdır. 1 adet 10 ml'lik Jelsiz Tüp 37°C'de ısıtıldıktan sonra, kan alımı ve serum ayrıştırılması 37°C'de yapılmalıdır. Serum örneği oda sıcaklığında transfer edilmelidir. Örnek miktarı 5 ml'den az olmamalıdır.							
C8249501 **Krom (Cr)**								
	Tam Kan (Heparin)	**Sodyum Heparin-Lacivert Kapak**	2	mL	2-8°C	İCP-MS	Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00
C8249503 **Krom (Cr) / Kreatinin Oranı, İdrar (Spot)**								
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	5	mL	2-8°C	ICP-MS	Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00
C8631607 **Kromogranin A** [3]								
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	2	mL	<0°C	ELISA	Sal 08:00	2 hafta sonra
C8818041 **Kronik Myelomonositer Lösemi Paneli (KMML), Tam Kan**								
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır. Test içeriğinde; CD14, CD16, CD2, CD34, CD36, CD45, CD56, CD64 ve HLA-DR+ bulunmaktadır.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8392116 **Ksantürenik Asit / Kreatinin Oranı, İdrar**								
	Spot İdrar, Dondurulmuş	**Plastik Kap**	2	mL	<0°C	LC-MS/MS	Cum 08:00	Pzt 18:00
C8365501 **Kurşun (Pb)**								
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	AAS	Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	1 hafta sonra 18:00
C8365505 **Kurşun (Pb), İdrar (24 saat)**								
	24 Saatlik İdrar	**24 Saatlik İdrar Kabı**	5	mL	2-8°C	İCP-MS	Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8365504	**Kurşun (Pb) / Kreatinin Oranı, İdrar (Spot)**							
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	5	mL	2-8°C	ICP-MS	Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00
C8707501	**Kültür, Aerob (Tüm Örnek Tipleri)**							
	Ameliyat Materyali	**Laboratuvara danışınız**	0		2-8°C	K/T/D	Pzt-Cmt 12:00	6 gün sonra 17:00
	Biyolojik Sıvı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	1	mL	2-8°C	K/T/D		
	Biyopsi Materyali	**Plastik Kap**	0		2-8°C	K/T/D		
	Deri Materyali	**Laboratuvara danışınız**	0		2-8°C	K/T/D		
	Diğer	**Laboratuvara danışınız**	0		2-8°C	K/T/D		
	Doku	**Plastik Kap**	0		2-8°C	K/T/D		
	Eklem Sıvısı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	1	mL	2-8°C	K/T/D		
	Göbek Kordonu	**Plastik Kap**	0		2-8°C	K/T/D		
	Göz Salgısı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	0.5	mL	2-8°C	K/T/D		
	Kemik İliği	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	0		2-8°C	K/T/D		
	Kist Sıvısı	**Steril Tüp**	0		2-8°C	K/T/D		
	Kordosentez(Kordon Kanı)	**Jelsiz Tüp**	0		2-8°C	K/T/D		
	Kulak Akıntısı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	0		2-8°C	K/T/D		
	Mide Sıvısı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	1	mL	2-8°C	K/T/D		
	Nazofarinks Sürüntüsü	**Jelli Swap**	0		2-8°C	K/T/D		
	Perikardiyal Sıvı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	1	mL	2-8°C	K/T/D		
	Periton Sıvısı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	1	mL	2-8°C	K/T/D		
	Plevra Sıvısı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	1	mL	2-8°C	K/T/D		
	Prostat sıvısı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	0		2-8°C	K/T/D		
	Servikal Sürüntü	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	0		2-8°C	K/T/D		
	Tırnak Kazıntısı	**Plastik Kap**	0		2-8°C	K/T/D		
	Üretral Akıntı	**Jelli Swap**	0		2-8°C	K/T/D		
	Vulva	**Jelli Swap**	0		2-8°C	K/T/D		

Servikal Sürüntü: Örnek Alım Özellikleri: Steril bir swab yardımıyla serviks ağzı üzerindeki fazla mukus salgısı alınır.İkinci bir swab ile endoservikal kanala girilerek sürüntü örneği alınır.Swab vajen mukozasına temas ettirilmeden çıkarılır.Swab özel jelli besiyerine yerleştirilerek laboratuvara ulaştırılır.

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8707511	**Kültür, Anaerob**							
	Örnek Alım Özellikleri: Anaerob örnekler herhangi bir şekilde havayla temas etmemiş olarak laboratuvara özel anaerob transport kabında ya da steril enjektör içerisinde enjektörün ucunu kıvırarak, köpürtülmeden, hava almadan, gönderilmelidir.Uygun olan örnekler: Derin yara, steril sıvılar, apse, transtrakeal aspirat, doku, kan, kemik iliği, cerrahi sırasında ve spiral , over ve fallop tüplerinden(Actinomyces için) alınan örnekler.Uygun olmayan örnekler: Anaerob transport kabına aktarılmamış süründü örnekleri ya da sıvılar.Doku örnekleri dışında hava ile temas etmiş herhangi bir örnek türü anaerob kültür için uygun değildir.Normal anaerobik florası olan bölgelerden alınan, steril olmayan ya da sızdıran kaplara alınmış, laboratuvara transportu gecikmiş, buzdolabı ve derin dondurucuda beklemiş örnekler.							
	Biyolojik Sıvı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	5	mL	18-24°C	K/T/D	Pzt-Cmt 12:00	6 gün sonra 17:00
	Bronkoalveoler Lavaj	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	5	mL	18-24°C	K/T/D		
	Diğer	**Laboratuvara danışınız**	5	mL	18-24°C	K/T/D		
	Püy (cerahat)	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	5	mL	18-24°C	K/T/D		
	Transtrakeal Aspirat	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	5	mL	18-24°C	K/T/D		
C8360502	**Laktat, BOS**							
	BOS	**BOS Tüpü**	1	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8361501	**Laktat Dehidrogenaz (LDH)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8361505	**Laktat Dehidrogenaz (LDH), Biyolojik Sıvı**							
	Biyolojik Sıvı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	0.5	mL	18-24°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8361504	**Laktat Dehidrogenaz (LDH), BOS**							
	BOS	**BOS Tüpü**	0.2	mL	18-24°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	BOS: Örnek, oda ısısında transfer edilmeli ve oda ısısı koşullarında saklanmalıdır. Analiz mümkün olan en kısa sürede yapılır. Uzun süre beklemiş örnekler kabul edilmez.							
C8362501	**Laktat Dehidrogenaz (LDH) İzoenzimleri ³**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	ELEKTROFOREZ	Sal 08:00	1 hafta sonra
	Serum: Hemolizli örnekler kabul edilmez							
C8360503	**Laktat, Plazma**							
	Plazma (NaF)	**Florür-Gri Kapak**	1	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Plazma (NaF): Test için NaFl plazma örneği gerekmektedir. Hasta aç ve tamamen istirahat halinde olmalıdır. Örnek alınırken turnike uygulanmamalıdır. Örnek, alındıktan hemen sonra buzlu kap içerisine konulmalı ve plazma 15 dakika içinde ayrılmalıdır. Hemolizli örnek kullanılmaz.							

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8295110	**Laktoz Tolerans Testi**							
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00

Serum: Test öncesi hastanın en az 8-16 saatlik açlığı olmalıdır. 0. dakika (açlık) örneği alındıktan sonra, 1 g/kg laktoz hastaya 200-300 ml su içerisinde hazırlanıp içirilir. Hasta hazırlanan bu sıvıyı 5 dakika içerisinde içmelidir. Hastaya verilecek laktoz 50 g'dan fazla olmamalıdır. Ciddi laktaz eksikliğinden şüpheleniliyorsa, hastaya verilecek miktar daha düşük olmalıdır. Bu konuda hastanın hekiminden destek alınmalıdır.
Hastaya laktoz yüklenmesinden sonra; 30. 60. 120 ve 180. dakikalarda da kan örneği alınır.
Alınan tüm kan örneklerinden glukoz testi çalışılır.
Normal laktoz toleransında, 50 g laktoz yüklenmesi sonrasında glukoz seviyesinin, açlık glukoz seviyesinden 20 mg/dl'den daha fazla olması beklenirken, laktoz intoleransında artış 20 mg/dl'den daha azdır ve gastrointestinal semptomlar mevcuttur.

C8278418	**Lambda Hafif Zinciri, İdrar (24 saat)**							
	24 Saatlik İdrar	**24 Saatlik İdrar Kabı**	5	mL	2-8°C	NEFELOMETRİ	Pzt 08:00 Çar 08:00	Sal 18:00 Per 18:00
C8278408	**Lambda Hafif Zinciri, Serum**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	NEFELOMETRİ	Pzt 08:00 Çar 08:00	Sal 18:00 Per 18:00
C8029906	**Lamotrijin (Lamotrigine)**							
	Serum	**Jelsiz Tüp**	0.5	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Pzt 08:00 Per 08:00	Pzt 18:00 Per 18:00

Serum: Kan örneği, separatör jel içermeyen tüplere alınmalıdır.

C8708102	**Legionella Kültürü**							

Örnekler Laboratuvara steril bir kapta 2-8 °C'de gönderilmelidir.Örneklerin laboratuara ulaşması 48 saati geçecek ise örnek dondurularak gönderilmelidir.Örnekler oda sıcaklığında 2 saat, 2-8 °C'de 48 saat, dondurulmuş olarak 1 hafta stabildir.Örneklerde serum fizyolojik bulunmamalıdır.Ancak; BAL (bronkoalveolar lavaj) örneklerinde serum fizyolojik bulunabilir.Uygun olmayan örnekler: İdrar, gaita, yara veya solunum örneleri dışında kalan diğer kültür örnekleri uygun değildir.Kurumuş, serum fizyolojik, formol içerisinde kabul edilmiş ya da sızdıran örnekler de uygun değildir.

Balgam	**Steril Tüp**	0		2-8°C	KÜLTÜR	Pzt-Cmt 12:00	7 gün sonra 17:00
Biyolojik Sıvı	**Steril Tüp**	2	mL	2-8°C	KÜLTÜR		
Bronkoalveoler Lavaj	**Steril Tüp**	2	mL	2-8°C	KÜLTÜR		
Doku	**Steril Tüp**	0		2-8°C	KÜLTÜR		
Nazofarinks Sürüntüsü	**Jelli Swap**	0		2-8°C	KÜLTÜR		
Steril İdrar	**Plastik Kap**	5	mL	2-8°C	KÜLTÜR		
Transtrakeal Aspirat	**Steril Tüp**	2	mL	2-8°C	KÜLTÜR		

C8727801	**Legionella pneumophila Antijeni**							
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	5	mL	2-8°C	İMMUNOKROMATOGRAFİ	Pzt-Cum 08:00 Cmt 08:00	Sal-Cmt 18:00 Pzt 18:00

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8661506	**Legionella pneumophila Antikoru, IgG**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8661505	**Legionella pneumophila Antikoru (Tip 1), IgM**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8754201	**Legionella pneumophila DNA (PCR)**							
	Balgam	**Plastik Kap**	2	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
	Bronkoalveoler Lavaj	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	5	mL	2-8°C	PCR		
	Doku	**Plastik Kap**	0		2-8°C	PCR		
	Tam Kan (EDTA) (PCR)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	PCR		
	Transtrakeal Aspirat	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	5	mL	2-8°C	PCR		
C8779909	**Leishmania spp. DNA (PCR)**							
	Biyopsi Materyali	**Plastik Kap**	0		2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	4 gün sonra
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	0		2-8°C	PCR		
	Parafin Kesit	**Plastik Kap**	0		2-8°C	PCR		
	Tam Kan (EDTA) (PCR)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	PCR		
	Biyopsi Materyali: Biyopsi örnekleri nucliswap içinde gönderilmelidir. Parafin Kesit: 50 mikronluk kesitler gönderilmesi uygundur.							
C8818051	**Lenfoma Paneli, Kemik İliği**							
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır. Test içeriğinde; CD10, CD103, CD11c, CD16, CD19, CD2, CD20, CD200, CD23, CD25, CD3, CD305, CD4 (T-Lenfosit), CD43, CD45, CD5, CD7, CD8 (T-Lenfosit), FMC7, HLA-DR+, Kappa ve Lambda bulunmaktadır.							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün saonra
C8818050	**Lenfoma Paneli, Tam Kan**							
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır. Test içeriğinde; CD10, CD103, CD11c, CD16, CD19, CD2, CD20, CD200, CD23, CD25, CD3, CD305, CD4 (T-Lenfosit), CD43, CD45, CD5, CD7, CD8 (T-Lenfosit), FMC7, HLA-DR+, Kappa ve Lambda bulunmaktadır.							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8818052	**Lenfoma Paneli, Vücut Sıvıları**							
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır. Test içeriğinde; CD10, CD103, CD11c, CD16, CD19, CD2, CD20, CD200, CD23, CD25, CD3, CD305, CD4 (T-Lenfosit), CD43, CD45, CD5, CD7, CD8 (T-Lenfosit), FMC7, HLA-DR+, Kappa ve Lambda bulunmaktadır.							
	Biyolojik Sıvı	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8925687	**Lenfosit Alt Grupları, Kemik İliği**							
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir. Test içeriğinde; CD16+CD56+, CD19, CD3, CD4+, CD45, CD8+, CD4/CD8, Lenfosit (%), Lenfosit Sayısı ve Lökosit Sayısı bulunmaktadır.							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	3 gün sonra
C8925686	**Lenfosit Alt Grupları, Periferik Kan**							
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir.Örnek taze olmalıdır. Test içeriğinde; CD16+CD56+, CD19, CD3, CD4+, CD45, CD8+, CD4/CD8, Lenfosit (%), Lenfosit Sayısı ve Lökosit Sayısı bulunmaktadır.							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	3 gün sonra
C8925688	**Lenfosit Alt Grupları, Vücut Sıvıları**							
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir. Test içeriğinde; CD16+CD56+, CD19, CD3, CD4+, CD45, CD8+, CD4/CD8, Lenfosit (%), Lenfosit Sayısı ve Lökosit Sayısı bulunmaktadır.							
	Biyolojik Sıvı	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	3 gün sonra
C8352002	**Leptin ²**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	EİA	Sal 08:00	1 hafta sonra
	Serum: Kan örneği en az 12 saat açlıktan sonra alınmalıdır. Hemolizli, ikterik ve tokluk örnekleri analiz için uygun değildir. Hastanın boy ve kilo bilgileri de verilmelidir.							
C8672003	**Leptospira Antikoru, IgG ²**							
	Plazma (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	EİA	Sal 08:00	1 hafta sonra
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	EİA		
C8672004	**Leptospira Antikoru, IgM ²**							
	Plazma (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	EİA	Sal 08:00	1 hafta sonra
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	EİA		
C8029925	**Levetiracetam**							
	Serum	**Jelsiz Tüp**	0.5	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Pzt 08:00 Per 08:00	Pzt 18:00 Per 18:00
	Serum: Kan örneği, separatör jel içermeyen tüplere alınmalıdır.							

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8369001 **Lipaz**								
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	ENZİMATİK	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Örnek oda sıcaklığında tamamen pıhtılaştıktan sonra santrifüj edilmelidir.							
C8217203 **Lipoprotein (a) ³**								
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Örnek aç olarak alınmalıdır.							
C8371501 **Lipoprotein Elektroforezi ³**								
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	ELEKTROFOREZ	Çar 08:00	Cum 18:00
C8818096 **Listeria monocytogenes DNA (PCR), BOS**								
	BOS	**BOS Tüpü**	2	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cmt 08:00	2 gün sonra
C8818097 **Listeria monocytogenes DNA (PCR), Plazma**								
	Plazma	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8818098 **Listeria monocytogenes DNA PCR, Serum**								
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8017801 **Lityum (Lithium)**								
	Serum	**Jelsiz Tüp**	1	mL	2-8°C	İSE	Pzt-Cmt 14:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Kan örneği, separatör jel içermeyen tüplere alınmalıdır.							
C8554901 **Lizozim ²**								
	BOS	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	1	mL	2-8°C	RİD	Sal 08:00	2 hafta sonra
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	RİD		
C8636116 **Lökosit Adezyon Defekti Type 1 (LAD1)**								
	Örnek taze olmalıdır. Örnek alındıktan sonra 24 saat içinde laboratuvara ulaşmış olmalıdır.							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt 08:00 Sal 08:00 Çar 08:00 Per 08:00 Cum 08:00 Cmt 08:00	Çar 18:00 Per 18:00 Cum 18:00 Pzt 18:00 Sal 18:00 Sal 18:00

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8554001	**Lökosit Alkalen Fosfataz Boyası**							
	Örnek 8 saat içinde periferik yayma şeklinde yayılmalı ve yayma heparinli kan örneği ile birlikte gönderilmelidir.							
	Tam Kan (Heparin)	**Heparin-Yeşil Kapak**	5	mL	18-24°C	MİKROSKOPİ	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	1 hafta sonra
C8100202	**Lökosit Esteraz, Vücut Sıvıları**							
	Eklem Sıvısı	**Steril Tüp**	2	mL	2-8°C	MANUEL		
C8573201	**Lupus Antikoagulanı (LA)**							
	Sitratlı kan örneği 1500 g'de 15 dk santrifüj edildikten sonra ayrılan plazma örneği tekrar santrifüj edilmelidir (çift santrifüj). Plazma örneği en az iki ayrı tüpe bölünerek dondurulmalıdır.							
	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	**Sitrat-Mavi Kapak**	1	mL	<0°C	KOAGÜLOMETRİ	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8685002	**Lupus Erythematosus (LE) Hücresi**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	MİKROSKOPİ	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Sal 18:00 Per 18:00 Pzt 18:00
C8661107	**Lupus Paneli**							
	Test içeriğinde; ENA Profili, Anti-Fosfolipid Antikoru, IgG, Lupus Antikoagulanı (LA), Mitokondri Antikoru (AMA), Kompleman C4, Kompleman C3, Anti-ds DNA, EIA yer almaktadır. Test panelinde tanımlı tüm örnek türleri gereklidir.							
	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	**Sitrat-Mavi Kapak**	1	mL	<0°C		Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Pzt 18:00 Sal 18:00
	Serum	**Jelli Tüp**	3	mL	2-8°C			
C8300201	**Luteinizan Hormon (LH)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.2	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8373501	**Magnezyum (Mg)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Kan örneği alınması esnasında zorunlu olmadıkça turnike uygulanmamalıdır.Zorunlu durumlarda turnike uygulanması 1 dakikayı geçmemelidir.Örnekler 2 saat içerisinde santrifüjle ayrılmalıdır.							
C8373506	**Magnezyum (Mg), Eritrosit** [3]							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	ICP-MS	Sal 08:00 Cum 08:00	Cum 18:00 Pzt 18:00
	Tam Kan (EDTA): Test için EDTA-Tam kan gerekmektedir. Kan örneği alınması esnasında zorunlu olmadıkça turnike uygulanmamalıdır. Zorunlu durumlarda turnike uygulanması 1 dakikayı geçmemelidir.							

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8373505	**Magnezyum (Mg), İdrar (24 saat)**							
	24 Saatlik İdrar, (HCl ile)	**24 Saatlik İdrar Kabı**	2	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	24 Saatlik İdrar, (HCl ile): İdrar koruyucusu olarak 10 mL, 6 N HCl kullanılmalıdır.							
C8373507	**Magnezyum/Kreatinin Oranı, İdrar (Spot)**							
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	2	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8202405	**Makro Tiroid Stimülan Hormon (Makro TSH)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8215007	**Makroamilaz** [3]							
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	SPEKTROFOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8414602	**Makroprolaktin**							
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8720704	**Malaria (Plasmodium) Antijeni, Hızlı Test**							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	İMMUNOKROMATOGRAFİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8392101	**Mandelik Asit, İdrar (Spot)**							
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	10	mL	2-8°C	HPLC	Pzt-Cum 08:00	8 gün sonra
C8378501	**Mangan (Mn)**							
	Plazma (Heparin)	**Sodyum Heparin-Lacivert Kapak**	2	mL	2-8°C	İCP-MS	Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00
C8378504	**Mangan (Mn)/Kreatinin Oranı, İdrar (Spot)**							
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	5	mL	2-8°C	İCP-MS	Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8378500	**Mangan,İdrar (24 Saat)**							
	24 Saatlik İdrar	**24 Saatlik İdrar Kabı**	20	mL	2-8°C	ICP-MS	Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00
C8378502	**Mangan,Tam Kan (EDTA)**							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	İCP-MS	Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00
C8722001	**Mantar, Direkt Mikroskobik İnceleme**							
	Deri Kazıntısı	**Plastik Kap**	0		18-24°C	MİKROSKOPİ	Pzt-Cum 08:00 Cmt 08:00	Sal-Cmt 18:00 Pzt 18:00
	Diğer	**Plastik Kap**	0		2-8°C	MİKROSKOPİ		
	Oral Mukoza	**Swap**	0		2-8°C	MİKROSKOPİ		
	Saç Teli	**Plastik Kap**	0		18-24°C	MİKROSKOPİ		
	Tırnak Kazıntısı	**Plastik Kap**	0		18-24°C	MİKROSKOPİ		
	Vaginal Akıntı	**Swap**	0		2-8°C	MİKROSKOPİ		

Tırnak Kazıntısı: İncelemenin etkinliğinin arttırılması için lokal ya da sistemik antifungal tedavi başlanmadan önce örnek alınmalıdır. İşlem öncesi tırnaklar %70 alkol ile temizlenmelidir. Distal subungual onikomikozda tırnaklar kesildikten sonra, küçük bir küret ya da bisturi yardımıyla tırnak yatağından, buradaki sarıbeyaz kırılgan keratin artıklarından ve olabildiğince proksimalden kazınarak alınmalıdır. Proksimal subungual onikomikozda tırnağın enfekte alt katmanlarına ulaşabilmek için, sağlıklı üst katmanlar soyulmalıdır. Örnekler proksimal tırnak yatağının lunulaya en yakın kısmından, lezyon içinden alınmalıdır. Yüzeyel beyaz onikomikozda, enfekte materyal tırnak plağının yüzeyindeki beyaz alanlardan kazınarak alınmalıdır.

Deri Kazıntısı: Deri örneklerinin alınmasında, bakteri kontaminasyonunu önlemek için işlem öncesi enfekte cilt %70 alkol ile dezenfekte edilmesi ve aktif enfeksiyonun bulunduğu, lezyonun sınır bölgesinden bistüri, lam ya da bir dermal küret ile alınması önerilmektedir.

Saç Teli: Saç ve saçlı deri örneklerinin alınması sırasında, tercihen Wood lambası altında, tüm saçlı deri incelenerek enfekte alan tespit edilir, en az 10 saç kökü ve varsa kabuklar penset yardımıyla çekilerek toplanır. İşlem öncesi cilt antisepsisi gerekmez. Steril bir diş fırçası ya da küçük bir tarakla elde edilecek saçlı deri kazıntı örneği de kültür için iyi bir materyaldir. Favus varlığında ise saç follikülü üzerindeki skutulum kültür ve direkt mikroskopi için uygundur. Piedrada nodüllü birkaç saç teli kesilerek alınır.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8710201	**Mantar Kültürü**							
	Vajinal, boğaz ve dışkı örnekleri mantar kültürü olarak istenseler de mayalar açısından incelenirler. BOS eğer 8 saat içerisinde transport edilemeyecekse 35 °C'de bekletilmelidir. Steril olmayan ya da sızdıran kaplar kullanılması uygun değildir. Kültürde maya üremesi olursa otomatize cihazlar yardımıyla identifikasyon ve antifungal duyarlılık testleri çalışılmaktadır. Örnekler 18-24°C'de 72 saat stabildir. Buzdolabına konmuş ya da donmuş örnekler uygun değildir. Kan kültür şişesi olarak BACT/ALERT FN Plus Anaerobic, BACT/ALERT PF Plus Aerobic Pediatric, BACT/ALERT FA Plus Aerobic kullanılmalıdır. Kan kültür örnekleri ateşin yükselmeye başladığı dönemde alınmalıdır. Aynı gün içinde farklı olarak 2 kez kan kültürü alınır ise kültürde mikroorganizma üretilme olasılığı artar.							
	Balgam	**Plastik Kap**	0		2-8°C	K/T/D	Pzt-Cmt 12:00	21 gün sonra 17:00
	Boğaz Sürüntüsü	**Jelli Swap**	0		2-8°C	K/T/D		
	Bronkoalveoler Lavaj	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	1	mL	2-8°C	K/T/D		
	Deri Kazıntısı	**Plastik Kap**	0		18-24°C	K/T/D		
	Diğer	**Laboratuvara danışınız**	0		2-8°C	K/T/D		
	Periferik Kök Hücre	**Steril cam tüp**	1	mL	18-24°C	K/T/D		
	Saç Teli	**Plastik Kap**	0		18-24°C	K/T/D		
	Steril İdrar	**Plastik Kap**	0		2-8°C	K/T/D		
	Tam Kan	**Kültür şişesi**	10	mL	18-24°C	K/T/D		
	Tırnak Kazıntısı	**Plastik Kap**	0		18-24°C	K/T/D		
	Vaginal Akıntı	**Jelli Swap**	0		2-8°C	K/T/D		
	Deri Kazıntısı: Deri örneklerinin alınmasında, bakteri kontaminasyonunu önlemek için işlem öncesi enfekte cilt %70 alkol ile dezenfekte edilir ve aktif enfeksiyonun bulunduğu, lezyonun sınır bölgesinden bistüri, lam ya da bir dermal küret alınması önerilmektedir.							
	Tırnak Kazıntısı: İncelemenin etkinliğinin arttırılması için lokal ya da sistemik antifungal tedavi başlanmadan önce örnek alınmalı ve işlem öncesi tırnaklar %70 alkol ile temizlenmelidir.Distal subungual onikomikozda tırnaklar kesildikten sonra, küçük bir küret ya da bisturi yardımıyla tırnak yatağından, buradaki sarıbeyaz kırılgan keratin artıklarından ve olabildiğince proksimalden kazınarak alınmalıdır.Proksimal subungual onikomikozda tırnağın enfekte alt katmanlarına ulaşabilmek için, sağlıklı üst katmanlar soyulmalıdır.Örnekler proksimal tırnak yatağının lunulaya en yakın kısmından, lezyon içinden alınmalıdır.Yüzeyel beyaz onikomikozda, enfekte materyal tırnak plağının yüzeyindeki beyaz alanlardan kazınarak alınmalıdır.							
	Saç Teli: Saç ve saçlı deri örneklerinin alınması sırasında, tercihen Wood lambası altında, tüm saçlı deri incelenerek enfekte alan tespit edilir, en az 10 saç kökü ve varsa kabuklar penset yardımıyla çekilerek toplanır.İşlem öncesi cilt antisepsisi gerekmez.Steril bir diş fırçası ya da küçük bir tarakla elde edilecek saçlı deri kazıntı örneği de kültür için iyi bir materyaldir.Favus varlığında ise saç follikülü üzerindeki skutulum kültür ve direkt mikroskopi için uygundur.Piedrada nodüllü birkaç saç teli kesilerek alınır.							
C8780236	**Maymun Çiçeği Virüs DNA PCR**							
	Lezyondan alınan materyal	**Nucliswab**	0		2-8°C	PCR	Pzt-Cum	1 gün sonra
C8818024	**MDS Paneli, Kemik İliği**							
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır. Test içeriğinde; CD10, CD11b, CD117, CD13, CD16, CD33, CD34, CD45, CD56, CD7 ve HLA-DR+ bulunmaktadır.							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8499902	**Melatonin ²**							
	BOS	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	1	mL	2-8°C	RİA	Sal 08:00	12 gün sonra
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	RİA		
	Serum: Örnek güneş ışığına maruz kalmamalıdır.							
	BOS: Örnek güneş ışığına maruz kalmamalıdır.							

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8499911 **Melatonin Sülfat (Melatonin metaboliti) ²**								
	İdrar	**Plastik Kap**	10	mL	2-8°C	EİA	Sal 08:00	3 hafta sonra
	İdrar: Sabah idrarı alınmalıdır.Örnek miktarı 5 ml'den az olmamalıdır.Örnek güneş ışığına maruz kalmamalıdır.							
C8217510 **Menenjit Panel, PCR (Bakteriyel+ Viral+ Mantar)**								
	Bu panel içerisinde; Listeria monocytogenes, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Escherichia coli K1, Streptococcus agalactiae, Herpes simplex virus 1, Herpes simplex virus 2, Human Herpesvirus 6, Human Herpesvirus 7, Human Herpesvirus 8, Cytomegalovirus, Varicella Zoster Virus, Enterovirus, Human Parechovirus ve Cryptococcus gattii/neoformans bulunmaktadır.							
	BOS	**BOS Tüpü**	1	mL	2-8°C	REAL TIME PCR	Pzt-Cum 08:00	Sal-Cmt 18:00
C8254404 **Metabolik Tarama-Aminoasit ve Açilkarnitin Profili (Tandem MS)**								
	Yenidoğan metabolik tarama kartındaki bilgiler doldurulmalıdır.							
	Kapiller Kan	**Filtre Kağıdı**	0		18-24°C	LC-MS/MS	Pzt 08:00 Sal 08:00 Çar 08:00 Per 08:00 Cum 08:00 Cmt 08:00	Per 18:00 Cum 18:00 Pzt 18:00 Sal 18:00 Çar 18:00 Per 18:00
	Kapiller Kan: Filtre kağıdında kuyucuklardaki kan tam olarak kurutulduktan sonra transfer edilmelidir. Kurutma işlemi, örnek yatay olarak oda ısısında kendi halinde 3 saat bırakılıp yapılmalıdır.							
C8383503 **Metanefrin, İdrar (24 saat)**								
	24 Saatlik İdrar, (HCl ile)	**24 Saatlik İdrar Kabı**	10	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Sal 08:00	Çar 18:00
	24 Saatlik İdrar, (HCl ile): İdrar koruyucusu olarak 10 mL, 6 N HCl kullanılmalıdır.							
C8383502 **Metanefrin, Plazma**								
	Test için EDTA-plazma örneği gerekmektedir. Hemoliz değeri 140 mg/dL ve üzerinde test çalışmamaktadır. Yeni örnek talep edilmelidir.Örnek alınmadan önce 4 saat birşey yenilmemeli, sigara ve kahve içilmemelidir.Örnek alınmadan önce hasta 30 dakika istirahat ettirilmelidir.Örnek, alındıktan hemen sonra buzlu su içerisinde bekletilmeli ve 30 dakika içerisinde mümkünse soğutuculu santrifüjde plazma ayrılmalı ve hemen dondurulmalıdır.							
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş	**EDTA-Mor Kapak**	1	mL	<0°C	LC-MS/MS	Sal 08:00 Cum 08:00	Cum 18:00 Sal 18:00
C8238412 **Metanefrin/Kreatinin Oranı, İdrar (Spot)**								
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	1	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Sal 08:00	Çar 18:00
C8460004 **Metanol (Metil Alkol), İdrar (Spot)**								
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	5	mL	2-8°C	hsGC-MS	Pzt-Cmt	4 saat sonra
C8460003 **Metanol (Metil Alkol),Tam Kan (EDTA)**								
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	2-8°C	hsGC-MS	Pzt-Cmt	4 saat sonra

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8305001 **Methemoglobin**								
Methemoglobin testi için alınan örneğin 72 saat içinde 2-8 C'de Merkez Laboratuvara ulaştırılması gerekmektedir. Oda ısısında beklemiş örnekler red edilecektir.								
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	4	mL	2-8°C	SPEKTROFOTOMETRİ	Pzt-Cum 08:00	Sal-Cmt 18:00
C8392123 **Methyl-Ethyl Ketone**								
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	5	mL	2-8°C	HPLC	Pzt-Cum 08:00	8 gün sonra
C8630505 **Metil İzobütil Keton, İdrar (Spot)**								
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	5	ml	2-8°C	GC-MS	Pzt-Cum 08:00	8 gün sonra
C8392104 **Metilhippürik Asit, İdrar (Spot)**								
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	2	mL	2-8°C	HPLC	Pzt-Cum 08:00	8 gün sonra
C8392102 **Metilmalonik Asit, Serum**								
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Sal 08:00	Çar 18:00
C8392115 **Metilmalonik Asit/Kreatinin Oranı, İdrar (Spot)**								
	Spot İdrar, Dondurulmuş	**Plastik Kap**	5	mL	<0°C	GC-MS	Sal 08:00 Per 08:00 Cmt 08:00	Pzt 18:00 Çar 18:00 Cum 18:00
C8029902 **Metotreksat (Methotrexate)**								
İlaç verildikten sonraki saat bilgisinin iletilmesi gerekmektedir. (Örn: 24 sa, 48 sa, 96 sa)								
	Serum	**Jelsiz Tüp**	1	mL	2-8°C	EMİT	Pzt-Cmt	4 saat sonra
Serum: Kan örneği, separatör jel içermeyen tüplere alınmalıdır. Örnek ışıktan korunmalıdır.								
C8391808 **Mevalonik Asit, İdrar** [2]								
	İdrar, Dondurulmuş	**Plastik Kap**	1	mL	<0°C	LC-MS/MS	Sal 08:00	2 hafta sonra
C8204302 **Mikroalbumin, İdrar (Spot)**								
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	5	mL	2-8°C	NEFELOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8204303 **Mikroalbumin, İdrar (24 saat)** [1] [3]								
	24 Saatlik İdrar	**24 Saatlik İdrar Kabı**	5	mL	2-8°C	NEFELOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8720501	**Mikroskobik İnceleme, Biyolojik Sıvı**							
	Biyolojik Sıvı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	0.3	mL	2-8°C	MİKROSKOPİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8720505	**Mikroskobik İnceleme, Ürik Asit Kristali**							
	Biyolojik Sıvı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	2	mL	2-8°C	MİKROSKOPİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8720502	**Mikroskobik İnceleme,Gaita**							
	Gaita	**Plastik Kap**	1	gr	2-8°C	MİKROSKOPİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8720503	**Mikroskopik inceleme, Gram Boyama**							
	Diğer	**Plastik Kap**	0		2-8°C	MİKROSKOPİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8665821	**Mixed Meal (Karışık Öğün) Testi Paneli**							
	Açlık, alkol alımı, ağır egzersiz, gebelik, belli ilaçların kullanımı, stres, obesite, beslenme alışkanlıkları, başka hastalıkların varlığı gibi faktörler ölçümü yapılan testlerin sonuçlarını etkileyebilir.							
	Serum	**Jelli Tüp**	4	mL	2-8°C	ECLİA, FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Sal-Pzt 18:00
C8623524	**Miyozit Paneli**							
	Panel içeriğinde; Miyozit Mi-2 Beta Antikoru, Miyozit Mi-2 Alpha Antikoru, Miyozit Ku Antikoru, Miyozit PM-Scl100 Antikoru, Miyozit PM-Scl75 Antikoru, Miyozit Jo-1 Antikoru, Miyozit SRP Antikoru, Miyozit PL-7 Antikoru, Miyozit PL-12 Antikoru, Miyozit EJ Antikoru, Miyozit OJ Antikoru, Miyozit RO-52 Antikoru, Miyozit TIF1g Antikoru, Miyozit MDA5 Antikoru, Miyozit NXP2 Antikoru, Miyozit SAE1 Antikoru bulunmaktadır.							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	İMMUNOBLOTTİNG	Çar 08:00	Per 18:00
C8600176	**Moleküler Alerji, Balarısı Zehiri (Bee venom) rApi m1 (i208)**							
	Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	RAST	Pzt 08:00	Sal 18:00
C8600185	**Moleküler Alerji, Buğday Unu (Wheat flour) rTri a 14:nsLTP (f433) ²**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	FEİA	Sal 08:00	2 hafta sonra
C8600186	**Moleküler Alerji, Buğday Unu (Wheat flour) rTri a19 Omega 5 Gliadin (f416) ²**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	FEİA	Sal 08:00	2 hafta sonra
C8600193	**Moleküler Alerji, Fındık (Hazelnut) rCor a1 (f428)**							
	Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	RAST	Pzt 08:00	Sal 18:00

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8600203	**Moleküler Alerji, Fındık (Hazelnut) rCor a14 (f439)**							
	Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	RAST	Pzt 08:00	Sal 18:00
C8600201	**Moleküler Alerji, Fındık (Hazelnut) rCor a8 (f425)**							
	Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	RAST	Pzt 08:00	Sal 18:00
C8600202	**Moleküler Alerji, Fındık (Hazelnut) rCor a9 (f440)**							
	Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	RAST	Pzt 08:00	Sal 18:00
C8600188	**Moleküler Alerji, Fıstık (Peanut) rAra h2 (f423)**							
	Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	RAST	Pzt 08:00	Sal 18:00
C8600190	**Moleküler Alerji, Fıstık (Peanut) rAra h6 (f447)**							
	Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	RAST	Pzt 08:00	Sal 18:00
C8600175	**Moleküler Alerji, Kedi (Cat) rFel d1 (e94)**							
	Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	RAST	Pzt 08:00	Sal 18:00
C8600174	**Moleküler Alerji, Köpek (Dog) rCan f1 (e101)**							
	Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	RAST	Pzt 08:00	Sal 18:00
C8600182	**Moleküler Alerji, Süt (Milk) nBos d4 alfa-Laktalbumin (f76)**							
	Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	RAST	Pzt 08:00	Sal 18:00
C8600183	**Moleküler Alerji, Süt (Milk)nBos d5 beta-Laktoglobulin (f77)**							
	Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	RAST	Pzt 08:00	Sal 18:00

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8600184	**Moleküler Alerji, Süt (Milk)nBos d8/d9/d10 Kazein (f78)**							
	Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	RAST	Pzt 08:00	Sal 18:00
C8600177	**Moleküler Alerji, Yabanarısı Zehiri (Wasp venom) rVes v1 (i211)**							
	Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	RAST	Pzt 08:00	Sal 18:00
C8600178	**Moleküler Alerji, Yabanarısı Zehiri (Wasp venom) rVes v5 (i209)**							
	Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	RAST	Pzt 08:00	Sal 18:00
C8600179	**Moleküler Alerji, Yumurta (Egg) nGal d1:Ovomukoid (f233)**							
	Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	RAST	Pzt 08:00	Sal 18:00
C8600180	**Moleküler Alerji, Yumurta (Egg) nGal d2:Ovalbumin (f232) ²**							
	Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	RAST	Pzt 08:00	Sal 18:00
C8301826	**Molibden (Mo)**							
	Plazma (Heparin)	**Sodyum Heparin-Lacivert Kapak**	2	mL	2-8°C	İCP-MS	Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00
C8301827	**Molibden (Mo), Tam Kan**							
	Tam Kan (Heparin)	**Sodyum Heparin-Lacivert Kapak**	5	mL	2-8°C	İCP-MS	Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00
C8818082	**Mukopolisakkaritler, TLC, İdrar (Spot)**							
	Spot İdrar, Dondurulmuş	**Plastik Kap**	5	mL	<0°C	KROMATOGRAFİ	Per 08:00	2 hafta sonra

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR	TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8818054	**Mukozis Fungoides ve Sezary Sendromu Paneli, Kemik İliği**						
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır. Test içeriğinde; CD26, CD3, CD4 (T-Lenfosit), CD45, CD7, CD8 (T-Lenfosit) ve TRBC1 bulunmaktadır.						
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	5 mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8818053	**Mukozis Fungoides ve Sezary Sendromu Paneli, Tam Kan**						
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır. Test içeriğinde; CD26, CD3, CD4 (T-Lenfosit), CD45, CD7, CD8 (T-Lenfosit) ve TRBC1 bulunmaktadır.						
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	5 mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8818055	**Mukozis Fungoides ve Sezary Sendromu Paneli, Vücut Sıvıları**						
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır. Test içeriğinde; CD26, CD3, CD4 (T-Lenfosit), CD45, CD7, CD8 (T-Lenfosit) ve TRBC1 bulunmaktadır.						
	Biyolojik Sıvı	**EDTA-Mor Kapak**	5 mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8925629	**Multi Drug Resistant Mikroorganizma (MDRO) Antibiyotik Duyarlılık Testi**						
	Genç Bakteri Kökeni	**Kültür Plağı**	0	18-24°C	MİKRODİLÜSYON	Pzt-Cmt 08:00	2 gün sonra 17:00
C8818048	**Multiple Myeloma MRD Paneli, Kemik İliği**						
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır.						
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	5 mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8818047	**Multiple Myeloma MRD Paneli, Tam Kan**						
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır.						
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	5 mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8818049	**Multiple Myeloma MRD Paneli, Vücut Sıvıları**						
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır.						
	Biyolojik Sıvı	**EDTA-Mor Kapak**	5 mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8818045	**Multiple Myeloma Paneli, Kemik İliği**						
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır. Test içeriğinde; CD117, CD138, CD19, CD200, CD27, CD38, CD45, CD56, CD81, Kappa ve Lambda bulunmaktadır.						
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	5 mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8818044	**Multiple Myeloma Paneli, Tam Kan**							
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır. Test içeriğinde; CD117, CD138, CD19, CD200, CD27, CD38, CD45, CD56, CD81, Kappa ve Lambda bulunmaktadır.							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8818046	**Multiple Myeloma Paneli, Vücut Sıvıları**							
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır. Test içeriğinde; CD117, CD138, CD19, CD200, CD27, CD38, CD45, CD56, CD81, Kappa ve Lambda bulunmaktadır.							
	Biyolojik Sıvı	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8673501	**Mumps (Kabakulak) Antikoru, IgG**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	CLIA	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Sal 18:00 Per 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8673502	**Mumps (Kabakulak) Antikoru, IgM**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	CLIA	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Sal 18:00 Per 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8711802	**Mycobacteria Moleküler Hızlı Tiplendirme (PCR/REA)**							
	Açlık Mide Sıvısı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	2	mL	2-8°C	PCR, DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cum 08:00	4 hafta sonra
	Balgam	**Plastik Kap**	2	mL	2-8°C	PCR, DNA DİZİ ANALİZİ		
	Biyolojik Sıvı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	2	mL	2-8°C	PCR, DNA DİZİ ANALİZİ		
	BOS	**BOS Tüpü**	1	mL	2-8°C	PCR, DNA DİZİ ANALİZİ		
	Bronkoalveoler Lavaj	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	2	mL	2-8°C	PCR, DNA DİZİ ANALİZİ		
	Doku	**Plastik Kap**	0		2-8°C	PCR, DNA DİZİ ANALİZİ		
	İdrar	**Steril Tüp**	60	mL	2-8°C	PCR, DNA DİZİ ANALİZİ		
C8719004	**Mycobacteria (Tbc) Antibiyotik Duyarlılık (Major ve Minor ilaçlar)**							
	Test edilen antibiyotikler: Ofloxacin, moxifloxacin, rifampin, amikacin, streptomycin, rifabutin, para-aminosalicylic acid, ethionamide, cycloserine, isoniasid, kanamycin, ethambutol. Mycobacteri(Tbc) hızlı kültürü testi ile birlikte çalışılır.							
	Genç Mikobakteri Kökeni	**Kültür Plağı**	0		2-8°C	K/T/D	Pzt-Cum 12:00	1 ay sonra 17:00

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8759160	**Mycobacterium tuberculosis (TBC) İlaç (INH, ETH, FLQ, SLID) Direnci, (PCR)**							
	Panel içeriğinde Isoniazid (INH), Ethionamide (ETH), Fluoroquinolone (FLQ) ve İkinci basamak enjekte edilebilir ilaç direnci bulunmaktadır.							
	Balgam	**Plastik Kap**	1	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 12:00	2 gün sonra 17:00
	Diğer	**Laboratuvara danışınız**	0		2-8°C	PCR		
	Diğer: Kemik ve eklem sıvısı, Bronkoalveoler Lavaj, Lenf Nodu, BOS, Gaita, Açlık Mide Sıvısı, İdrar, Plevra Sıvısı örneklerinden çalışılabilmektedir.							
C8759159	**Mycobacterium tuberculosis (TBC) ve Rifampisin (RIF) Direnci, (PCR)**							
	Balgam	**Plastik Kap**	1	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
	Diğer	**Laboratuvara danışınız**	0		2-8°C	PCR		
	Diğer: Kemik ve eklem sıvısı, Bronkoalveoler Lavaj, Lenf Nodu, BOS, Gaita, Açlık Mide Sıvısı, İdrar, Plevra Sıvısı örneklerinden çalışılabilmektedir.							
C8708115	**Mycoplasma hominis Kültürü**							
	Prostat sıvısı	**Dacron/ Rayon Swab**	0		2-8°C	K/T/D	Pzt-Cum 12:00	4 gün sonra 17:00
	Semen	**Plastik Kap**	0		2-8°C	K/T/D		
	Servikal Sürüntü	**Dacron/ Rayon Swab**	0		2-8°C	K/T/D		
	Steril İdrar	**Plastik Kap**	10	mL	2-8°C	K/T/D		
	Üretral Akıntı	**Dacron/ Rayon Swab**	0		2-8°C	K/T/D		
	Vaginal Akıntı	**Dacron/ Rayon Swab**	0		2-8°C	K/T/D		
	Üretral Akıntı: Üretra ağzı temizlenir, dacron ya da rayon swab ile örnek alınır. (Son idrar en az 3 saat önce yapılmış olmalıdır.) Servikal Sürüntü: Lokal antiseptik kullanılmadan ekzoserviksteki mukus silinerek uzaklaştırılır. Daha sonra swab ile endoserviksten örnek alınır. Semen: Örnek steril örnek kabına alınarak ağzı kapatılır.25 uL semen örneği transport besiyerine aktarılır. Steril İdrar: Sabah ilk idrar alınır. 500 uL idrar örneği transport besiyerine aktarılır.							
C8673802	**Mycoplasma pneumoniae Antikoru, IgG**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	EIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8673801	**Mycoplasma pneumoniae Antikoru, IgM**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	EIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8758201	**Mycoplasma pneumoniae DNA (PCR)**							
	Balgam	**Plastik Kap**	0		2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
	Bronkoalveoler Lavaj	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	2	mL	2-8°C	PCR		
	Doku	**Plastik Kap**	0		2-8°C	PCR		
	Eklem Sıvısı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	2	mL	2-8°C	PCR		
	Tam Kan (EDTA) (PCR)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	PCR		
	Transtrakeal Aspirat	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	2	mL	2-8°C	PCR		
C8780093	**Mycoplasma pneumoniae DNA (PCR), BOS**							
	BOS	**BOS Tüpü**	2	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	Sal-Cmt 18:00
C8758204	**Mycoplasma spp. DNA (PCR)**							
	Mycoplasma spp DNA testi ile tek bir tür saptaması yapılamaz. Mycoplasma genel grubu (M. hominis, M. genitalium, M. pneumoniae, M. fermentas, M. penetrans) içinde olup olmadığı gösterilebilir.							
	Hücre Kültürü	**Steril Tüp**	2	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
	İdrar	**Steril Tüp**	5	mL	2-8°C	PCR		
	Prostat sıvısı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	0		2-8°C	PCR		
	Semen	**Plastik Kap**	2	mL	2-8°C	PCR		
	Servikal Sürüntü	**Nucliswab**	0		2-8°C	PCR		
	Üretral Akıntı	**Nucliswab**	0		2-8°C	PCR		
C8351603	**Myelin Associated Glycoprotein (MAG) Antikoru, IgM ²**							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1	mL	<0°C	EİA	Sal 08:00	10 gün sonra
	Serum, Dondurulmuş: Hemolizli ve lipemik örnekler kabul edilmez. Serum hemen hücrelerden ayrılmalıdır.							
C8387401	**Myoglobin**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8387400	**Myoglobin, İdrar (Spot)**							
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	1	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8630400	**M2-Piruvat Kinaz ²**							
	Gaita örneği dondurularak transfer edilmelidir.							
	Gaita	**Plastik Kap**	5	gr	<0°C	ELİSA	Sal 08:00	3 hafta sonra

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8919001 **Nazal Smear**								
	Burun Salgısı	**Lam**	0.3	mL	18-24°C	MİKROSKOPİ	Pzt-Cum 08:00 Cmt 08:00	Sal-Cmt 18:00 Pzt 18:00

Burun Salgısı: Örnek Alım Özellikleri: Nazal salgı örneği tercihen her iki burundan da alınmalıdır.İnce sulu örnekler yerine varsa mukoid yapıda fazla örnek alınması uygundur.En iyi örnek; hastanın ellerini su ve sabunla yıkadıktan sonra sümkürerek verdiği burun salgısı örneğidir.Bu örnek steril/temiz bir kap içerisine alınarak laboratuvara ulaştırılmalıdır. Hastanın burun salgısı vermesinin mümkün olmadığı durumlarda diğer yöntem burun içerisine steril serum fizyolojik (enjekte edip bununla) çekip sümkürtülerek birlikte gelen örneği aspire etmektir.İri ve mukoid parçalar varsa bunların boyanması daha uygundur. Eğer hiç görünen iri parça yoksa örneğin santrifüjlenip dipte kalan çökeltinin incelenmesi daha uygundur.Temiz olmayan ya da sızdıran kapla örneğin laboratuvara ulaşması, uzun süre buzdolabında bekletilmiş ve dondurulmuş örnekler uygun değildir.

C8225102 **Neonatal Bilirubin, Total (Kapiller)**								
	Kapiller Kan	**Kapiller Tüp**	0		2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 14:00	Pzt-Cmt 18:00
C8349805 **Neonatal GALT Tarama Testi**								
	Kapiller Kan	**Filtre Kağıdı**	0		18-24°C	FEİA	Sal 08:00 Per 08:00	Per 18:00 Sal 18:00
C8444302 **Neonatal TSH**								
	Kapiller Kan	**Filtre Kağıdı**	0.3	mL	18-24°C	FEİA	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Çar 18:00 Cum 18:00 Pzt 18:00

Kapiller Kan: Yenidoğan metabolik tarama kartındaki bilgiler doldurulmalıdır.

C8349804 **Neonatal 17-OH-Progesteron Tarama Testi**								

Bebeklerin doğum haftaları, doğum kilosu ve doğum tarihi gereklidir.

	Kapiller Kan	**Filtre Kağıdı**	0			LC-MS/MS	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Çar 18:00 Cum 18:00 Pzt 18:00
	Kapiller Kan	**Filtre Kağıdı**	0		18-24°C	LC-MS/MS		
C8388501 **Nikel (Ni)**								
	Plazma (Heparin)	**Sodyum Heparin-Lacivert Kapak**	3	mL	2-8°C	İCP-MS	Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00
C8388503 **Nikel (Ni) / Kreatinin Oranı, İdrar (Spot)**								
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	5	mL	2-8°C	ICP-MS	Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8403004 **Nitisinon**								
	Kapiller Kan	**Filtre Kağıdı**	0		18-24°C	LC-MS/MS	Per 08:00	Cum 18:00
	Kapiller Kan: Örnek alındıktan sonra, kartlar yatay şekilde ve güneş ışığına maruz bırakılmadan oda sıcaklığında 2-3 saat kurutulmalıdır.							
C8925684 **NK Paneli, Kemik İliği**								
	Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır. Test içeriğinde; CD16+CD56+, CD3, CD45, Lenfosit Sayısı ve Lökosit Sayısı bulunmaktadır.							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	3 gün sonra
C8925683 **NK Paneli, Periferik Kan**								
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir. Örnek taze olmalıdır. Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır. Test içeriğinde; CD16+CD56+, CD3, CD45, Lenfosit Sayısı ve Lökosit Sayısı bulunmaktadır.							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	3 gün sonra
C8925685 **NK Paneli, Vücut Sıvıları**								
	Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır. Test içeriğinde; CD16+CD56+, CD3, CD45, Lenfosit Sayısı ve Lökosit Sayısı bulunmaktadır.							
	Biyolojik Sıvı	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	3 gün sonra
C8625620 **NMO-IgG Antikoru (Anti-Aquaporin 4 Antikoru)**								
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	İFT	Sal 08:00	Çar 18:00
C8217514 **NMP-22 (Mesane Kanseri Tarama Testi)**								
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	1	mL	2-8°C	İMMUNOASSAY	Pzt-Cum 08:00	Sal-Cmt 18:00
C8217515 **NMR Lipoprotein Profili ³**								
	Test içeriğinde; Kolesterol, LDL, Kolesterol, HDL, Kolesterol, Total, Trigliserid, Apolipoprotein A1, Apolipoprotein A2, Apolipoprotein B100, LDL subfraksiyonları (LDL 1-6), VLDL subfraksiyonları (VLVDL 1-5), HDL subfraksiyonları (HDL 1-4) yer almaktadır.							
	Serum	**Jelsiz Tüp**	1.5	mL	2-8°C	NMR	Pzt-Cum 08:00	5 gün sonra
	Serum: Test için örnek verilmesi öncesinde; en az 12 saatlik açlık gerekmekte olup, en son akşam yemeğinin en geç saat 18.00'e kadar yenilmiş olması ve yağlı yiyecekleri içermemesi gerekmektedir.Ayrıca; örnek alımından önceki 24 saat içerisinde alkol alınmamalıdır.Analiz için hemolitik, lipemik ve ikterik örnekler kullanılamaz.							
C8779914 **Nocardia DNA (PCR)**								
	Balgam	**Plastik Kap**	2	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
	BOS	**BOS Tüpü**	2	mL	2-8°C	PCR		
	Bronkoalveoler Lavaj	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	2	mL	2-8°C	PCR		
	Doku	**Plastik Kap**	0		2-8°C	PCR		
	Püy (cerahat)	**Steril Tüp**	2	mL	2-8°C	PCR		
	Transtrakeal Aspirat	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	5	mL	2-8°C	PCR		

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8238405	**Noradrenalin (Norepinefrin), İdrar (24 saat)**							
	24 Saatlik İdrar, (HCl ile)	**24 Saatlik İdrar Kabı**	5	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Sal 08:00	Çar 18:00
	24 Saatlik İdrar, (HCl ile): İdrar koruyucusu olarak 10 mL, 6 N HCl kullanılmalıdır.							
C8238404	**Noradrenalin (Norepinefrin), Plazma**							
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş	**EDTA-Mor Kapak**	1	mL	<0°C	LC-MS/MS	Sal 08:00 Cum 08:00	Cum 18:00 Sal 18:00
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş: Test için EDTA-plazma örneği gerekmektedir. Hemolizli örnekler kabul edilmez.Örnek alınmadan önce 4 saat birşey yenilmemeli, sigara ve kahve içilmemelidir.Örnek alınmadan önce hasta 30 dakika istirahat ettirilmelidir.Örnek, alındıktan hemen sonra buzlu su içerisinde bekletilmeli ve 30 dakika içerisinde mümkünse soğutuculu santrifüjde plazma ayrılmalı ve hemen dondurulmalıdır.							
C8238410	**Noradrenalin/Kreatinin Oranı, İdrar (Spot)**							
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	1	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Sal 08:00	Çar 18:00
C8238202	**Normetanefrin, İdrar (24 saat)**							
	24 Saatlik İdrar, (HCl ile)	**24 Saatlik İdrar Kabı**	10	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Sal 08:00	Çar 18:00
	24 Saatlik İdrar, (HCl ile): İdrar koruyucusu olarak 10 mL, 6 N HCl kullanılmalıdır.							
C8238203	**Normetanefrin, Plazma**							
	Test için EDTA-plazma örneği gerekmektedir. Hemolizli örnekler kabul edilmez.Örnek alınmadan önce 4 saat birşey yenilmemeli, sigara ve kahve içilmemelidir.Örnek alınmadan önce hasta 30 dakika istirahat ettirilmelidir.Örnek, alındıktan hemen sonra buzlu su içerisinde bekletilmeli ve 30 dakika içerisinde mümkünse soğutuculu santrifüjde plazma ayrılmalı ve hemen dondurulmalıdır.							
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş	**EDTA-Mor Kapak**	1	mL	<0°C	LC-MS/MS	Sal 08:00 Cum 08:00	Cum 18:00 Sal 18:00
C8238413	**Normetanefrin/Kreatinin Oranı, İdrar (Spot)**							
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	1	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Sal 08:00	Çar 18:00
C8744902	**Norovirüs Antijeni**							
	Gaita	**Plastik Kap**	2	gr	2-8°C	İMMUNOKROMATOGRAFİ	Pzt-Cum 12:00 Cmt 12:00	Pzt-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8925689	**Nöroblastoma Paneli**							
	Test içeriğinde; CD45, CD56, CD80, CD81, CD86 ve GD2 bulunmaktadır.							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	5 gün sonra
C8666809	**Nörofilament Hafif Zincir (NfL)**							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1	ml	<0°C	CLIA	Çar 12:00	14 gün

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8631605	**Nöron Spesifik Enolaz (NSE)** [1] [3]							
	Örnekler en kısa süre içerisinde santrifüjle ayrılmalıdır.							
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	ECLİA	Pzt 08:00 Cum 08:00	Sal 18:00 Pzt 18:00
	Serum: NSE; eritrosit, platelet ve plazma hücrelerinde de yer alan bir enzimdir. Serum örnekleri, örnek alımından sonra 1 saatten kısa bir sürede santrifüj edilerek elde edilmelidir. 2-8 °C'de yaklaşık 48 saat stabil olan örnekler, analiz edilemeyecekse -20 °C'de dondurulmalıdır. Hemolizli örneklerden NSE çalışılması uygun değildir.							
C8631610	**Nöron Spesifik Enolaz (NSE), BOS**							
	BOS	**BOS Tüpü**	1	mL	2-8°C	ECLİA	Pzt 08:00 Cum 08:00	Sal 18:00 Pzt 18:00
	BOS: Örnek miktarı 500 uL'den az olmamalıdır. NSE; eritrosit, platelet ve plazma hücrelerinde de yer alan bir enzimdir. 2-8 °C'de yaklaşık 48 saat stabil olan örnekler, analiz edilemeyecekse -20 °C'de dondurulmalıdır. Hemolizli örneklerden NSE çalışılması uygun değildir.							
C8623525	**Nöronal Antijen Profil "SOx1, Titin"**							
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	İMMUNOBLOTTİNG	Çar 08:00	Per 18:00
C8634401	**Nötrofil Fonksiyon Testi**							
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir. Örnek alındıktan sonra örnek en fazla 3 saat içinde laboratuvara ulaşmış olmalıdır. Hemolizli örnekler kabul edilmez.							
	Tam Kan (Heparin)	**Heparin-Yeşil Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt 08:00 Sal 08:00 Çar 08:00 Per 08:00 Cum 08:00	Çar 18:00 Per 18:00 Cum 18:00 Pzt 18:00 Sal 18:00
	Tam Kan (Heparin): Hemolizli ve pıhtılı örnekler kabul edilmez.							
C8252306	**N-Telopeptidler (NTx) / Kreatinin Oranı, İdrar**							
	Sabah 2. İdrar	**Plastik Kap**	5	mL	<0°C	EIA	Sal 08:00	17 gün sonra
C8252307	**N-Telopeptidler (NTx), İdrar (24 saat)**							
	24 Saatlik İdrar	**24 Saatlik İdrar Kabı**	5	mL	<0°C	EIA	Sal 08:00	17 gün sonra
C8424404	**O-Cresol**							
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	1	mL	2-8 °C	HPLC	Pzt-Cum 08:00	8 gün sonra

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8015602 **Okskarbazepin (Oxcarbazepin)**								
	Serum	**Jelsiz Tüp**	0.5	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Pzt 08:00 Per 08:00	Pzt 18:00 Per 18:00
	Serum: Kan örneği, separatör jel içermeyen tüplere alınmalıdır.							
C8394508 **Okzalat / Kreatinin Oranı, İdrar (Spot)**								
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	5	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Cum 08:00	Sal 18:00
C8394503 **Okzalat, İdrar (24 saat)**								
	24 Saatlik İdrar	**24 Saatlik İdrar Kabı**	5	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Cum 08:00	Sal 18:00
	24 Saatlik İdrar: İdrar toplamadan 3 gün önce ve idrar toplanması sırasında vitamin C içeren ilaçlar kullanılmamalıdır.Vitamin C içeren gıdaların aşırı tüketilmesi okzalat atılımını etkilemektedir.							
C8391601 **Oligoklonal Band**								
	Serum ve BOS	**Jelli Tüp ve BOS Tüpü**	2	mL	2-8°C	İEF	Çar 08:00 Cum 08:00	Pzt 18:00 Çar 18:00
	Serum ve BOS: Hemolizli serum örnekleri kabul edilmez.							
C8254409 **Omega-3 Yağ Asitleri ²**								
	Test içeriğinde; Alfa linolenik asit, Dokosaheksaenoik asit (DHA) ve Eikosapentaenoik asit (EPA) bulunmaktadır.							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Sal 08:00	28 gün sonra
	Serum: Örnek vermeden önce en az 24 saat öncesine kadar alkol içilmemiş olması ve en az 12-14 saatlik açlık olması gerekmektedir.							
C8254410 **Omega-6 Yağ Asitleri ²**								
	Test içeriğinde; Araşidonik asit, Gamma linolenik asit, Homo gamma linolenik asit ve Linoleik asit bulunmaktadır.							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	GC-MS	Sal 08:00	28 gün sonra
	Serum: Örnek vermeden önce en az 24 saat öncesine kadar alkol içilmemiş olması ve en az 12-14 saatlik açlık olması gerekmektedir.							
C8925626 **Onkoloji Rutin Panel**								
	Panel içeriğinde; Tam Kan Sayımı, Kreatinin, Alanin Aminotransferaz (ALT), Aspartat Aminotransferaz (AST), Üre Azotu (BUN), Kalsiyum (Ca), Bilirubin, Total, Potasyum (K), Sodyum (Na), Albumin, Glukoz, Açlık, Magnezyum (Mg), Alkalen Fosfataz (ALP), Bilirubin, Direkt, Gama Glutamil Transferaz (GGT), Laktat Dehidrogenaz (LDH), C reaktif protein (CRP), Protein, Total, Ürik Asit, Fosfor (P), İnorganik, Klor (Cl) yer almaktadır. Test panelinde tanımlı tüm örnek türleri gereklidir.							
	Serum	**Jelli Tüp**	6	mL	2-8°C		Pzt-Cum 08:00 Cmt 08:00	Sal-Cmt 18:00 Pzt 18:00
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak (CBC)**	2	mL	2-8°C			

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8391803	**Organik Asitler, İdrar**							
	Organik asitler testi altında; Adipik asit, 2-hidroksi izo valerik asit, 3-hidroksi bütirik asit, 3-hidroksi izo valerik asit, Etil malonik asit, Fumarik asit, 4-hidroksi bütirik asit, Glikolik asit, Gliserik asit, Glutarik asit,Heksanoylglisin, Laktik asit, Metil malonik asit, Metilglutarik asit, N-Asetilaspartik asit, N-İsovaleroilglisin, Sebasik asit, Suberik asit, Tiglylglycine, 2-Hidroksiglutarik asit, 2-Oxoglutarik asit, 3- Hidroksi propionik asit, Pirüvik asit, 3-hidroksiizo bütirik asit, Malonik asit, Süksinik asit, 3-metil glutakonik asit, Süksinilaseton, Malik asit, 5-oxoprolin, Orotik asit, Homogentisik asit, 2-metil sitrik asit,3-OH glutarik asit yer almaktadır.							
	Spot İdrar, Dondurulmuş	**Plastik Kap**	5	mL	<0°C	GC-MS	Sal 08:00 Per 08:00 Cmt 08:00	Pzt 18:00 Çar 18:00 Cum 18:00
C8391811	**Orotik Asit/Kreatinin Oranı, İdrar (Spot)**							
	Spot İdrar, Dondurulmuş	**Plastik Kap**	5	mL	<0°C	GC-MS	Sal 08:00 Per 08:00 Cmt 08:00	Pzt 18:00 Çar 18:00 Cum 18:00
C8393001	**Osmolalite**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	FPD	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8393501	**Osmolalite, İdrar**							
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	5	mL	2-8°C	FPD	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	24 Saatlik İdrar	**24 Saatlik İdrar Kabı**	5	mL	2-8°C	FPD		
C8393701	**Osteokalsin** [1] [3]							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1	mL	<0°C	ECLİA	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Sal 18:00 Per 18:00 Pzt 18:00
	Serum, Dondurulmuş: Örnek en az 12 saat açlıkta alınmalıdır.Örnek alındıktan sonra serum en kısa sürede ayrılmalıdır.							
C8676511	**Otoimmun Karaciğer Profil (Geniş)**							
	Test içeriğinde; Düz Kas Antikoru (ASMA), Mitokondri Antikoru (AMA), Karaciğer Otoimmün Profil(AMA M2, gp210, LC1, LKM1, SLA, Sp 100), Liver Kidney Mikrozomal Antikor (anti-LKM) yer almaktadır.							
	Serum	**Jelli Tüp**	3	mL	2-8°C		Pzt 08:00	Sal 18:00
C8623531	**Otoimmün Ensefalit Paneli, BOS**							
	BOS	**BOS Tüpü**	1	mL	2-8°C	İFA	Çar 08:00	Cum 18:00
	BOS: Test içeriğinde; NMDAR, GABABR, AMPAR2, DPPX, LGI1, CASPR2 bulunmaktadır.							
C8623530	**Otoimmün Ensefalit Paneli, Serum**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	İFA	Çar 08:00	Cuma 18:00
	Serum: Test içeriğinde; NMDAR,GABABR, AMPAR2, DPPX, LGI1, CASPR2 bulunmaktadır.							

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8625614 **Over Antikoru ²**								
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	İFT	Sal 08:00	1 hafta sonra
C8202406 **Paliperidone ²**								
	Serum	**Jelsiz Tüp**	1	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Sal 08:00	1 hafta sonra
C8351906 **Pankreatik Polipeptid (PP) ²**								
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	<0°C	RİA	Sal 08:00	3 hafta sonra
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş: Kan sabah aç karına alınmalıdır. Plazma hemen santrifüj edilerek ayrılmalı ve hemen dondurulmalıdır. Kullanılan ilaçlar bildirilmelidir.							
C8623523 **Paraneoplastik Panel, BOS**								
	Panel içeriğinde; Anti-Amfifizin, Anti-CV2, Anti-PNMA2 (Ma-2/Ta), Anti-Ri, Anti-Yo, Anti-Hu, Anti-Rekoverin, Anti-SOX1,Anti-Titin, Anti-Zic4, Anti-GAD65, Anti-Tr (DNER) antikorları yer almaktadır.							
	BOS	**BOS Tüpü**	1	mL	2-8°C	İMMUNOBLOTTİNG	Çar 08:00	Per 18:00
C8623522 **Paraneoplastik Panel, Serum**								
	Panel içeriğinde; Anti-Amfifizin, Anti-CV2, Anti-PNMA2 (Ma-2/Ta), Anti-Ri, Anti-Yo, Anti-Hu, Anti-Rekoverin, Anti-SOX1,Anti-Titin, Anti-Zic4, Anti-GAD65, Anti-Tr (DNER) antikorları yer almaktadır.							
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	İMMUNOBLOTTİNG	Çar 08:00	Per 18:00
C8397001 **Parathormon (PTH), İntakt**								
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1	mL	<0°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum, Dondurulmuş: Kan örneği; santrifüj edildikten sonra, en geç 2 saat içerisinde dondurulmalıdır.							
C8397003 **Parathormon (PTH) İntakt, Washout**								
	Biyolojik Sıvı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	1	mL	<0°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8397002 **Parathormon-related Peptid (PTHrP) ²**								
	Laboratuvardan EDTA-Trasylol (APROTININ) tüpünü edinin. Örnek alındıktan sonra 30 dakika içinde santrifüjlenmelidir ve 2 saat içinde dondurulmalıdır. Örnek santrifüj edilip plazma ayrılır ve laboratuvara plazma olarak transfer edilir. Plazma, -20°C veya daha soğukta 4 haftaya kadar saklanabilir ve gönderilebilir.							
	Plazma, Dondurulmuş	**EDTA-Mor Kapak (Trasylol)**	2	mL	<0°C	RİA	Sal 08:00	1 hafta sonra
C8674701 **Parvovirus B19 Antikoru, IgG**								
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	EIA, CLIA	Sal 08:00 Per 08:00	Çar 18:00 Cum 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8674702	**Parvovirus B19 Antikoru, IgM**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	EIA, CLIA	Sal 08:00 Per 08:00	Çar 18:00 Cum 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8758203	**Parvovirus B19 DNA (PCR), Amniyotik Sıvı, Kantitatif**							
	Amniyotik Sıvı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	2	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	2 gün sonra
	Amniyotik Sıvı: Örneklerin dondurulmaması gerekmektedir.							
C8925679	**Parvovirus B19 DNA (PCR), Plazma, Kantitatif**							
	Plazma (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	REAL TIME PCR	Sal 08:00 Çar 08:00 Per 08:00	1 hafta sonra 18:00
C8925690	**Parvovirus B19 DNA (PCR), Serum, Kantitatif**							
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	REAL TIME PCR	Sal 08:00 Çar 08:00 Per 08:00	1 hafta sonra 18:00
C8506004	**Periferik Yayma (Dijital Morfoloji)**							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	MİKROSKOPİ	Pzt-Per 16:00 Cum-Cmt 14:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8509702	**Periferik Yayma ve KİA preparat boyama**							
	Biyolojik Sıvı	**Lam**	1	mL	18-24°C			
	BOS	**Lam**	1	mL	18-24°C			
	Kemik İliği	**Lam**	2	mL	18-24°C			
	Tam Kan	**Lam**	2	mL	18-24°C			
C8392502	**Petidin (Meperidin) ²**							
	Serum	**Jelsiz Tüp**	2	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Sal 08:00	1 hafta sonra
	Serum: Kan örneği separatör jel içermeyen tüplere alınmalıdır.							
C8280004	**pH, Gaita**							
	Gaita	**Plastik Kap**	1	gr	2-8°C	MANUEL	Pzt-Cmt 14:00	Pzt-Cmt 18:00
C8280003	**pH, Vücut Sıvıları**							
	Biyolojik Sıvı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	3	mL	2-8°C	MANUEL	Pzt-Cmt 14:00	Pzt-Cmt 18:00

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8749157	**Phenome Mikrobiyota (Metagenom)**							
	Bu test için Mikrobiyota (Metagenom) Testi Örnek Verme Bilgilendirme Formu bulunmaktadır. Örnek ile birlikte Mikrobiyota (Metagenom) Testi Hasta Bilgilendirme ve Onam Formu doldurulmalıdır.							
	Laboratuvara Danışınız	**Özel Örnek Toplama Kabı**	0		18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cum	5-6 hafta
	Laboratuvara Danışınız: Örnek Toplama kiti için Laboratuvar ile iletişime geçiniz.							
C8254301	**Pipekolik Asit (Piperidin-2-karboksilik asit) ²**							
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	<0°C	GC-MS	Sal 08:00	2 hafta sonra
C8252305	**Piridinolin ²**							
	Sabah 1. İdrar	**Plastik Kap**	5	mL	2-8°C	HPLC	Sal 08:00	1 hafta sonra
	Sabah 1. İdrar: örnek, sabah ilk idrar olmalı ve ışıktan korunmalıdır.							
C8421001	**Piruvat**							
	Plazma (Perklorik Asit Ön İşlemi)	**Florür-Gri Kapak**	1	mL	2-8°C	ENZİMATİK	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Pzt 18:00 Çar 18:00 Cum 18:00
	Plazma (Perklorik Asit Ön İşlemi): Plazma (perklorik asit ön işlemi) Kan örneği, Sodyum Florür (NaF) içeren tüpe alınır. Daha sonra bekletilmeden 500 mikrolitre (uL) tam kan örneği, içerisinde 1 mililitre (mL) % 8'lik perklorik asit (soğuk olmalı) bulunan tüpe koyulur. Karışım yaklaşık 30 saniye vortekslenir, sonrasında 5 dakika (dk) buz içinde tutulur. 1500 g devirde 10 dk. santrifüj edilir. Proteinden arındırılmış üstteki berrak süpernatan ayrılır ve 2-8 C'de transfer edilir. Perklorik asit merkez laboratuvarından temin edilmelidir. Oda ısısında saklanan ve transfer edilen örnekler çalışma için kabul edilmeyecektir.							
C8421002	**Piruvat, BOS**							
	BOS örneği laboratuvara gönderilmeden önce 1:1 oranında konsantre perklorik asit ile deproteinizasyon işlemi yapılmalıdır.							
	BOS	**BOS Tüpü**	1	mL	2-8°C	ENZİMATİK	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Pzt 18:00 Çar 18:00 Cum 18:00
C8422001	**Piruvat Kinaz**							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Sal 08:00 Per 08:00	Çar 18:00 Cum 18:00
	Tam Kan (EDTA): Test için EDTA-Tam kan gerekmektedir. Örnek, tam kan sayımı sonucu ile birlikte gönderilmelidir.							
C8029953	**PLAC Test (lp-PLA2)**							
	Hemolizli örnek kabul edilmez. Kan alındıktan hemen sonra santrifüj edilmesi gerekir.							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	0.5	mL	<0°C	CLIA	Çar 08:00	Per 18:00
	Serum, Dondurulmuş: Hemolizli örnek kabul edilmez.							

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8742505 **Plasental Büyüme Faktörü**								
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	<0°C	ECLİA	Sal 08:00	1 hafta sonra
C8720701 **Plasmodium Aranması (Kalın Damla/İnce Yayma)**								
	Yayma ve EDTA'lı Tam Kan	**Laboratuvara danışınız**	5	mL	2-8°C	MİKROSKOPİ	Pzt-Cmt 10:00	Pzt-Cmt 18:00
	Yayma ve EDTA'lı Tam Kan: Mümkün olan durumlarda, hastanın parmak ucundan alınacak kan ile hazırlanan kalın damla/ince yayma preparatı da laboratuvara gönderilmelidir.							
C8424402 **Plazma Renin Aktivitesi (PRA)**								
	Plazma örnekleri soğuk EDTA tüplerine alınmalıdır. Plazma santrifügasyon ile hemen ayrılmalı ve dondurularak transfer edilmelidir.Örnek erişkin hastalardan ayakta veya yatar pozisyonda alınmalıdır.16 yaşın altındaki hastalarda ayakta pozisyonda örnek alınmaz. Yatarak: hasta yataktan kalmadan önce alınmalıdır. Ayakta: Hasta yataktan kalktıktan en az 2 saat geçtikten sonra örnek alınmalıdır.							
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş	**EDTA-Mor Kapak**	1	mL	<0°C	RİA	Pzt 08:00 Sal 08:00 Çarş 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Cum 18:00 Pzt 18:00 Sal 18:00
C8542002 **Plazminojen Aktivatör İnhibitör-1 (PAI-1)**								
	Plazma örneği en az iki ayrı tüpe bölünerek dondurulmalıdır.							
	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	**Sitrat-Mavi Kapak**	1	mL	<0°C	ELİSA	Cum 08:00	2 hafta sonra
C8542103 **Plazminojen Aktivitesi ²**								
	Plazma örneği en az iki ayrı tüpe bölünerek dondurulmalıdır. Hemolizli, lipemik, ikterik ve fibrin içeren numuneler analiz için kullanılmaz.							
	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	**Sitrat-Mavi Kapak**	1	mL	<0°C	KROMOJENİK	Sal 08:00	1 hafta sonra
C8780064 **Pneumocystis carini (jirovecii) DNA (PCR), Balgam**								
	Pneumocystis carinii; yeni taksonomide Pneumocystis jirovechii olarak adlandırılmaktadır.							
	Balgam	**Plastik Kap**	2	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
C8780065 **Pneumocystis carini (jirovecii) DNA (PCR), Bronkoalveoler Lavaj**								
	Pneumocystis carinii; yeni taksonomide Pneumocystis jirovechii olarak adlandırılmaktadır.							
	Bronkoalveoler Lavaj	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	5	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
C8790004 **Pneumocystis carini (jirovecii) DNA (PCR), Transtrakeal Aspirat**								
	Pneumocystis carinii; yeni taksonomide Pneumocystis jirovechii olarak adlandırılmaktadır.							
	Transtrakeal Aspirat	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	2	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8636107	**PNH (Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri) Paneli**							
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir. Örnek taze olmalıdır.							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt 08:00 Sal 08:00 Çar 08:00 Per 08:00 Cum 08:00 Cmt 08:00	Çar 18:00 Per 18:00 Cum 18:00 Pzt 18:00 Sal 18:00 Sal 18:00
C8665815	**Poliovirüs Antikoru Tip 1&3** [2]							
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	NÖTRALİZASYON	Sal 08:00	1 hafta sonra
C8412001	**Porfirin, Total**							
	24 Saatlik İdrar	**24 Saatlik İdrar Kabı**	5	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Sal 08:00	1 hafta sonra
	24 Saatlik İdrar: Örnek ışıktan korunmalıdır.							
C8412601	**Porfirinler, Kantitatif, Gaita**							
	Gaita	**Plastik Kap**	1	gr	2-8°C	LC-MS/MS	Sal 08:00	15 gün sonra
C8411001	**Porfobilinojen, İdrar (24 saat)** [2]							
	24 Saatlik İdrar	**24 Saatlik İdrar Kabı**	5	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Sal 08:00	1 hafta sonra
	24 Saatlik İdrar: Örnek ışıktan korunmalıdır.							
C8925647	**Porfobilinojen/Kreatinin Oranı, İdrar (Spot)**							
	Örnek ışıktan korunmalıdır.							
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	10	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Sal 08:00	7 gün sonra
C8413302	**Potasyum, İdrar (24 saat)**							
	24 Saatlik İdrar	**24 Saatlik İdrar Kabı**	2	mL	2-8°C	İSE	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8413201	**Potasyum (K)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.2	mL	2-8°C	İSE	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8413303	**Potasyum (K), Biyolojik Sıvı**							
	Biyolojik Sıvı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	0.5	mL	2-8°C	İSE	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8413304 **Potasyum (K), BOS**								
	BOS	**BOS Tüpü**	1	mL	2-8°C	İSE	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8413301 **Potasyum (K), İdrar (Spot)**								
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	2	mL	2-8°C	İSE	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8413401 **Prealbumin**								
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	NEFELOMETRİ	Çar 08:00	Per 18:00
	Serum: Örnek oda sıcaklığında tamamen pıhtılaştıktan sonra santrifüj edilmelidir.							
C8742503 **Preeklampsi sFlt-1/PLGF Oranı**								
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1	mL	<0°C	ECLİA	Sal 08:00	1 hafta sonra
C8529202 **Prekallikrein (Fletcher Faktör) ²**								
	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	**Sitrat-Mavi Kapak**	1	mL	<0°C	KOAGÜLOMETRİ	Sal 08:00	Yaklaşık 1 ay sonra
	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş: Örnek 10 dk.santrifüj edildikten sonra plazma hemen ayrılıp 4 porsiyon şeklinde hemen dondurulmalıdır. Her porsiyonda en az 500 uL plazma örneği olmalıdır.							
C8461409 **Prenatal Tarama Testi - Entegre Test**								
	"Prenatal tarama testi bilgi formu" eksiksiz doldurulmalı ve hekim tarafından kaşeli/imzalı olarak örnekle beraber gönderilmelidir. 1. Trimester aşaması için, 11-13 hafta 6 gün gebelik haftalarında örnek alınmalıdır. 2. Trimester aşaması için optimum değerlendirmeler 16-18. gebelik haftaları arasında olmakla birlikte 15-22. haftalar arasındaki tüm gebelerde risk değerlendirmesi yapılmaktadır.							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1	mL	<0°C	CLIA	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Çar 18:00 Cum 18:00 Pzt 18:00
C8818064 **Primer İmmün Yetmezlik Paneli**								
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Örnek alındıktan sonra 12 saat içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Test içeriğinde; CD14, CD19, CD19+CD20+, CD19+CD27+IgD+, CD19+CD27+IgD-, CD19+CD27-IgD+, CD19+HLA-DR+, CD197, CD21+CD38+, CD24, CD3, CD3+CD16+CD56+ NK-T Hücreler, CD3-CD16+CD56+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD3+HLA-DR+, CD38 Oranı, CD4+CD31+CD45RA+, CD4+CD45RA+, CD4+CD45RO+, CD45, CD8+CD45RA+, CD8+CD45RO+, Lenfosit sayısı(#), Lenfosit (%), Lökosit sayısı, TCR-AB ve TCR-GD bulunmaktadır.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	0			AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak (CBC)**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ		
C8391809 **Pristanik Asit, Serum**								
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	GC-MS	Pzt 08:00	10 gün sonra

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8502108	**Progenitör Hücre sayımı (HPC)**							
	Örnek taze olmalıdır.							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak (CBC)**	2	mL	2-8°C	DC, FC	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8414401	**Progesteron** [1] [3]							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.2	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8420601	**Proinsülin** [2]							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	LİA	Sal 08:00	1 hafta sonra
C8230802	**Prokalsitonin**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8230803	**Prokalsitonin (STAT)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	FEİA	Pzt-Cmt 08:00	Pzt-Cmt 18:00
C8499909	**Prokollajen Tip 1 N-Terminal Propeptit (P1NP)** [2]							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1	mL	<0°C	RİA	Sal 08:00	1 hafta sonra
C8499910	**Prokollajen-III-Peptid** [3]							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	CLIA	Sal 08:00	2 hafta sonra
C8414601	**Prolaktin (PRL)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.2	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8415401	**Prostat Spesifik Antijen (PSA), Serbest**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.2	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Örnekler 2 saat içerisinde santrifüjle ayrılmalıdır. Heparin (Li-, Na-), EDTA-K3 ve sodyum sitratlı plazma da kullanılabilir.							
C8415304	**Prostat Spesifik Antijen (PSA), Serbest (ECLIA)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.2	mL	2-8°C	ECLİA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Heparin (Li-, Na-), EDTA-K3 ve sodyum sitratlı plazma da kullanılabilir.							

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8415301	**Prostat Spesifik Antijen (PSA), Total**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.2	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Örnekler 2 saat içerisinde santrifüjle ayrılmalıdır.							
C8415303	**Prostat Spesifik Antijen (PSA), Total (ECLIA)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.2	mL	2-8°C	ECLİA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8415404	**Prostate Health Index(phi) ²**							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1	mL	<0°C	İA	Sal 08:00	2 hafta sonra
	Serum, Dondurulmuş: Prostate Health Index(phi) panelinin içerisinde Pro PSA, Total PSA ve Serbest PSA parametreleri bulunmaktadır.Prostat Spesifik Antijen (PSA), Total ve Prostat Spesifik Antijen (PSA), Serbest testleri için ayrıca giriş yapılmasına gerek yoktur.							
C8415508	**Protein, Biyolojik Sıvılarda**							
	Biyolojik Sıvı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	0.3	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8415509	**Protein, BOS**							
	BOS	**BOS Tüpü**	0.5	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8530301	**Protein C Aktivitesi**							
	Heparin/oral antikoagülan tedavisi kesildikten 2-4 hafta sonra örnek alınmalıdır. Plazma örneği en az iki ayrı tüpe bölünerek dondurulmalıdır. Hemolizli, lipemik, ikterik ve fibrin içeren numuneler analiz için kullanılmaz.							
	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	**Sitrat-Mavi Kapak**	0.5	mL	<0°C	KROMOJENİK	Sal 08:00 Per 08:00	Per 18:00 Pzt 18:00
C8530201	**Protein C, Antijen**							
	Heparin/oral antikoagülan tedavisi kesildikten 2-4 hafta sonra örnek alınmalıdır. Plazma örneği en az iki ayrı tüpe bölünerek dondurulmalıdır. Hemolizli, lipemik, ikterik ve fibrin içeren numuneler analiz için kullanılmaz.							
	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	**Sitrat-Mavi Kapak**	0.5	mL	<0°C	IMMÜNOTÜRBİDİMETRİK	Sal 08:00	Per 18:00
C8416501	**Protein Elektroforezi**							
	Protein Elektroforezi testi altında; Albumin, Alfa-1 Globulin, Alfa-2 Globulin, Beta-1 Globulin, Beta-2 Globulin, Gamma Globulin, M Proteini, Total Protein yer almaktadır. Hemolizli örnek analiz için kullanılmaz.							
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	KAPİLLER ELEKTROFOREZ	Pzt 08:00 Per 08:00	Çar 18:00 Pzt 18:00

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8416502	**Protein Elektroforezi, İdrar (24 saat)**							
	Toplama esnasında idrar ışık görmeyen ve serin bir yerde bekletilmelidir.Toplanan idrar miktarı not edilmelidir. Protein Elektroforezi, İdrar testi altında ; Albumin, Alfa-1 Globulin, Alfa-2 Globulin, Beta Globulin, Gamma Globulin, Total Protein, idrar yer almaktadır.							
	24 Saatlik İdrar	**24 Saatlik İdrar Kabı**	10	mL	2-8°C	ELEKTROFOREZ	Sal 08:00 Cum 08:00	Cum 18:00 Çar 18:00
	24 Saatlik İdrar: Sanrifüj edilerek hücrelerden ayrılması gerekir.							
C8415504	**Protein, İdrar (24 saat)**							
	24 Saatlik İdrar	**24 Saatlik İdrar Kabı**	2	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8530502	**Protein S Aktivitesi**							
	Heparin/oral antikoagülan tedavisi kesildikten 2-4 hafta sonra örnek alınmalıdır. Plazma örneği en az iki ayrı tüpe bölünerek dondurulmalıdır. Hemolizli, lipemik, ikterik ve fibrin içeren numuneler analiz için kullanılmaz.							
	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	**Sitrat-Mavi Kapak**	0.5	mL	<0°C	KOAGÜLOMETRİ	Sal 08:00 Per 08:00	Per 18:00 Pzt 18:00
C8530503	**Protein S Antijen, Total**							
	Heparin/oral antikoagülan tedavisi kesildikten 2-4 hafta sonra örnek alınmalıdır. Plazma örneği en az iki ayrı tüpe bölünerek dondurulmalıdır. Hemolizli, lipemik, ikterik ve fibrin içeren numuneler analiz için kullanılmaz.							
	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	**Sitrat-Mavi Kapak**	0.5	mL	<0°C	ELİSA	Sal 08:00	Per 18:00
C8415501	**Protein, Total**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8352012	**Protein 14-3-3 (CJD) ²**							
	BOS, Dondurulmuş	**Polietilen/polipropilen tüp**	1	mL	<0°C	ELISA	Sal 08:00	3 hafta sonra
	BOS, Dondurulmuş: Örneğin dondurulmuş olarak transportu gerekmektedir. Polypropylene tüpler Labmed örnek kabulden temin edilebilir.							
C8415500	**Protein/Kreatinin Oranı, İdrar (Spot)**							
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	3	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8412004	**Protoporfirin, Eritrosit ²**							
	Tam Kan (Heparin)	**Heparin-Yeşil Kapak**	2	mL	2-8°C	HPLC	Sal 08:00	1 hafta sonra
	Tam Kan (Heparin): Test için Heparin-Tam kan gerekmektedir.							
C8561001	**Protrombin Zamanı (PT)**							
	Profil içeriğinde; INR ve Protrombin Zamanı (sn) çalışılmaktadır.							
	Plazma (Sitrat)	**Sitrat-Mavi Kapak**	1	mL	18-24°C	KOAGÜLOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8248001	**Pseudokolinesteraz**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	ENZİMATİK	Sal 08:00 Per 08:00	Çar 18:00 Cum 18:00
	Serum: Örnek ameliyattan önce veya ameliyatı takiben 2 gün içinde alınmalıdır. Örnek oda sıcaklığında tamamen pıhtılaştıktan sonra santrifüj edilmelidir.							
C8561002	**PT (Protrombin Zamanı) Karışım Testi**							
	Plazma (Sitrat)	**Sitrat-Mavi Kapak**	4	mL	18-24°C	KOAGÜLOMETRİ	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
	Plazma (Sitrat): Test ile, hasta ve kontrol plazmalarından ve hasta-kontrol plazma karışımından 0., 60. ve 120. dakikalarda toplam 5 defa PT ölçümü yapılmaktadır.							
C8684919	**pTau-205 (Tau Patolojisi Biyobelirteci)**							
	SR-X Ultra Hassas Biyobelirteç Tespit Sistemi kullanılarak parametreler yüksek duyarlılıkla analiz edilir.							
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş	**EDTA-Mor Kapak**	4	mL	-80 °C	SIMOA (Single Molecule Array)	Pzt 08:00 Per 08:00	1 hafta sonra
C8684922	**pTau-217 (Tau Patolojisi Biyobelirteci)**							
	TR: SR-X Ultra Hassas Biyobelirteç Tespit Sistemi kullanılarak parametreler yüksek duyarlılık ile analiz edilir.							
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş	**EDTA-Mor Kapak**	1	mL	<0°C	SIMOA (Single Molecule Array)	Paz 08:00 Per 08:00	1 hafta sonra
C8684918	**pTau-231 (Tau Patolojisi Biyobelirteci)**							
	SR-X Ultra Hassas Biyobelirteç Tespit Sistemi kullanılarak parametreler yüksek duyarlılıkla analiz edilir.							
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş	**EDTA-Mor Kapak**	4	mL	-80 °C	SIMOA (Single Molecule Array)	Pzt 08:00 Per 08:00	1 hafta sonra
C8707502	**Püy Kültürü** [1] [3]							
	Püy (cerahat)	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	2	gr	2-8°C	K/T/D	Pzt-Cmt 12:00	6 gün sonra 17:00
	Püy (cerahat): Örnekler steril kaplara alınmalıdır. Üremeyi engelleyici herhangi bir madde (alkol vs.) ile karşılaşmadan laboratuvara steril ortamda aktarılmalıdır. Örneğin nereden alındığı mutlaka belirtilmelidir. Uygun olmayan koşullar: Steril olmayan ya da sızdıran kaplar kullanılması, kuru örnekler, kuru swablar. 24 saat, buzdolabında ve derin dondurucuda bekletilmiş örnekler kabul edilmez. Aspirat mayii steril kapaklı enjektör içinde, pürülan materyal steril tüp, anaerob transport besiyeri içerisinde, swablar ise bakteriyel transport besiyeri içerisinde 15-25 °C'de transport edilir.							
C8648001	**QuantiFERON TB-Gold (Gama İnterferon Salınım Deneyi) (IGRA)**							
	Laboratuvara Danışınız	**Laboratuvara danışınız**	0		2-8°C	EİA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Çar-Cmt 18:00 Pzt 18:00
	Laboratuvara Danışınız: Bu test için kan örneği dört farklı özellikte tüpe alınır. QuantiFERON Nil (beyaz halka ve gri kap), TB1 (beyaz halka ve yeşil kap), TB2 (beyaz halka ve sarı kap) ve Mitojen (beyaz halka ve mor kapak). 17°C–25°C de bekletilen tek hasta paketindeki her bir QuantiFERON®-TB Gold tüpüne (Nil, TB1, TB2 ve Mitogen tüpleri) 1 ml kan alınır. Tüpler işaretli çizgiye kadar alındıktan hemen sonra, tüpün iç kısmının her tarafı kanla kaplanacak şekilde 10 kez alt üst edilir. Aşırı kuvvetli sallamalardan kaçınılmalıdır. Tüpler karıştırıldıktan sonra 37 ° C'de 16-24 saat boyunca dikey olarak inkübe edilmelidir. Hasta paketindeki QuantiFERON®-TB Gold tüpüne (Nil, TB1, TB2 ve Mitogen tüpleri) alınan kan örneği inkübasyon öncesi en fazla 16 saat oda ısısında bekletilebilir. İnkübasyonun ardından tüpler plazmanın ayrılması için 2000-3000 RFG (g) 'de 15 dakika santrifüjlenir. Kan örneği lityum ya da sodyum heparin içerikli tüpe alınıp daha sonrasında hasta paketindeki QuantiFERON®-TB Gold tüpü (Nil, TB1, TB2 ve Mitogen tüpleri)içerisine aktarıldığında inkübasyon öncesi oda ısısında en fazla 3 saat, 2-8 C° de en fazla 48 saat bekletilebilir. 2-8 C° bekletilen örneklerin QuantiFERON®-TB Gold tüpüne aktarımı öncesi oda ısısına gelmeleri beklenmelidir. QuantiFERON®-TB Gold tüplerine aktarım sonrası en geç 2 saat içerisinde inkübasyon başlatılmalıdır. İnkübasyonun ardından tüpler plazmanın ayrılması için 2000-3000 RFG (g) 'de 15 dakika santrifüjlenir. Hemolizli,lipemik ve santrifüjlenmeyen ya da inkübasyon öncesi oda sıcaklığında belirtilen süreden fazla bekletilen örnekler test için uygun değildir.							

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8684914	**Rabies Antikoru**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	NÖTRALİZASYON	Sal 08:00	2 hafta sonra
C8029908	**Rapamisin (Rapamycin) (Sirolimus)**							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	CMİA	Pzt-Cum 12:00	Pzt-Cum 18:00
C8280012	**Redüktan Madde, Gaita**							
	Gaita, Dondurulmuş	**Plastik Kap**	2	gr	<0°C	MANUEL	Pzt-Cum 12:00	Pzt-Cum 18:00
C8280011	**Redüktan Madde, İdrar (Spot)**							
	Spot İdrar, Dondurulmuş	**Plastik Kap**	5	mL	<0°C	MANUEL	Pzt-Cum 12:00	Pzt-Cum 18:00
	Spot İdrar, Dondurulmuş: Örnek laboratuvara hızlı şekilde ulaştırılmalıdır.							
C8707535	**Rektal Sürüntü Kültürü**							
	Rektal Sürüntü	**Jelli Swap**	0		2-8°C	K/T/D	Pzt-Cmt 12:00	6 gün sonra 17:00
C8424401	**Renin, Direkt (Aktif Renin)**							
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş	**EDTA-Mor Kapak**	1	mL	<0°C	CLIA	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Sal 18:00 Per 18:00 Pzt 18:00
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş: Örnek erişkin hastalardan ayakta veya yatar pozisyonda alınmalıdır. 16 yaşın altındaki hastalarda ayakta pozisyonda örnek alınmaz Yatarak: hasta yataktan kalkmadan önce alınmalıdır. Ayakta: Hasta yataktan kalktıktan en az 2 saat geçtikten sonra örnek alınmalıdır. EDTA'lı tüpten plazma ayırma işlemi için soğutmalı santrifüj kullanılmamalıdır. Plazma ayrıldıktan sonra dondurulmalıdır.							
C8742001	**Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antijeni**							
	Bronkoalveoler Lavaj	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	1	mL	2-8°C	İMMUNOKROMATOGRAFİ	Pzt-Cum 12:00 Cmt 12:00	Sal-Cmt 18:00 Pzt 18:00
	Nazofaringeal Aspirat	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	2	mL	2-8°C	İMMUNOKROMATOGRAFİ		
	Nazofarinks Sürüntüsü	**Dacron/ Rayon Swab**	0		2-8°C	İMMUNOKROMATOGRAFİ		
	Transtrakeal Aspirat	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	1	mL	2-8°C	İMMUNOKROMATOGRAFİ		
	Nazofarinks Sürüntüsü: Swab; örnek alınan kısım dibe gelecek şekilde kuru steril tüp içerisine veya kağıt ambalajın içine konur. Üst kısım kapatılarak laboratuvara gönderilir.							
C8679006	**Respiratory Syncytial Virus (RSV) Antikoru, IgA ²**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	EİA	Sal 08:00	1 hafta sonra

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8779823	**Respiratory Syncytial Virus (RSV) RNA (PCR)**							
	Balgam	**Plastik Kap**	2	mL	2-8°C	REAL TİME PCR	Pzt-Cum 08:00	3 gün sonra
	Boğaz Sürüntüsü	**Nucliswab**	0		2-8°C	REAL TİME PCR		
	Bronkoalveoler Lavaj	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	2	mL	2-8°C	REAL TİME PCR		
	Doku	**Plastik Kap**	1	gr	2-8°C	REAL TİME PCR		
	Nazofaringeal Aspirat	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	2	mL	2-8°C	REAL TİME PCR		
	Nazofarinks Sürüntüsü	**Nucliswab**	0			REAL TİME PCR		
	Transtrakeal Aspirat	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	2	mL	2-8°C	REAL TİME PCR		
C8392916	**Respiratuvar Antijen Paneli (Adenovirüs, Influenza (A+B), RSV Antijenleri), Hızlı Test**							
	Nazofarinks Sürüntüsü	**Laboratuvara danışınız**	0		2-8°C	İMMUNOKROMATOGRAFİ	Pzt-Paz	1 saat sonra
C8745001	**Respiratuvar Panel, PCR**							
	Bu panel içerisinde; Adenovirüs, Bocavirüs, Bordetella pertussis, İnfluenza A, İnfluenza A, H1, İnfluenza A, H1N1/2009, İnfluenza A, H3, İnfluenza B, İnsan Metapnömovirüs A/B, Koronavirüs HKU1, Koronavirüs NL63, Koronavirüs OC43, Koronavirüs 229E, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, Parainfluenza Virüs 1, Parainfluenza Virüs 2, Parainfluenza Virüs 3, Parainfluenza Virüs 4, Respiratuvar Sinsityal Virüs A/B, Rhinovirus/Enterovirus, 2019-nCoV (SARS-CoV-2) ve Chlamydophila pneumoniae bulunmaktadır.Sürüntü örnekleri için NUCLİSWAB kullanılır.Nucliswab ile örnek alımı şu şekilde olmaktadır.Nucliswab istendiğinde sizlere yanında özel taşıma sıvısı (Tris-EDTA) ile birlikte steril poşette swablar gönderilecektir.Örnek bu swablarla alındıktan sonra çubuğun uç kısmı tüpün içine sığacak boyda kırılarak dakronlu kısım tüp içerisine atılır ve kapak kapatılır.							
	Boğaz Sürüntüsü	**Nucliswab**	0		2-8°C	REAL TİME PCR	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Bronkoalveoler Lavaj	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	5	mL	2-8°C	REAL TİME PCR		
	Nazofarinks Sürüntüsü	**Nucliswab**	0		2-8°C	REAL TİME PCR		
C8745004	**Respiratuvar PCR 7'li Panel (A grup Strep, Inf (A+B), Adeno, Rhino, RSV (A+B))**							
	Nazofaringeal+Orofarengeal Sürüntü	**VNAT (Rayon+VTM)**	0		2-8°C	REAL TIME PCR	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8504401	**Retikülosit Sayımı**							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak (CBC)**	2	mL	2-8°C	DC, FC	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8459002	**Retinol Bağlayıcı Protein ²**							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	0.5	mL	<0°C	RİD	Sal 08:00	10 gün sonra
	Spot İdrar, Dondurulmuş	**Plastik Kap**	10	mL	<0°C	RİD		
C8690601	**Rh alt grupları**							
	C-c-E-e-K antijenleri çalışılmaktadır.							
	Tam Kan (EDTA) (TM)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	JEL SANTRİFÜGASYON	Pzt-Cmt	1 gün sonra

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8660915 **Rickettsia Antikoru, IgG ²**								
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	İFT	Sal 08:00	10 gün sonra
C8392527 **Risperidon (Risperidone) ²**								
	Serum, Dondurulmuş	**Jelsiz Tüp**	1	mL	<0°C	LC-MS/MS	Sal 08:00	1 hafta sonra
C8630500 **ROMA-indeksi (Over Malignite Riski)**								
	Panel içinde; Human Epididymis Protein 4 (HE4) ve CA 125 testleri yer alır. İlk 48 saat içerisinde çalışılmayacak örnekler dondurulmalıdır.							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	2	mL	<0°C	ECLİA	Sal 08:00	Çar 18:00
	Serum, Dondurulmuş: Örnek oda sıcaklığında tamamen pıhtılaştıktan sonra santrifüj edilmelidir.							
C8643101 **Romatoid Faktör (RF)**								
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	TÜRBİDİMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Örnek oda sıcaklığında tamamen pıhtılaştıktan sonra santrifüj edilmelidir.							
C8742501 **Rotavirus Antijeni**								
	Gaita	**Plastik Kap**	2	gr	2-8°C	İMMUNOKROMATOGRAFİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8636189 **rT3**								
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Salı 08:00	2 hafta sonra
C8676201 **Rubella Antikoru (Kızamıkçık), IgG**								
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	CMİA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8676202 **Rubella Antikoru (Kızamıkçık), IgM**								
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	CMİA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8676204 **Rubella IgG Avidite**								
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	ELİSA	Pzt 08:00 Per 08:00	Sal 18:00 Cum 18:00
	Serum: Lityum heparinli, citratlı ve EDTA'lı plazma da kullanılabilir. Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz. Avidite, antijen üzerinde yer alan çok sayıdaki epitop ile antikor moleküllerinin bağlanma bölgeleri arasındaki bağlanma gücüdür. IgG antikor avidite testleri, primer enfeksiyonun olası etiyolojisini ve süresini belirlemede ve primer enfesiyonun re-enfeksiyon, reaktivasyon ya da aşılama sonrası yanıttan ayırımında kullanılmaktadır. Çalışılan avidite testlerinde öncelikle o virüs için IgG düzeyi saptanmakta ve IgG pozitif olanlarda daha sonra Avidite ölçümleri için işlemlere devam edilmektedir. Dolayısı ile IgG Avidite testleri viral IgG'si pozitif olanlarda çalışılmalı ve bu örnekler Avidite testi çalışılmak üzere gönderilmelidir.							

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8676203	**Rubella RNA (PCR)**							
	Amniyotik Sıvı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	5	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
	Boğaz Sürüntüsü	**Nucliswab**	0		2-8°C	PCR		
	Doku	**Plastik Kap**	0		2-8°C	PCR		
	Kordosentez(Kordon Kanı)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	PCR		
	Koryon Villus Biyopsisi (CVS)	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	3	villüs	2-8°C	PCR		
	Nazofarinks Sürüntüsü	**Nucliswab**	0		2-8°C	PCR		
	Plazma (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	PCR		
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	PCR		
C8780068	**Rubella RNA (PCR), BOS**							
	BOS	**BOS Tüpü**	1	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	Sal-Cmt 18:00
C8676502	**Rubeola (Kızamık) Antikoru, IgG**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	CLIA	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Sal 18:00 Per 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8676501	**Rubeola (Kızamık) Antikoru, IgM**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	CLIA	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Sal 18:00 Per 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8925619	**Rutin Tarama Paneli, Geniş**							
	Panel içeriğinde; Tiroid Stimülan Hormon (TSH), Glukoz, Açlık, Kreatinin, Aspartat Aminotransferaz (AST), Alanin Aminotransferaz (ALT), Hemoglobin A1c (HbA1c), Vitamin D, 25-Hidroksi, Vitamin B12, Kalsiyum (Ca), Kolesterol, LDL (Direkt), Trigliserid, Tam Kan Sayımı, Kolesterol, HDL, Potasyum (K), Sodyum (Na), Ürik Asit, Magnezyum (Mg), Kolesterol, Total, İdrar analizi, Tam, Üre Azotu (BUN), İnsülin, İnsülin Rezistans İndeksi (HOMA-IR), Mikroalbumin, İdrar (spot), Eritrosit Sedimentasyon Hızı (ESR) yer almaktadır. Test panelinde tanımlı tüm örnek türleri gereklidir.							
	Tam Kan	**Sitrat-Siyah Kapak**	2	mL	2-8°C		Pzt-Cum 08:00 Cmt 08:00	Sal-Cmt 18:00 Pzt 18:00
	Plazma (NaF)	**Florür-Gri Kapak**	2	mL	2-8°C			
	Serum	**Jelli Tüp**	3	mL	2-8°C			
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	5	mL	2-8°C			
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak (HbA1c)**	2	mL	2-8°C			
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak (CBC)**	2	mL	2-8°C			

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8019601 **Salisilat (Salicylate)**								
	Serum	**Jelsiz Tüp**	1	mL	2-8°C	TÜRBİDİMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Kan örneği, separatör jel içermeyen tüplere alınmalıdır.							
C8631802 **Salmonella Agglütinasyonu (Gruber Widal)**								
	Bu panel içerisinde, Salmonella paratyphi AH, Salmonella paratyphi AO, Salmonella paratyphi BH, Salmonella paratyphi BO, Salmonella typhi H ve Salmonella typhi O bulunmaktadır.							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	AGLUTİNASYON	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Çar-Cmt 18:00 Sal 18:00
	Serum: Hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kabul edilmez.							
C8780222 **SARS- CoV-2 RNA (PCR)**								
	Nazofaringeal+Orofarengeal Sürüntü	**Viroswab + Virotransfer**	0		2-8°C	REAL TIME PCR	Pzt-Cum Cmt 14:00	1 gün sonra Cmt 20:00
C8780233 **SARS- CoV-2 RNA (PCR), Ağız Çalkalama Suyu**								
	Gargara ve ağız çalkalama suyu	**MyMagiCon Tüpü**	20	mL	18-24°C	REAL TIME PCR	Pzt-Cum Cmt 14:00	1 gün sonra Cmt 20:00
	Gargara ve ağız çalkalama suyu: Örnek alımı: MyMagiCon tüpü 20 ml çizgisine kadar içme suyu doldurarak kişiye, örneği geri koymak için kullanılacak kağıt huni ile birlikte verilir.Kişinin bu suyu ağzına alıp, önce boğazında birkaç saniye gargara yapıp, sonra ağzının içerisinde en az 10 saniye dişlerinin arasından suyu geçirerek kuvvetlice çalkalaması ve kağıt huni yardımı ile tüpe geri koyması söylenir.Küçük çocuklar gargara yapmadan sadece ağzını çalkalayarak örnek verebilirler.Tüpün kapağını sıkıca kapatarak laboratuvara inceleme için oda sıcaklığında, aynı gün içerisinde gönderilir. Çalışma temeli: MyMagiCon polimeri örneğe eklenince su ve diğer küçük molekkülleri içerisine alarak mikroorganizmaları, antijenlerini ve nükleik asitlerini yoğunlaştırır. Böylece polimeraz zincirleme tepkimesi (PZT) gibi nükleik asit çoğaltma yöntemleri ve antijen testlerinin duyarlılıklarını arttırır.							
C8392908 **SARS-CoV-2 Antijen Testi (Hızlı Test)**								
	Gargara ve ağız çalkalama suyu	**MyMagiCon Tüpü**	20	mL	18-24°C	İMMUNOKROMATOGRAFİ	Pzt-Pzr	1 saat sonra
	Nazofarinks Sürüntüsü	**Laboratuvara danışınız**	0		2-8°C	İMMUNOKROMATOGRAFİ		
C8392909 **SARS-CoV-2 Antikoru, IgG, Kantitatif**								
	SARS-CoV-2 IgG testi; virüsün spike protein reseptör bağlanma bölgesine (S1 RBD) karşı oluşan IgG antikorunun kantitatif ölçümüdür.							
	Plazma (Heparin)	**Heparin-Yeşil Kapak**	1	mL	2-8°C	EIA	Sal 08:00	Çar 18:00
C8392911 **SARS-CoV-2 / Influenza (A+B) Antijeni (Hızlı İkili Test)**								
	Nazofarinks Sürüntüsü	**Laboratuvara danışınız**	0		2-8°C	İMMUNOKROMATOGRAFİ	Pzt-Pz	1 saat sonra
C8684906 **Schistosoma Antikoru ²**								
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1	mL	<0°C	IHA/ IFT	Sal 08:00	2 hafta sonra

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8427001	**Seks Hormonu Bağlayıcı Globulin (SHBG)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	ECLİA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8425501	**Selenyum (Se)**							
	Plazma (Heparin)	**Sodyum Heparin-Lacivert Kapak**	2	mL	2-8°C	İCP-MS	Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00
C8425505	**Selenyum (Se), Eritrosit**							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	İCP-MS	Sal 08:00 Cum 08:00	Cum 18:00 Pzt 18:00
C8425504	**Selenyum (Se) / Kreatinin Oranı, İdrar (Spot)**							
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	5	mL	2-8°C	ICP-MS	Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00
C8707505	**Semen Kültürü**							
	Semen	**Plastik Kap**	0.3	mL	18-24°C	K/T/D	Pzt-Cmt 12:00	4 gün sonra 17:00
	Semen: Örnek Alım Özellikleri: Örnekler steril kaplara alınmalıdır. Üremeyi engelleyici herhangi bir madde(alkol vs.) ile karşılaşmadan laboratuvara steril ortamda aktarılmalıdır.							
C8557614	**Serbest Androjen İndeksi**							
	Panel içeriğinde; Seks Hormonu Bağlayıcı Globulin (SHBG) ve Testosteron, Total yer almaktadır.							
	Serum	**Jelli Tüp**	1.5	mL	2-8°C		Pzt 08:00 Per 08:00	Pzt 18:00 Per 18:00
C8278421	**Serbest Kappa Hafif Zinciri, İdrar (24 saat)**							
	24 Saatlik İdrar	**24 Saatlik İdrar Kabı**	5	mL	2-8°C	NEFELOMETRİ	Pzt 08:00 Çar 08:00	Sal 18:00 Per 18:00
C8278419	**Serbest Kappa Hafif Zinciri, Serum**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	NEFELOMETRİ	Pzt 08:00 Çar 08:00	Sal 18:00 Per 18:00

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8278422	**Serbest Lambda Hafif Zinciri, İdrar (24 saat)**							
	24 Saatlik İdrar	**24 Saatlik İdrar Kabı**	5	mL	2-8°C	NEFELOMETRİ	Pzt 08:00 Çar 08:00	Sal 18:00 Per 18:00
C8278420	**Serbest Lambda Hafif Zinciri, Serum**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	NEFELOMETRİ	Pzt 08:00 Çar 08:00	Sal 18:00 Per 18:00
C8426001	**Serotonin**							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Pzt 08:00	Sal 18:00
	Tam Kan (EDTA): Kan alımından 72 saat öncesine kadar herhangi bir ilaç(Lityum,MAO inhibitörleri, Metildopa, Morfin, Reserpin vb.) kullanımından kaçınılmalıdır.							
C8426003	**Serotonin, İdrar (24 saat)**							
	24 Saatlik İdrar	**24 Saatlik İdrar Kabı**	5	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Pzt 08:00	Sal 18:00
C8239001	**Seruloplazmin**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	NEFELOMETRİ	Cum 08:00	Pzt 18:00
C8388305	**Serum Amiloid A**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	NEFELOMETRİ	Pzt-Per 08:00	1 gün sonra 18:00
C8301839	**s-Fenilmerkaptürik Asit**							
	Işık korumasına gerek yoktur.							
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	3	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Pzt-Cum 08:00	10 gün sonra
C8265705	**Sfingomyelinaz, Lökosit**							
	Lizozomal Enzim Testleri İstek Formu eksiksiz doldurulmalı ve örnek ile birlikte gönderilmeli.							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	8	mL	2-8°C	FLUOROMETRİ	Pzt 08:00	Cum 18:00
	Tam Kan (EDTA): Numune hafta içi günlerde ve mümkünse kurye/kargo zamanına yakın olarak alınmalıdır. Aşırı hemolizli örnekler kabul edilmez.							

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8780229	**SİBO Nefes Testi**							
	Bu test için Sibo Nefes Testi Hasta Bilgilendirme Formu bulunmaktadır. Test öncesi diyet ve ilaçlarla ilgili kısıtlamalara uyulmalıdır. Örnekler ile birlikte Sibo Nefes Testi Örnek Alma Formu gönderilmelidir.							
	Nefes	**Özel Torba**	0		18-24°C	Elektrokimyasal ve Lazer Ölçüm	Pzt 09:00 Çar 09:00 Cum 09:00	Çar 18:00 Cum 18:00 Pzt 18:00
	Nefes: Bu test için Sibo Nefes Testi Hasta Bilgilendirme Formu bulunmaktadır. Test öncesi diyet ve ilaçlarla ilgili kısıtlamalara uyulmalıdır. Örnekler ile birlikte Sibo Nefes Testi Örnek Alma Formu gönderilmelidir.							
C8659206	**Sifiliz Profili**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8015801	**Siklosporin A (Cyclosporine A)**							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	CMİA	Pzt-Cum 12:00	Pzt-Cum 18:00
C8015802	**Siklosporin A (Cyclosporine A) (LC-MS/MS)**							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Pzt-Cum 12:00	Pzt-Cum 18:00
C8388301	**Sistatin-C**							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1.5	mL	<0°C	NEFELOMETRİ	Sal 08:00 Cum 08:00	Çar 18:00 Pzt 18:00
C8388303	**Sistatin-C, İdrar**							
	İdrar, Dondurulmuş	**Plastik Kap**	2	mL	<0°C	NEFELOMETRİ	Sal 08:00 Cum 08:00	Çar 18:00 Pzt 18:00
C8732702	**Sistemik Viral Panel, PCR**							
	Panel içeriğinde; Adenovirus, Cytomegalovirus (CMV), Epstein-Barr Virus (EBV), Parvovirus B19, Varicella Zoster Virus (VZV), Herpes Simplex Virus 1 (HSV 1), Herpes Simplex Virus 2 (HSV 2), Human Herpes Virus 6 (HHV6), Human Herpes Virus 7 (HHV7), Enterovirüs ve Parechovirüs bulunmaktadır.							
	BOS	**BOS Tüpü**	2	mL	2-8°C	REAL TİME PCR	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Sal 18:00 Per 18:00 Cmt 18:00
	Doku	**Plastik Kap**	0		2-8°C	REAL TİME PCR		
	İdrar	**Steril Tüp**	2	mL	2-8°C	REAL TİME PCR		
	Plazma (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	REAL TİME PCR		

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8261502 **Sistin, İdrar (24 saat)**								
	24 Saatlik İdrar, Dondurulmuş	**24 Saatlik İdrar Kabı**	10	mL	<0°C	LC-MS/MS	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Çar 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00
C8261504 **Sistin/Kreatinin Oranı, İdrar (Spot)**								
	Spot İdrar, Dondurulmuş	**Plastik Kap**	5	mL	<0°C	LC-MS/MS	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Çar 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00
C8250707 **Sitrat / Kreatinin Oranı, İdrar (Spot)**								
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	5	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt 08:00 Per 08:00	Pzt 18:00 Per 18:00
C8250703 **Sitrat, İdrar (24 saat)**								
	24 Saatlik İdrar	**24 Saatlik İdrar Kabı**	2	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt 08:00 Per 08:00	Pzt 18:00 Per 18:00
C8429501 **Sodyum (Na)**								
	Serum	**Jelli Tüp**	0.2	mL	2-8°C	İSE	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8430007 **Sodyum (Na), Biyolojik Sıvı**								
	Biyolojik Sıvı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	0.2	mL	2-8°C	İSE	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8430006 **Sodyum (Na), BOS**								
	BOS	**BOS Tüpü**	0.5	mL	2-8°C	İSE	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8430004 **Sodyum (Na), İdrar (Spot)**								
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	0.2	mL	2-8°C	İSE	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8430005 **Sodyum (Na), İdrar (24 saat)**								
	24 Saatlik İdrar	**24 Saatlik İdrar Kabı**	2	mL	2-8°C	İSE	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8615702 **Soğuk Aglütininler (Titre)**								
	Hasta örneği santrifüj işleminden önce 15 dakika 37°C' de bekletilerek pıhtılaşması sağlanır ve sonra santrifüj edilerek serum/plazma örneği ayrılır. Anlaşmalı kurumlardan gelen örnekler için İmmünohematoloji Testleri Bilgi Formu eksiksiz doldurulmalı ve hekim tarafından kaşeli/imzalı olarak örnek ile beraber gönderilmelidir.							
	Serum ve EDTA Tam Kan	**Jelli Tüp + EDTA**	4	mL	2-8°C	JEL SANTRİFÜGASYON	Pzt-Cum 12:00	Pzt-Cum 18:00

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8636170	**Soluble CD25 Düzeyi ²**							
	BOS, Dondurulmuş	**BOS Tüpü**	1	mL	<0°C	LİA	Sal 08:00	1 hafta sonra
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	2	mL	<0°C	LİA		
C8446603	**Soluble Transferrin Reseptörü (sTfR)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	NEFELOMETRİ	Pzt 08:00	Çar 18:00
	Serum: Örnek en az 8 saat açlıkta alınmalıdır.							
C8708145	**Solunum Sekresyonlarının Kantitatif Kültürü**							
	Anestezik jel varlığı antimikrobiyal etki yaratacağından kullanılmamış olması gerekir. Uygun olmayan koşullar: Steril olmayan ya da sızdıran kapla örneğin laboratuvara ulaşması. Laboratuvara 1 ml. 'nin altında örnek gönderilmemelidir. Solunum sekresyonlarının kantitatif kültüründe, sonuçlar kantitatif verildiği yani dilüsyonlu çalışıldığı için, daha az miktarda örnek gönderilmesi çalışma açısından uygun olmamaktadır.							
	Bronkoalveoler Lavaj	**Steril Tüp**	1	mL	2-8°C	K/T/D	Pzt-Cmt 12:00	4 gün sonra 17:00
	Transtrakeal Aspirat	**Steril Tüp**	1	mL	2-8°C	K/T/D		
C8430501	**Somatomedin-C (IGF-1)**							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1	mL	<0°C	CLIA	Sal 08:00 Per 08:00	Çar 18:00 Cum 18:00
C8932502	**Sperm Antikoru, IgA ²**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	ml	2-8°C	EİA	Sal 08:00	10 gün sonra
C8431501	**Spesifik Gravite, İdrar hariç**							
	Biyolojik Sıvı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	3	mL	2-8°C	MANUEL	Pzt-Cmt 14:00	Pzt-Cmt 18:00
C8600310	**Spesifik IgE- Acarus siro (d70)**							
	Serum	**Jelsiz Tüp**	0.5	mL	2-8°C	RAST	Pzt 08:00	Sal 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8600145	**Spesifik IgE- Ağaç Karışımı (tx7)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Test içeriğinde; Zeytin Ağacı (Olive) (t9), Söğüt (Willow) (t12), Çam ağacı (White Pine) (t16), Okaliptüs (Eucalyptus) (t18), Akasya/Mimoza (Acacia) (t19), Melaleuca ağacı (Melaleuca) (t21) bulunmaktadır.							

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8600305	**Spesifik IgE- Ağaç Karışımı 1 (tx1)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Test içeriğinde; - Akçaağaç (Maple) (t1), - Huş ağacı (Birch) (t3), - Meşe ağacı (Oak) (t7), - Karaağaç (Elm) (t8), - Ceviz ağacı (Walnut) (t10) bulunmaktadır.							
C8600108	**Spesifik IgE- Ağaç Karışımı 2 (tx2)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Test içeriğinde; Akçaağaç (Maple) (t1), Meşe (Oak) (t7), Karaağaç (Elm) (t8), Kavak (Cottonwood) (t14), Hickory ağacı (Pecan) (t22) bulunmaktadır.							
C8600109	**Spesifik IgE- Ağaç Karışımı 9 (tx9)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Test içeriğinde; - Kızıl ağaç (Alder)(t2), - Huş ağacı (Birch) (t3), - Fındık ağacı (Hazelnut) (t4), - Meşe ağacı (Oak) (t7), - Söğüt ağacı (Willow) (t12) bulunmaktadır.							
C8600125	**Spesifik IgE- Ak Tavşan Epiteli (e20) ²**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	FEİA	Pzt 08:00 Çar 08:00	2 hafta sonra
C8600147	**Spesifik IgE- Alabalık (Trout) (f204)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600385	**Spesifik IgE- Alfa Laktalbumin (f76)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600334	**Spesifik IgE- Alternaria tenius (A. Alternata) (m6)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600392	**Spesifik IgE- Amoksisilin (c204)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8600391	**Spesifik IgE- Ampisilin (c203)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600164	**Spesifik IgE- Antep Fıstığı (Pistachio) (f203)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600359	**Spesifik IgE- Armut (Pear) (f94)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt:18:00
C8600426	**Spesifik IgE- Arpa Unu (Barley) (f6)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600443	**Spesifik IgE- Artikain**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	RAST	Pzt 08:00	Sal 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8600340	**Spesifik IgE- Ascaris (p1)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600335	**Spesifik IgE- Aspergillus Fumigatus (m3)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600414	**Spesifik IgE- Aspirin**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	RAST	Pzt 08:00	Sal 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8600388	**Spesifik IgE- At Kepeği (Horse Dander) (e3)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt:18:00

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR	TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8600449	**Spesifik IgE Avokado (f96)**						
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5 mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600320	**Spesifik IgE- Ayrık Otu (Bermuda Grass) (g2) [2]**						
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3 mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600377	**Spesifik IgE- Badem (Almond) (f20)**						
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3 mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600372	**Spesifik IgE- Bal (Honey) (f247)**						
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3 mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600342	**Spesifik IgE- Balarısı Zehiri (Bee Venom) (i1) [1] [3]**						
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3 mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600386	**Spesifik IgE- Beta Laktoglobulin (f77)**						
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3 mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600369	**Spesifik IgE- Brezilya Cevizi (Brazil nut) (f18)**						
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5 mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt:18:00
C8600399	**Spesifik IgE- Buğday Poleni (Wheat Pollen) (g15)**						
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3 mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600319	**Spesifik IgE- Buğday Unu (Wheat Flour) (f4)**						
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3 mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8600336	**Spesifik IgE- Candida albicans (m5)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600417	**Spesifik IgE- Ceviz (Walnut) (f256)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600337	**Spesifik IgE- Cladosporium herbarum (m2)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600138	**Spesifik IgE- Çavdar (Rye) (g12)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600345	**Spesifik IgE- Çavdar Unu (Rye Flour) (f5)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600324	**Spesifik IgE- Çayır Otu (Timothy Grass) (g6)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600160	**Spesifik IgE- Çedar Peyniri (Cheddar Cheese) (f81)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600456	**Spesifik IgE Çikolata (f105)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600370	**Spesifik IgE- Çilek (Strawberry) (f44)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8600302	**Spesifik IgE- Çocuk Gıda Paneli (fx5)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Test içeriğinde; - Yumurta Beyazı (Egg white) (f1), - İnek Sütü (Cow's milk) (f2), - Morina Balığı (Codfish) (f3), - Buğday Unu (Wheat) (f4), - Yer Fıstığı (Peanut) (f13), - Soya Fasulyesi (Soybean) (f14) bulunmaktadır.							
C8600120	**Spesifik IgE- Dar Yapraklı Sinir Otu (Plaintain) (w9)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	RAST	Pzt 08:00	Sal 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8600323	**Spesifik IgE- Delice Otu (Rye Grass) (g5)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	RAST	Pzt 08:00	Sal 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8600356	**Spesifik IgE- Dermatophagoides farinae (d2)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600355	**Spesifik IgE- Dermatophagoides pteronyssinus (d1)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600428	**Spesifik IgE- Dil Balığı (Sole) (f337)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600350	**Spesifik IgE- Domates (Tomato) (f25)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600397	**Spesifik IgE- Domuz Eti (Pork) (f26)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	RAST	Pzt 08:00	Sal 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8600106	**Spesifik IgE- Elma (Apple) (f49)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8600303	**Spesifik IgE- Epitel (Epithelia) (ex1)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Test içeriğinde; - Kedi Kepeği-Epiteli (Cat Dander-Epithelium) (e1), - At Kepeği (Horse Dander) (e3), - Sığır Kepeği (Cow Dander) (e4), - Köpek Kepeği (Dog Dander) (e5) bulunmaktadır.							
C8600420	**Spesifik IgE- Erik (Plum) (f255)**							
	Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	RAST	Pzt 08:00	Sal 18:00
C8780205	**Spesifik IgE- Ev Tozu (House Dust, Japan) (h6)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600366	**Spesifik IgE- Ev Tozu (House Dust Greer) (h1)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600404	**Spesifik IgE- Ev Tozu Karışımı (hx1)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Test içeriğinde; Ev Tozu (House Dust Greer) (h1), Dermatophagoides pteronyssinus (d1), Dermatophagoides farinae (d2), Hamam Böceği (German Cockroach) (i6) bulunmaktadır.							
C8600419	**Spesifik IgE- Fasulye (Bean) (f15)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	RAST	Pzt 08:00	Sal 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8600332	**Spesifik IgE- Fındık Ağacı Poleni (Hazel Pollen) (t4)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600348	**Spesifik IgE- Fındık (Hazelnut) (f17)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8019709	**Spesifik IgE Gıda Alerjenleri (34 parametre)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	İMMUNOBLOTTİNG	Pzt 08:00 Per 08:00	Çarş 18:00 Pzt 18:00
C8600353	**Spesifik IgE- Gıda Karışımı 1 (Kuruyemiş) (fx1)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Test içeriğinde; - Yer Fıstığı (Peanut) (f13), - Fındık (Hazelnut) (f17), - Brezilya cevizi (Brazil nut) (f18), - Badem (Almond) (f20), - Hindistan cevizi (Coconut) (f36) bulunmaktadır.							
C8600157	**Spesifik IgE- Gıda Karışımı 13 (Sebze Karışımı) (fx13)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Test içeriğinde; Bezelye (Pea) (f12), Kuru fasulye (White bean) (f15), Havuç (Carrot) (f31), Patates (Potato) (f35) yer almaktadır.							
C8600360	**Spesifik IgE- Gıda Karışımı 2 (Deniz Ürünleri) (fx2)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Test içeriğinde; - Morina Balığı (Codfish) (f3), - Karides (Shrimp) (f24), - Midye (Blue Mussel) (f37), - Ton Balığı (Tuna Fish) (f40), - Somon (Salmon) (f41) bulunmaktadır.							
C8600129	**Spesifik IgE- Gıda Karışımı 3 (Tahıl/Un Karışımı) (fx3)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Test içeriğinde; Buğday Unu (Wheat) (f4), Yulaf Unu (Oat) (f7), Mısır unu (Corn) (f8), Öğütülmüş susam (Sesame seed) (f10), Kara buğday unu (Buchwheat) (f11) bulunmaktadır.							
C8600435	**Spesifik IgE- Gıda Karışımı 50 (Meyve Karışımı) (fx50)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Test içeriğinde; - Kivi (Kiwi) (f84), - Mango (Mango) (f91), - Muz (Banana) (f92), - Ananas (Pineapple) (f210) yer almaktadır.							
C8600425	**Spesifik IgE- Gıda Karışımı 6 (Tahıl/Un Karışımı) (fx6)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Test içeriğinde; Buğday unu (Wheat) (f4), Prinç (Rice) (f9), Susam (Sesame) (f10), Karabuğday Unu (Buckwheat) (f11), Soya Fasulyesi (Soy Bean) (f14) bulunmaktadır.							

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8600434	**Spesifik IgE- Gıda Karışımı 73 (Et Karışımı) (fx73)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Test içeriğinde; - Domuz Eti (Pork) (f26), - Dana Eti (Beef) (f27), - Tavuk Eti (Chicken) (f83), - Kuzu Eti (Lamb) (f88) yer almaktadır.							
C8600134	**Spesifik IgE- Gluten (Gliadin) (f79)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600343	**Spesifik IgE- Hamam Böceği (German Cockroach) (i6)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600152	**Spesifik IgE- Hamsi (Anchovy) (f313)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600166	**Spesifik IgE- Havuç (Carrot) (f31)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600398	**Spesifik IgE- Hindi Eti (Turkey Meat) (f284)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt:18:00
C8600394	**Spesifik IgE- Hindistan cevizi (Coconut) (f36)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600105	**Spesifik IgE- Huş Ağacı (Common Silver Birch) (t3)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600133	**Spesifik IgE- Ispanak (Spinach) (f214)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8600415	**Spesifik IgE- İbuprofen**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	RAST	Pzt 08:00	Sal 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8600406	**Spesifik IgE- İncir (Fig) (f328) ³**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	CLIA	Pzt 08:00 Per 08:00 Cum 08:00	Sal 18:00 Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600316	**Spesifik IgE- İnek Sütü (Cow's Milk) (f2)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600149	**Spesifik IgE- İstavrit (Jack Mackerel, Scad) (f60) ²**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8684915	**Spesifik IgE İtalyan Selvi (T23)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	Kemilüminesans	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600400	**Spesifik IgE- Jelatin (c74) ³**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600139	**Spesifik IgE- Kafes Kuşu Tüy Karışımı (ex72)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Test içeriğinde; Muhabbet Kuşu Tüyü (Budgerigar Feathers) (e78), Kanarya Tüyü (Canary Feathers) (e201), Papağan Tüyü (Parrot Feathers) (e213), İspinoz Kuşu Tüyü (Finch Feathers) (e214) bulunmaktadır.							
C8600432	**Spesifik IgE- Kaju (Cashew) (f202)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600365	**Spesifik IgE- Kakao (Cacao) (f93)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8600126	**Spesifik IgE- Kanarya Tüyü (e201) ³**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600408	**Spesifik IgE- Karabiber (Black Pepper) (f280) ³**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600448	**Spesifik IgE Karabuğday (f11)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600349	**Spesifik IgE- Karides (Shrimp) (f24)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600325	**Spesifik IgE- Kavun (Melon) (f87)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt:18:00
C8600119	**Spesifik IgE- Kayın Ağacı (American Beech) (t5)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600413	**Spesifik IgE- Kayısı (Apricot) (f237)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt:18:00
C8600168	**Spesifik IgE- Kazein (Casein) (f78)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600374	**Spesifik IgE- Keçi sütü (Goat's Milk) (f409)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8600311	**Spesifik IgE- Kedi Epiteli-Kepeği (e1)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600148	**Spesifik IgE- Kefal (Chub mackerel) (f50) ²**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	FEİA	Pzt 08:00 Çar 08:00	2 hafta sonra
C8600130	**Spesifik IgE- Kereviz (Celery) (f85)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600405	**Spesifik IgE- Kestane (Chestnut) (f299)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt:18:00
C8600409	**Spesifik IgE- Kırmızıbiber (Chili Pepper) (f279)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600328	**Spesifik IgE- Kızılağaç Poleni (Alder Pollen) (t2) ²**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt:18:00
C8600389	**Spesifik IgE- Kivi (Kiwi) (f84)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600117	**Spesifik IgE- Kokulu Yonca (Sweet Vernal Grass) (g1)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	RAST	Pzt 08:00	Sal 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8600313	**Spesifik IgE- Köpek Epiteli (Dog Epithelium) (e2)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8600387	**Spesifik IgE- Köpek Kepeği (Dog Dander) (e5)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600162	**Spesifik IgE Kuzu Eti (Lamb) (f88)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600304	**Spesifik IgE- Küf Mantarı Karışımı 1 (mx1)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Test içeriğinde; - Penicillium notatum (m1), - Cladosporium herbarum (m2), - Aspergillus fumigatus (m3), - Candida albicans (m5), - Alternaria tenuis (m6) bulunmaktadır.							
C8600161	**Spesifik IgE- Küflü Peynir (Cheese, Mold type) (f82)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	RAST	Pzt 08:00	Sal 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8600375	**Spesifik IgE- Lateks (k82)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600439	**Spesifik IgE- Lidocain**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	RAST	Pzt 08:00	Sal 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8600132	**Spesifik IgE- Mantar (Mushroom) (f212)**							
	Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	RAST	Pzt 08:00	Sal 18:00
C8600427	**Spesifik IgE- Mercimek (Lentil) (f235)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600124	**Spesifik IgE- Meşe (Oak) (t7)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt:18:00

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8600155	**Spesifik IgE- Mısır Unu (Corn) (f8)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600103	**Spesifik IgE- Midye (Clam) (f207)**							
	Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	RAST	Pzt 08:00	Sal 18:00
C8600315	**Spesifik IgE- Morina Balığı (Codfish) (f3)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600115	**Spesifik IgE- Muhabbet Kuşu Tüyü (Budgerigar Feathers) (e78)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600371	**Spesifik IgE- Muz (Banana) (f92)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600403	**Spesifik IgE- Naproksen**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	RAST	Pzt 08:00	Sal 18:00
	Serum: Serum örneği ile birlikte, hasta için bir adet Naproksen tablet gönderilmelidir. Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8600331	**Spesifik IgE- Okaliptüs (Eucalyptus) (t18)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	RAST	Pzt 08:00	Sal 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8600131	**Spesifik IgE- Ot karışımı 1 (gx1)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Test içeriğinde; - Ayrık Otu (Orchard Grass) (g3), - Çayır Otu (Meadow Fescue) (g4), - Delice Otu/Yemlik Çimen (Perennial Rye Grass) (g5), - Çayır Otu (Timothy Grass) (g6), - Çayır Çimeni (June Grass) (g8) bulunmaktadır.							

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8600136	**Spesifik IgE- Ot karışımı 2 (gx2)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Test içeriğinde; - Ayrık Otu (Bermuda Grass) (g2), - Delice Otu/Yemlik Çimeni (Perennial Rye Grass) (g5), - Çayır Otu (Timothy Grass) (g6), - Çayır Çimeni (June Grass) (g8), - Darı (Johnson Grass) (g10), - Bahia Çimeni (Bahia Grass) (g17) bulunmaktadır.							
C8600361	**Spesifik IgE- Ot karışımı 3 (gx3)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Test içeriğinde; Kokulu Yonca (Sweet Vernal Grass) (g1), Delice Otu/Yemlik Çimeni (Perennial Rye Grass) (g5), Çayır Otu (Timothy Grass) (g6), Çavdar (Cultivated Rye Grass) (g12), Mısır Mercimeği/Sarı Darı (Velvet Grass) (g13) bulunmaktadır.							
C8600378	**Spesifik IgE- Ovalbumin (f232)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8670102	**Spesifik IgE- Ovomukoid (f233)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	Kemilüminesans	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600128	**Spesifik IgE- Pamuk (Cotton) (o1)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600411	**Spesifik IgE- Parasetamol**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	RAST	Pzt 08:00	Salı 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8600159	**Spesifik IgE- Patates (Potato) (f35)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600407	**Spesifik IgE- Patlıcan (Eggplant) (f262)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8600154	**Spesifik IgE- Pediatric Phadiatop**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Test içeriğinde; Yumurta Beyazı (Egg White) (f1), İnek Sütü (Cow's Milk) (f2), Morina Balığı (Codfish) (f3), Buğday Unu (Wheat) (f4), Yer Fıstığı (Peanut) (f13), Soya Fasulyesi (Soybean) (f14), Dermatophagoides pteronyssinus (d1), Köpek Kepeği (Dog Dander) (e5), Kedi Epiteli-Kepeği (Cat Epithelium-Dander) (e1), Ot Karışımı 3 (gx3) (gx3: g1, g5, g6, g12, g13), Ağaç Karışımı 9 (fx9: t2, t3, t4, t7, t12), Yabani Ot/Çiçek Karışımı 3 (wx3: w6, w9, w10, w12, w20) bulunmaktadır.							
C8600153	**Spesifik IgE- Pelin Otu (Common ragweed) (w1)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600339	**Spesifik IgE- Penicillium notatum (m1)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt:18:00
C8600308	**Spesifik IgE- Penisilin G (c1)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600309	**Spesifik IgE- Penisilin V (c2)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600376	**Spesifik IgE- Pirinç (Rice) (f9)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600140	**Spesifik IgE- Polenler ve Küf Mantarları (pax3)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 12:00 Cum 12:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Test içeriğinde; Aspergillus fumigatus (m3), Alternaria tenuis (m6), Cultivated rye grass (Çavdar poleni) (g12), Cultivated wheat grass (Buğday poleni) (g15) bulunmaktadır.							
C8600351	**Spesifik IgE- Portakal (Orange) (f33)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600151	**Spesifik IgE- Sardalya (Sardine) (f308)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt:18:00

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8600410	**Spesifik IgE- Sarıca Arı Zehiri (Paper wasp) (i4)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	RAST	Pzt 08:00	Sal 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8600158	**Spesifik IgE- Sarmaşık (Parietaria judacia) (w21)**							
	Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	RAST	Pzt 08:00	Sal 18:00
C8600114	**Spesifik IgE- Sığır Eti (Beef, Cooked) (f27)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600430	**Spesifik IgE- Siprofloksasin**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	RAST	Pzt 08:00	Sal 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8600121	**Spesifik IgE- Sivrisinek (Mosquito) (i71)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600163	**Spesifik IgE- Siyah Zeytin (Black Olive) (f342)**							
	Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	RAST	Pzt 08:00	Sal 18:00
C8600384	**Spesifik IgE- Soğan (Onion) (f48)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600156	**Spesifik IgE- Solunum Alerjenleri (İnhalasyon Alerjenleri)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 12:00 Cum 12:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Test içeriğinde; Dermatophagoides pteronyssinus (d1), Kedi Epiteli-Kepeği (Cat Epithelium-Dander) (e1), Köpek Kepeği (Dog Dander) (e5), Ayrık Otu (Bermuda Grass) (g2), Çayır Otu (Timothy Grass) (g6), Penicillium notatum (m1), Alternaria tenius (A. Alternata) (m6), Huş Ağacı (Birch) (t3), Japanese Ceddar (t17), Pelin Otu (Common ragweed) (w1), English Plantain (w9), Parietaria officinalis (w19) bulunmaktadır.							
C8019708	**Spesifik IgE Solunum Alerjenleri (26 parametre)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	İMMUNOBLOTTİNG	Pzt 08:00 Per 08:00	Çarş 18:00 Pzt 18:00

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8600104	**Spesifik IgE- Somon Balığı (Salmon) (f41)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600347	**Spesifik IgE- Soya Fasülyesi (Soya Bean) (f14)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600445	**Spesifik IgE- Susam (Sesame) (f10)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600107	**Spesifik IgE- Şeftali (Peach) (f95)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600116	**Spesifik IgE- Tavuk Eti (Chicken) (f83)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600102	**Spesifik IgE- Tonbalığı (Tuna) (f40) ²**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600137	**Spesifik IgE- Tüy Karışımı 1 (ex71)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Test içeriğinde; Kaz Tüyü (Goose Feathers) (e70), Tavuk Tüyü (Chicken Feathers) (e85), Ördek Tüyü (Duck Feathers) (e86), Hindi Tüyü (Turkey Feathers) (e89) bulunmaktadır.							
C8600208	**Spesifik IgE- Un karışımı 129 Paneli**							
	Panel içeriğinde; Buğday Unu (Wheat Flour) (f4), Çavdar Unu (Rye Flour) (f5), Arpa Unu Barley Flour (f6), Yulaf Unu (Oat Flour) (f7), Mısır Unu Corn Flour (f8), Soya Soybean (f14), Gluten (Gliadin) (f79) yer almaktadır. Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	RAST	Pzt 08:00	Sal 18:00

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8600207	**Spesifik IgE- Un karışımı 14 Paneli**							
	Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	RAST	Pzt 08:00	Sal 18:00
	Serum: Test içeriğinde; - Buğday Unu (Wheat Flour) (f4), - Yulaf Unu (Oat Flour) (f7), - Mısır Unu Corn Flour (f8), - Karabuğday (f11), - Susam (Sesame) (f10) bulunmaktadır.							
C8600206	**Spesifik IgE- Un karışımı 2 Paneli**							
	Panel içeriğinde; Buğday Unu (Wheat Flour) (f4), Çavdar Unu (Rye Flour) (f5), Yulaf Unu (Oat Flour) (f7), Gluten (Gliadin) (f79) yer almaktadır. Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	RAST	Pzt 08:00	Sal 18:00
C8600150	**Spesifik IgE- Uskumru (Mackerel) (f206)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	RAST	Pzt 08:00	Sal 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8600165	**Spesifik IgE- Üzüm (Grape) (f259)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600418	**Spesifik IgE- Vanilya (Vanilla) (f234)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600421	**Spesifik IgE- Yaban Mersini (Blueberry) (f288)**							
	Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	RAST	Pzt 08:00	Sal 18:00
C8600123	**Spesifik IgE- Yabanarısı Zehiri (Common wasp) (i3)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600395	**Spesifik IgE- Yabani Ot/Çiçek Karışımı 1 (Weed Mix 1)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Test içeriğinde; Common Ragweed (Ambrosia elitor) (w1), Mugwort (Misk otu/ koyunotu/karadeniz pelini) (w6), English Plaintain (Dar ayaklı sinir otu) (w9), Lamb's Quarters (Ak kaz ayağı) (w10), Russian Thistle (Dikenli çöven/kalya otu) (w11) bulunmaktadır.							

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8600144	**Spesifik IgE- Yabani Ot/Çiçek Karışımı 3 (Weed mix 3)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Test içeriğinde; Mugwort (Misk otu/koyun otu/karadeniz pelini) (w6), English Plantain (Dar yapraklı sinir otu) (w9), Lamb's Quarters (Ak kaz ayağı) (w10), Goldenrod (Altın başak) (w12), Nettle (Isırgan) (w20) bulunmaktadır.							
C8600396	**Spesifik IgE- Yabani Ot/Çiçek Karışımı 5 (Weed mix 5)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Test içeriğinde; Common Ragweed (Ambrosia elitor) (w1), Mugwort (Misk otu/koyun otu/ karadeniz pelini) (w6), Ox-eye Daisy (Çayır papatyası) (w7), Dandelion (Kara hindiba/Kara kavuk) (w8), Goldenrod (Altın başak) (w12) bulunmaktadır.							
C8600135	**Spesifik IgE- Yengeç (Crab) (f23)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt:18:00
C8600346	**Spesifik IgE- Yer Fıstığı (Peanut) (f13)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8601398	**Spesifik IgE- Yeşil Zeytin (Green Olive) (f223)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600318	**Spesifik IgE- Yulaf Unu (Oat Flour) (f7)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600317	**Spesifik IgE- Yumurta Akı (Egg White) (f1)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600373	**Spesifik IgE- Yumurta Sarısı (Egg Yolk) (f75)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600173	**Spesifik IgE- Yün (Wool) (k20)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8600333	**Spesifik IgE- Zeytin Ağacı Poleni (Olive Pollen) (t9)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8600205	**Spesifik IgE-Ağaç Karışımı 4 (Ağaç Karışımı) (tx4)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Test içeriğinde; -Meşe ağacı (Oak)(t7) -Karaağaç (Elm)(t8) -Çınar ağacı (Sycamore)(t11) -Söğüt ağacı (Willow)(t12) -Kavak ağacı (Cottonwood)(t14)							
C8412008	**Spesifik IgE-Gıda Karışımı 15 (Meyve Karışımı) (fx15)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Test içeriğinde; -Muz (Banana)(f92) -Portakal (Orange)(f33) -Elma (Apple)(f49) -Şeftali (Peach)(f95)							
C8271002	**Steatokrit, Gaita**							
	Gaita	**Plastik Kap**	10	gr	2-8°C	MANUEL	Sal 08:00 Per 08:00	Çar 18:00 Cum 18:00
C8788001	**Streptococcus (grup A) Antijeni, Hızlı Test**							
	Boğaz Sürüntüsü	**Dacron/ Rayon Swab**	0		18-24°C	İMMUNOKROMATOGRAFİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Boğaz Sürüntüsü: Örnekler buzdolabına konulmamalı ve dondurulmamalıdır. Dacron veya rayon swablar kullanılmalıdır. Örnek alınan swab kuru steril tüp içine konarak gönderilmelidir.							
C8789902	**Streptococcus pneumoniae Antijeni**							
	BOS	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	2	mL	2-8°C	İMMUNOKROMATOGRAFİ	Pzt-Cum 08:00 Cmt 08:00	Sal-Cmt 18:00 Pzt 18:00
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	5	mL	2-8°C	İMMUNOKROMATOGRAFİ		
C8660910	**Streptococcus pneumoniae Antikoru, IgG ³**							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1	mL	<0°C	ELİSA	Çar 08:00	Per 18:00

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8458803	**Susuzluk (Su Kısıtlama) Testi**							
	Su Kısıtlama Testinde; Bazal (0.dk), 2.saat ve 4.saatte serum ve idrar örnekleri alınmaktadır.Serum örneklerinde Osmolalite ve Sodyum, idrar örneklerinden Osmolalite ve Dansite analizleri yapılmaktadır.4.saatte alınan Plazma (Edta) örneğinden Antidiüretik Hormon (ADH) analizi yapılmaktadır.ADH testi için Plazma (Edta) örneği dondurularak transfer edilmelidir.							
	İdrar	**Plastik Kap**	5	mL	2-8°C	İSE/FPD/RİA	Pzt-Cum	1 hafta sonra
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	<0°C	İSE/FPD/RİA		
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	İSE/FPD/RİA		
C8249100	**Süksinilaseton, Kapiller Kan** [1] [3]							
	Kapiller Kan	**Filtre Kağıdı**	0		18-24°C	LC-MS/MS	Sal 08:00	Per 18:00
	Kapiller Kan: Kapiller kan, 0-6 ay arasındaki bebeklerde topuk bölgesinden alınmalıdır. 1 yaşından büyük hastalarda ise el parmağından alınması tercih edilmektedir. 6 ay-1 yaş arasındaki çocuklarda örnek alınacak bölgeyi seçerken, hastanın ağırlığına göre karar verilmeli, ağırlığı 10 kg'dan az olan çocuklarda topuk bölgesi, fazla olanlarda el parmağı tercih edilmelidir. Kanın, kart üzerindeki işaretli bölgenin tamamı dolacak şekilde emdirilmesine dikkat edilmelidir. Topuktan alınacak örnekler için topuğun yan kısımları seçilmelidir. Örnek alındıktan sonra, kartlar yatay şekilde ve güneş ışığına maruz bırakılmadan oda sıcaklığında 2-3 saat kurutulmalıdır.							
C8249106	**Süksinilaseton/Kreatinin Oranı, İdrar (Spot)** [1] [3]							
	Spot İdrar, Dondurulmuş	**Plastik Kap**	5	mL	<0°C	GC-MS	Sal 08:00 Per 08:00 Cmt 08:00	Pzt 18:00 Çar 18:00 Cum 18:00
	Spot İdrar, Dondurulmuş: İdrar örneği hemen dondurulmalıdır.							
C8439202	**Sülfit, İdrar**							
	Bu test için alınan idrar örneği, taze idrar olmalı ve hemen laboratuvara ulaştırılmalıdır.							
	İdrar	**Plastik Kap**	5	mL	2-8°C	MANUEL	Pzt-Cum 12:00	Pzt-Cum 18:00
C8352005	**S-100B Protein, BOS** [3]							
	BOS, Dondurulmuş	**BOS Tüpü**	1	mL	<0°C	ECLİA	Sal 08:00	Çar 18:00
C8352004	**S-100B Protein, Serum** [3]							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1	mL	<0°C	ECLİA	Sal 08:00	Çar 18:00
	Serum, Dondurulmuş: EDTA plazma örnekleri kabul edilmez. İkterik, lipemik ve hemolizli örnekler de analiz için uygun değildir.							
C8437503	**Şeker Kromatografisi, Gaita**							
	Gaita, Dondurulmuş	**Plastik Kap**	0		<0°C	KROMATOGRAFİ	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Çar 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8437501	**Şeker Kromatografisi, İdrar (Spot)**							
	Spot İdrar, Dondurulmuş	**Plastik Kap**	5	mL	<0°C	KROMATOGRAFİ	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Çar 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00
C8818075	**T Hücre Klonalite Paneli, Kemik İliği**							
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır. Test içeriğinde; CD16, CD3 Hücrelerde CD4/CD8, CD3, CD45, CD56, TCRAB, TCRGD ve TRBC1 bulunmaktadır.							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	FLOW SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8818073	**T Hücre Klonalite Paneli, Tam Kan**							
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır. Test içeriğinde; CD16, CD3 Hücrelerde CD4/CD8, CD3, CD45, CD56, TCRAB, TCRGD ve TRBC1 bulunmaktadır.							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8818074	**T Hücre Klonalite Paneli, Vücut Sıvıları**							
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır. Test içeriğinde; CD16, CD3 Hücrelerde CD4/CD8, CD3, CD45, CD56, TCRAB, TCRGD ve TRBC1 bulunmaktadır.							
	Biyolojik Sıvı	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	FLOW SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8019701	**Takrolimus (Tacrolimus) (FK 506)**							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	CMİA	Pzt-Cum 12:00	Pzt-Cum 18:00
C8019702	**Takrolimus (Tacrolimus) (FK 506) (LC-MS/MS)**							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Pzt-Cum 12:00	Pzt-Cum 18:00
C8818039	**T-ALL MRD Paneli, Kemik İliği**							
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır.							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8818038	**T-ALL MRD Paneli, Tam Kan**							
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8818040	**T-ALL MRD Paneli, Vücut Sıvıları**							
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır.							
	Biyolojik Sıvı	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8818035	**T-ALL Tiplendirme, Tam Kan**							
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır. Test içeriğinde; CD1a, CD16, CD2, CD3, CD34, CD38, CD4 (T-Lenfosit), CD45, CD48, CD5, CD56, CD7, CD8 (T-Lenfosit), CD99 ve Sitoplazmik CD3 bulunmaktadır.							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8818036	**T-ALL Tiplendirme, Kemik İliği**							
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır. Test içeriğinde; CD1a, CD16, CD2, CD3, CD34, CD38, CD4 (T-Lenfosit), CD45, CD48, CD5, CD56, CD7, CD8 (T-Lenfosit), CD99 ve Sitoplazmik CD3 bulunmaktadır.							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8818037	**T-ALL Tiplendirme, Vücut Sıvıları**							
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır. Test içeriğinde; CD1a, CD16, CD2, CD3, CD34, CD38, CD4 (T-Lenfosit), CD45, CD48, CD5, CD56, CD7, CD8 (T-Lenfosit), CD99 ve Sitoplazmik CD3 bulunmaktadır.							
	Biyolojik Sıvı	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8463008	**Talyum, Tam Kan**							
	Tam Kan (Heparin)	**Sodyum Heparin-Lacivert Kapak**	5	mL	2-8°C	ICP-MS	Cum 08:00	10 gün sonra
C8502103	**Tam Kan Sayımı** [1] [3]							
	Kordon Kanı	**EDTA-Mor Kapak**	1	mL	18-24°C	Otomatize Kan Sayım Sistemi	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Tam Kan (EDTA)	**Microtainer Tüp**	2	mL	2-8°C	Otomatize Kan Sayım Sistemi		
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak (CBC)**	2	mL	2-8°C	Otomatize Kan Sayım Sistemi		
C8502109	**Tam Kan Sayımı (Pediatrik Panel)**							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak (CBC)**	2	mL	2-8°C	OTOMATİZE KAN SAYIM SİSTEMİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Tam Kan (EDTA)	**Microtainer Tüp**	2	mL	2-8°C	OTOMATİZE KAN SAYIM SİSTEMİ		
C8707512	**Tarama kontrol, hijyen (Ortam kültürleri)**							
	Kültür Plağı	**Kültür Plağı**	0			K/T	Pzt-Cmt 12:00	4 gün sonra 17:00
	Sürüntü	**Swap**	0			K/T		

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8707514	**Tarama kontrol, personel için**							
	Burun Salgısı	**Swap**	0			K/T	Pzt-Cmt 12:00	4 gün sonra 17:00
	Sürüntü	**Laboratuvara danışınız**	0			K/T		
C8235502	**Taş analizi, Safra Yolları**							
	Taş	**Plastik Kap**	0		18-24°C	FTİR	Sal 08:00 Cum 08:00	Cum 18:00 Sal 18:00
C8235505	**Taş analizi, Üriner Sistem (FTIR)**							
	Taş	**Plastik Kap**	1	gr	18-24°C	FTİR	Sal 08:00 Cum 08:00	Cum 18:00 Sal 18:00
	Taş: Taşın üriner sisteminden alındığı yer belirtilmelidir.Islak veya kanlı alınan taş örnekleri analizden 48-72 saat önce kurutulur.							
C8818076	**TCR Alfa Beta/Gama Delta Paneli (Periferik Kan)**							
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Örnek alındıktan sonra 12 saat içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır. Test içeriğinde; CD3, CD45, TCRAB ve TCRGD bulunmaktadır.							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra
C8019801	**Teofilin**							
	Serum	**Jelsiz Tüp**	0.5	mL	2-8°C	TÜRBİDİMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8440302	**Testosteron, Bioavailable**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	ECLİA	Pzt 08:00 Per 08:00	Pzt 18:00 Per 18:00
C8440201	**Testosteron, Serbest**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Hemolizli örneklerde çalışılmamalıdır.							
C8440301	**Testosteron, Total**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.2	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Heparin (Li-, Na-), EDTA-K3 ve sodyum sitratlı plazma da kullanılabilir.							
C8677401	**Tetanus Antikoru, IgG**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C9519917 **Tetrahidrofuran**								
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	5	mL	2-8°C	GC-FİD	Cum 08:00	10 gün sonra
C8460006 **Tetrakloroetilen, Kan**								
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	hsGC-MS	Cuma 08:00	1 hafta sonra
C8029965 **Thiopurine Metabolitleri**								
	EDTA' lı tam kan örneği primer tüpte gönderilmelidir (sekonder tüpe ayırmayınız, santrifüj etmeyiniz, dondurmayınız). 6-thioguanine nükleotidleri ve 6-merkaptopürin analitleri LC-MS/MS ile tayin edilmektedir. Sonuçlar her iki alt parametre için pmol/8 x 108 RBC olarak raporlanır. Hemolize örneklerin kullanılması, düşük RBC ölçümüne ve hesaplamada yanlış yüksek test sonuçlarına neden olacağı için uygun değildir. Bu yüzden transport koşullarına uyum önemlidir.							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Çar 08:00	Per 18:00
	Tam Kan (EDTA): Hemolizli ve pıhtılı örnekler kabul edilmez.							
C8378901 **Thiopurine S-Methyltransferase (TPMT)**								
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	4	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Sal 08:00	20 gün sonra
	Tam Kan (EDTA): Test için EDTA-Tam kan gerekmektedir. Hemolizli ve pıhtılı örnekler kabul edilmez.							
C8352031 **TH1/TH2 Sitokin Oranı**								
	Örnek alınmadan önce mutlaka laboratuvar ile temasa geçilmelidir. Hastadan kan örneğinin test çalışma gününden bir gün önce olan çarşamba günü alınması zorunludur. Yurtdışından örnek kabul edilmemektedir.							
	Tam Kan (Heparin)	**Heparin-Yeşil Kapak**	6	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Per 08:00	1 hafta sonra
C8925713 **Timik Emigrant T-Hücre Testi (CD4 RTEs)**								
	Test içeriğinde; CD3, CD31, CD4, CD4 RTEs, CD45RA, Lenfosit (%), Lenfosit sayısı ve Lökosit sayısı bulunmaktadır.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	3 gün sonra
C8680001 **Tiroglobulin Antikoru (anti-Tg)**								
	Serum	**Jelli Tüp**	0.2	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8443201 **Tiroglobulin (hTg)**								
	Serum	**Jelli Tüp**	0.2	mL	2-8°C	ECLİA	Pzt-Cum 12:00	Pzt-Cum 18:00
C8443202 **Tiroglobulin (hTg), Washout**								
	Biyolojik Sıvı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	1	mL	2-8°C	ECLİA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8637601 **Tiroid Peroksidaz Antikoru (anti-TPO)**								
	Serum	**Jelli Tüp**	0.2	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8625619	**Tiroid Stimulan İmmunglobulin (TSİ)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8444301	**Tiroid Stimülan Hormon (TSH)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.2	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8444201	**Tiroksin Bağlayıcı Globulin (TBG)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Çar 08:00	Per 18:00
C8443901	**Tiroksin, Serbest (FT4)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.2	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8443601	**Tiroksin (T4), Total**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.2	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8403003	**Tirozin**							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1	mL	<0°C	LC-MS/MS	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Çar 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00
C8443001	**Tiyosiyanat ²**							
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	10	mL	2-8°C	GC-MS	Sal 08:00	1 hafta sonra
C8352022	**TNF-Alfa ²**							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1	mL	<0°C	CLIA	Sal 08:00	1 hafta sonra
	Serum, Dondurulmuş: Örnek hemen dondurulmalıdır.							
C8020101	**Topiramat (Topiramate)**							
	Serum	**Jelsiz Tüp**	1	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Sal 08:00	1 hafta sonra
	Serum: Kan örneği separatör jel içermeyen tüplere alınmalıdır.							
C8009001	**TORCH Antikoru Paneli**							
	Serum	**Jelli Tüp**	3	mL	2-8°C	EİA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Panel içeriğinde; Cytomegalovirus IgG (CMV IgG), Cytomegalovirus IgM (CMV IgM), Herpes simplex virus (HSV) tip 2 IgG, Herpes simplex virus (HSV) tip 2 IgM, Rubella IgG, Rubella IgM, Toxoplasma IgG, Toxoplasma IgM testleri çalışılmaktadır.							

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8223901	**Total Safra Asitleri**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Örnek aç olarak alınmalıdır.							
C8223902	**Total Safra Asitleri, İdrar**							
	İdrar	**Plastik Kap**	5	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8223903	**Total Safra Asitleri, Tokluk**							
	Serum, Tokluk	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum, Tokluk: Test ile; cholic acid, chenodeoxycholic acid, deoxycholic acid, lithocholic acid ölçülmektedir.							
C8668206	**Toxocara canis Antikoru, IgG**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	ELİSA	Cum 08:00	Pzt 18:00
C8677901	**Toxoplasma Antikoru, IgA**							
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	ELİSA	Sal 08:00	Çar 18:00
C8677701	**Toxoplasma Antikoru, IgG**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	CMİA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8677801	**Toxoplasma Antikoru, IgM**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	CMİA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8779860	**Toxoplasma gondii DNA (PCR), Amniyotik Sıvı**							
	Amniyotik Sıvı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	2	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
	Amniyotik Sıvı: Örneklerin dondurulmaması gerekmektedir.							
C8780111	**Toxoplasma gondii DNA (PCR), Biyopsi Materyali**							
	Biyopsi Materyali	**Plastik Kap**	0		2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
C8780112	**Toxoplasma gondii DNA (PCR), BOS**							
	BOS	**BOS Tüpü**	2	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	Sal-Cmt 18:00

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8780148	**Toxoplasma gondii DNA (PCR), Göz Sıvısı**							
	Intraokuler Sıvı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	0		2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
C8780113	**Toxoplasma gondii DNA (PCR), İdrar**							
	İdrar	**Steril Tüp**	2	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
C8780114	**Toxoplasma gondii DNA (PCR), Kordon Kanı**							
	Kordon Kanı	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
C8780115	**Toxoplasma gondii DNA (PCR), Plazma**							
	Plazma (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
C8780116	**Toxoplasma gondii DNA (PCR), Serum**							
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
C8780117	**Toxoplasma gondii DNA (PCR), Tam Kan**							
	Tam Kan (EDTA) (PCR)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
C8677702	**Toxoplasma IgG Avidite**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	ELFA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00

Serum: Lityum heparin ve EDTA'lı plazma da kullanılabilir.
Belirgin hemolizli ve lipemik örnek analiz için kullanılmaz.
Avidite, antijen üzerinde yer alan çok sayıdaki epitop ile antikor moleküllerinin bağlanma bölgeleri arasındaki bağlanma gücüdür. IgG antikor avidite testleri, primer enfeksiyonun olası etiyolojisini ve süresini belirlemede ve primer enfesiyonun re-enfeksiyon, reaktivasyon ya da aşılama sonrası yanıttan ayırımında kullanılmaktadır. Çalışılan avidite testlerinde öncelikle Toxoplasma IgG düzeyi saptanmakta ve IgG pozitif olanlarda daha sonra Avidite ölçümleri için işlemlere devam edilmektedir. Dolayısı ile IgG Avidite tesri Toxoplasma IgG'si pozitif olanlarda çalışılmalı ve bu örnekler Avidite testi çalışılmak üzere gönderilmelidir.

C8728501	**TPHA (Treponema pallidum Hemaglutinasyon Antikoru)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.1	mL	2-8°C	İHA	Pzt-Cum 08:00 Cmt 08:00	Sal-Cmt 18:00 Pzt 18:00
C8446601	**Transferrin** [1] [3]							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	NEFELOMETRİ	Sal 08:00 Per 08:00	Çar 18:00 Cum 18:00
C8392122	**trans,trans-Muconic acid**							
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	10	mL	2-8°C	HPLC	Pzt-Cum 08:00	8 gün sonra

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8684920	**Travmatik Beyin Hasarı (TBI) Biyobelirteç Paneli, Plazma (BD-Tau, UCH-L1, GFAP, NF-Light)**							
	SR-X Ultra Hassas Biyobelirteç Tespit Sistemi kullanılarak dört parametre eş zamanlı olarak analiz edilir. Bu panel içerisinde; BD-Tau (Beyin kaynaklı Tau), UCH-L1 (Ubiquitin karboksi-terminal hidrolaz L1), GFAP (Glial Fibriler Asidik Protein), NF-Light (Nörofilament Hafif Zincir) bulunmaktadır.							
	Plazma, Dondurulmuş	**EDTA-Mor Kapak**	4	mL	-80 °C	SIMOA (Single Molecule Array)	Pzt 08:00 Per 08:00	1 hafta sonra
C8378919	**Treosulfan**							
	Plazma (Heparin)	**Heparin-Yeşil Kapak**	1	mL	<0°C	LC-MS/MS	Pzt-Cmt	4 saat sonra
	Plazma (Heparin): İlk 24 saat içerisinde çalışılamayacak olan örneklerin dondurulması önerilir. İlk kan örneği ,IV Treosulfan infüzyonunun bitişinden hemen sonra alınmalıdır. Diğer kan örnekleri de , infüzyon bitişinden 1 saat , 2 saat ve 4 saat sonra alınmalıdır. Busulfan test bilgileri için formun eksiksiz doldurulması gerekmektedir.							
C8678105	**Treponema pallidum Antikoru (FTA-Abs), IgG (IFT)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	İFT	Sal 08:00	Çar 18:00
C8678104	**Treponema pallidum Antikoru (FTA-Abs), IgM (IFT)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	İFT	Sal 08:00	Çar 18:00
C8779832	**Treponema pallidum DNA (PCR)**							
	Doku	**Plastik Kap**	1	gr	2-8°C	REAL TİME PCR	Çar 08:00	Pzt 18:00
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	<0°C	REAL TİME PCR		
	Servikal Süruntü	**Nucliswab**	0		2-8°C	REAL TİME PCR		
	Üretral Akıntı	**Nucliswab**	0		2-8°C	REAL TİME PCR		
C8779833	**Treponema pallidum DNA (PCR), Amniyotik Sıvı**							
	Amniyotik Sıvı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	2	mL	2-8°C	PCR	Sal 08:00 Çar 08:00 Per 08:00	1 hafta sonra 18:00
	Amniyotik Sıvı: Örneklerin dondurulmaması gerekmektedir.							
C8779930	**Treponema pallidum DNA (PCR), BOS**							
	BOS	**BOS Tüpü**	1	mL	2-8°C	REAL TİME PCR	Pzt-Cum 08:00	Sal-Cmt 18:00
C8043801	**TRH Stimülasyon Testi-1**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 14:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Bu test için önceden laboratuvardan randevu alınmalıdır.Hasta örnek vermeden önce en az 8 saat aç olmalıdır.Örnek alınmadan önce hasta 30 dakika istirahat ettirilmelidir. Bazal TSH için kan örneği alınır. Sentetik TRH 200 - 400 ug İV uygulanır. TRH uygulandıktan 30. ve 60. dakikalarda TSH için kan örnekleri alınır.							

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8043803	**TRH Stimülasyon Testi-2**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 14:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Bu test için önceden laboratuvardan randevu alınmalıdır. Erişkinler için 500 ug TRH, çocuklar için 7 ug/kg TRH İ.V.olarak verilir. İlaç verilmeden önce 1 kez, İlaç verildikten sonra 30., 60. ve 120. dk.'larda alınan kan örneklerinde TSH ve PRL testleri, 120. dk'da alınan örnekte ise T3 ve T4 testleri çalışılır.							
C8678402	**Trichinella spiralis Antikoru, IgG ²**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	İMMUNOBLOTTİNG	Sal 08:00	1 hafta sonra
C8447801	**Trigliserid**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Örnek en az 8 saat açlıkta alınmalıdır.							
C8925640	**Trigliserid, Biyolojik Sıvı**							
	Biyolojik Sıvı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	0.5	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8448101	**Triiodotironin, Serbest (FT3)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.2	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8448001	**Triiodotironin (T3), Total**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.2	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8392110	**Trikloroasetik Asit, İdrar (Spot)**							
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	5	mL	2-8°C	GC-MS	Pzt-Cum 08:00	8 gün sonra
C8392111	**Trikloroetilen (TCE)**							
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	5	mL	2-8°C	GC-MS	Pzt-Cum 08:00	8 gün sonra
C8352010	**Triptaz**							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1	mL	<0°C	CLIA	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Çar 18:00 Cum 18:00 Pzt 18:00
C8916003	**Triptik Aktivite, Gaita ²**							
	Gaita, Dondurulmuş	**Plastik Kap**	1	gr	<0°C	MİKROSKOPİ	Pzt-Cmt	4 gün sonra

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8567001	**Trombin Zamanı (TT), Plazma**							
	Örnek alındıktan sonra 4 saat içerisinde çalışması gerekmektedir. Bu mümkün değilse plazma örneği en az iki ayrı tüpe bölünerek dondurulmalı ve donmuş olarak transfer edilmelidir.							
	Plazma (Sitrat)	**Sitrat-Mavi Kapak**	0.5	mL	2-8°C	KOAGÜLOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8567002	**Trombin-Antitrombin Kompleks (TAT) ²**							
	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	**Sitrat-Mavi Kapak**	1	mL	<0°C	İMMUNOASSAY	Sal 08:00	1 ay sonra
C8925709	**Trombofili Paneli**							
	Panel içeriğinde; Antitrombin III, Antitrombin III Antijen, Protein C Aktivitesi, Protein C, Antijen, Aktive Protein-C Rezistansı (APC), Protein S Aktivitesi, Protein S Antijen, Total, Lupus Antikoagulanı (LA), Homosistein, D-Dimer, Fibrinojen, Anti-Beta-2 Glikoprotein 1 antikoru, IgG, Anti-Beta-2 Glikoprotein 1 antikoru, IgM, Anti Fosfolipid Antikoru,IgM, Anti-Fosfolipid Antikoru, IgG, Faktör VIII, Faktör XII, Anti-Kardiyolipin IgG Antikoru (ACA IgG) ve Anti-Kardiyolipin IgM Antikoru (ACA IgM) bulunmaktadır. Panel içinde tanımlanan tüm örnek türleri gereklidir.							
	Plazma (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	1	mL	2-8°C		Cuma 08:00	2 hafta sonra 18:00
	Plazma (Sitrat)	**Sitrat-Mavi Kapak**	3	mL	2-8°C			
	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	**Sitrat-Mavi Kapak**	6	mL	<0°C			
	Serum	**Jelli Tüp**	8	mL	2-8°C			
C8557602	**Trombosit Fonksiyon Testleri, LTA**							
	Tam Kan (Sitrat)	**Sitrat-Mavi Kapak**	6	mL	18-24°C	LTA	Pzt-Cum 16:00 Cmt 12:00	Sal-Cmt 18:00 Pzt 18:00
	Tam Kan (Sitrat): Testin çalışılması için 3 adet örnek gerekmektedir. Numune alma – Bu test için, "Antiplatelet İlaçlar ve Trombosit Fonksiyon Testi İçin Hasta Takip Formu" doldurulmalıdır. Bilgi formunda yer alan örnek alım saati ve kullanılan ilaçların belirtilmesi önemlidir. Testin çalışılması için taze örnek gerekmekte olup, örnek stabilitesi nedeniyle örneğin kurye saatine yakın alınması ve 3 saat içinde Merkez laboratuvara ulaşması gerekmektedir. Hafta içi 16:00, hafta sonu 12:00 a kadar örnek teslim edilmelidir. Trombosit agregasyon çalışmaları genellikle taze kan numuneleri üzerinde gerçekleştirilir ve ideal olarak turnike olmadan alınır. Gerekirse başlangıçta turnike kullanılabilir ve kan alma sırasında çıkarılabilir. İğne boyutu 21 gauge veya daha büyük olmalıdır. Hemolizli, pıhtılaşmış veya tam olarak doldurulmamış tüpler reddedilmelidir. Numunenin aşırı çalkalanmasından kaçınılmalıdır. Kafein, sarımsak ve zerdeçal gibi diyet bileşenleri, gıda takviyelerinde olduğu gibi yüksek dozlarda düzenli olarak alınırsa trombosit fonksiyonunu etkileyebilir. İlaçlar – Bazı ilaçlar trombosit fonksiyonuna interfere eder ve trombosit fonksiyon testinde hatalı anormal sonuçlara neden olur (antitrombosit ajanlar, nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar (NSAID'ler) ve seçici serotonin reseptör inhibitörleri (SSRI'lar). Mümkünse bu ilaçlar Trombosit fonksiyon testinden en az bir hafta önce kesilmelidir. Trombositopeni – Trombosit sayısı <100.000 mikroL olan bireylerde genellikle trombosit fonksiyon testlerinin (özellikle agregometri) çoğundan kaçınırız.							
C8500202	**Trombosit Fonksiyon Testleri, PFA**							
	Test Acıbadem Altunizade, Maslak ve Atakent hastanelerinde çalışılmaktadır. Testin çalışılması için taze örnek gerekmekte olup, örnek stabilitesi nedeniyle örneğin kurye saatine yakın alınması ve 4 saat içinde laboratuvara ulaşması gerekmektedir.							
	Tam Kan (Sitrat)	**Sitrat-Mavi Kapak**	2	mL	18-24°C	AGREGOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8818059	**Trombosit Yüzey Antijeni ve Anti Trombosit Antikoru (ATA)**							
	Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir (Tel: 0216 500 4717). Örnek alındıktan sonra 12 saat içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Bu test için hekim tarafından "Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu" doldurulmalıdır. Test içeriğinde; CD41, CD42a, CD42b, CD49b, CD61, IgG+ Lenfosit ve IgM+ Lenfosit bulunmaktadır.							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt-Cmt 08:00	4 gün sonra

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8779835	**Tropheryma whippelii DNA (PCR) ²**							
	Biyopsi Materyali	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	0		2-8°C	PCR	Sal 08:00	2 hafta sonra
	BOS	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	2	mL	2-8°C	PCR		
	Gaita	**Plastik Kap**	0		2-8°C	PCR		
	Tam Kan (EDTA) (PCR)	**EDTA-Mor Kapak**	5	mL	2-8°C	PCR		
	Biyopsi Materyali: Biyopsi materyali SF içerisinde gönderilmelidir.							
C8779999	**Tropikal Panel (PCR)**							
	Bu panel içerisinde; Chikungunya virüs, Dengue virüs, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale, Plasmodium vivax, Salmonella enterica, West Nile virüs ve Leptospira spp bulunmaktadır.							
	Plazma (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	MULTİPLEKS PCR	Pzt-Cum 08:00	Sal-Cmt 18:00
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	MULTİPLEKS PCR		
C8349806	**Troponin I-High Sensitive**							
	Plazma (Heparin)	**Heparin-Yeşil Kapak(Jelli)**	4	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt	2 saat sonra
	Serum	**Jelli Tüp**	4	mL	2-8°C	CLIA		
C8349810	**Troponin T-High Sensitive**							
	Plazma (Heparin)	**Heparin-Yeşil Kapak**	4	mL	2-8°C	ECLİA	Pzt-Cmt	2 saat sonra
	Serum	**Jelli Tüp**	4	mL	2-8°C	ECLİA		
C8925641	**TSH Reseptör Antikoru (TRAb)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	ECLİA	Pzt-Prş 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 18:00 Pzt 18:00
C8780122	**Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR), Açlık Mide Sıvısı**							
	Açlık Mide Sıvısı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	2	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
C8780123	**Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR), Balgam**							
	Balgam	**Plastik Kap**	2	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
C8780124	**Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR), Biyopsi Materyali**							
	Biyopsi Materyali	**Plastik Kap**	0		2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8780125	**Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR), BOS**							
	BOS	**BOS Tüpü**	2	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	Sal-Cmt 18:00
C8780126	**Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR), Bronkoalveoler Lavaj**							
	Bronkoalveoler Lavaj	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	5	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
C8780127	**Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR), Deri Materyali**							
	Deri Materyali	**Plastik Kap**	0		2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
C8780129	**Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR), Doku**							
	Doku	**Plastik Kap**	0		2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
C8780130	**Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR), Eklem Sıvısı**							
	Eklem Sıvısı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	1	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
C8780136	**Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR), İdrar**							
	Sabah 1. İdrar	**Plastik Kap**	50	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
C8684930	**Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR), Kemik İliği**							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	REAL TİME PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
C8780131	**Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR), Kist Sıvısı**							
	Kist Sıvısı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	2	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
C8780132	**Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR), Parafin Kesit**							
	Parafin Kesit	**Plastik Kap**	50	Mikron	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
C8780133	**Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR), Perikardial Sıvısı**							
	Perikardiyal Sıvı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	1	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
C8780134	**Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR), Periton Sıvısı**							
	Periton Sıvısı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	1	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8780135	**Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR), Plevra Sıvısı**							
	Plevra Sıvısı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	1	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
C8684931	**Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR), Püy**							
	Püy (cerahat)	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	2	mL	2-8°C	REAL TİME PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
C8780195	**Tüberküloz (Mycobacterium tuberculosis) DNA, (PCR), Transtrakeal Aspirat**							
	Transtrakeal Aspirat	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	2	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
C8708118	**Ureaplasma Kültürü**							
	Prostat sıvısı	**Dacron/ Rayon Swab**	0		2-8°C	K/T/D	Pzt-Cum 12:00	4 gün sonra 17:00
	Semen	**Plastik Kap**	0		2-8°C	K/T/D		
	Servikal Sürüntü	**Dacron/ Rayon Swab**	0		2-8°C	K/T/D		
	Steril İdrar	**Plastik Kap**	10	mL	2-8°C	K/T/D		
	Üretral Akıntı	**Dacron/ Rayon Swab**	0		2-8°C	K/T/D		
	Vaginal Akıntı	**Dacron/ Rayon Swab**	0		2-8°C	K/T/D		
	Üretral Akıntı: Üretra ağzı temizlenir, dacron ya da rayon swab ile örnek alınır. (Son idrar en az 3 saat önce yapılmış olmalıdır.) Servikal Sürüntü: Lokal antiseptik kullanılmadan ekzoservikisteki mukus silinerek uzaklaştırılır. Daha sonra swab ile endoserviksten örnek alınır. Semen: Örnek steril örnek kabına alınarak ağzı kapatılır.25 uL semen örneği transport besiyerine aktarılır. Steril İdrar: Sabah ilk idrar alınır. 500 uL idrar örneği transport besiyerine aktarılır.							
C8454005	**Üre Azotu, Biyolojik Sıvı**							
	Biyolojik Sıvı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	1	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8452001	**Üre Azotu (BUN)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8454006	**Üre, İdrar (Spot)**							
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	2	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8454007	**Üre, İdrar (24 saat)**							
	24 Saatlik İdrar	**24 Saatlik İdrar Kabı**	5	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8455001	**Ürik Asit**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8456003 **Ürik Asit, Biyolojik Sıvı**								
	Biyolojik Sıvı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	0.5	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Biyolojik Sıvı: Hücresel materyalleri uzaklaştırmak için santrifüj edilmelidir. Örnek viskoz olmamalı ve başka partikül madde içermemelidir.							
C8456002 **Ürik Asit, İdrar (24 saat)**								
	24 Saatlik İdrar	**24 Saatlik İdrar Kabı**	2	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8456004 **Ürik asit/Kreatinin Oranı, İdrar (Spot)**								
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	2	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8235506 **Üriner Sistem Taş Hastalığı Analiz Paneli, İdrar (24 saat)**								
	24 Saatlik İdrar	**24 Saatlik İdrar Kabı**	10	mL	2-8°C	FOTOMETRİ/ENZİMATİK/İSE	Cum 09:00	Sal 18:00
	24 Saatlik İdrar: Test İçeriğinde; Fosfor, İnorganik, İdrar (24 saat), Kalsiyum, İdrar (24 saat), Kreatinin, İdrar (24 saat), Magnezyum (Mg), İdrar (24 saat), Okzalat, İdrar (24 saat), Sitrat, İdrar (24 saat), Sodyum (Na), İdrar (24 saat), Ürik Asit, İdrar (24 saat), pH, İdrar bulunmaktadır. Ayrı zamanlarda toplanmış 2 adet 24 Saatlik idrar örneği gerekmektedir.İdrarlardan bir tanesi koruyucu olarak 10 mL 6 N HCL içermelidir. İdrar toplamadan 3 gün önce ve idrar toplanması sırasında vitamin C içeren ilaçlar kullanılmamalıdır.Vitamin C içeren gıdaların aşırı tüketilmesi okzalat atılımını etkilemektedir.							
C8235507 **Üriner Sistem Taş Hastalığı Analiz Paneli, Serum**								
	Serum ve Serum,Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	4	mL	2-8°C	FOTOMETRİ/İSE/CLİA	Pzt-Cmt 14:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum ve Serum,Dondurulmuş: Test içeriğinde; Bikarbonat, Fosfor,İnorganik, Kalsiyum, Klor (Cl), Kreatinin, Serum, Potasyum (K), Sodyum (Na), Üre, Üre Azotu (BUN), Ürik Asit, Parathormon (PTH), İntakt bulunmaktadır. Bikarbonat testi için; kan örneğinin jelli tüp içerisine alınması, en geç 2 saat içinde santrifüj edilmesi ve santrifüj işleminden sonra tüp kapağının açılmadan transfer edilmesi önerilir.							
C8457801 **Ürobilinojen, İdrar (Spot), Kalitatif**								
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	3	mL	2-8°C	MANUEL	Pzt-Cum	2 saat sonra
C8412002 **Üroporfirin ²**								
	24 Saatlik İdrar	**24 Saatlik İdrar Kabı**	0.3	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Sal 08:00	1 hafta sonra
C8707503 **Vajinal Kültür**								
	Vaginal Akıntı	**Jelli Swap**	0		2-8°C	K/T/D	Pzt-Cmt 12:00	4 gün sonra 17:00
	Vezikül Sıvısı	**Jelli Swap**	0		2-8°C	K/T/D		
C8029904 **Valproik Asit, Total**								
	Serum	**Jelsiz Tüp**	0.5	mL	2-8°C	PETİNİA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8412007 **Vanadyum (V)**								
	Plazma (Heparin)	**Sodyum Heparin-Lacivert Kapak**	2	mL	2-8°C	ICP-MS	Sal 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Per 18:00 Cum 18:00 Sal 18:00
C8458501 **Vanililmandelik Asit (VMA) (24 saat)**								
	24 Saatlik İdrar, (HCl ile)	**24 Saatlik İdrar Kabı**	5	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Pzt 08:00 Per 08:00	Sal 18:00 Cum 18:00
	24 Saatlik İdrar, (HCl ile): İdrar toplamadan 3 gün önce ve idrar toplama sırasında diyet uygulanmalıdır. Çikolata, vanilya, kahve, çay, muz, portakal, limon yenilmemeli, Aspirin ve hipertansiyon ilaçları zorunlu durumlar dışında kullanılmamalı ve hekime bilgi verilmelidir. İdrar koruyucusu olarak 10 mL, 6 N HCl kullanılmalıdır.							
C8458502 **Vanililmandelik Asit (VMA)/Kreatinin oranı, İdrar (Spot)**								
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	5	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Pzt 08:00 Per 08:00	Sal 18:00 Cum 18:00
C8020201 **Vankomisin (Vancomycin)**								
	Serum	**Jelsiz Tüp**	1	mL	2-8°C	PETİNİA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Kan örneği, separatör jel içermeyen tüplere alınmalıdır.							
C8780137 **Varicella Zoster Virus (VZV) DNA (PCR), Amniyotik Sıvı**								
	Amniyotik Sıvı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	5	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	Sal-Cmt 18:00
C8780138 **Varicella Zoster Virus (VZV) DNA (PCR), BOS**								
	BOS	**BOS Tüpü**	1	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	Sal-Cmt 18:00
C8780193 **Varicella Zoster Virus (VZV) DNA (PCR), Diğer Örnekler**								
	Diğer	**Laboratuvara danışınız**	0		2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
C8780139 **Varicella Zoster Virus (VZV) DNA (PCR), Göz Sıvısı**								
	Göz Sıvısı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	1	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
C8780140 **Varicella Zoster Virus (VZV) DNA (PCR), Tam Kan**								
	Tam Kan (EDTA) (PCR)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra
C8780141 **Varicella Zoster Virus (VZV) DNA (PCR), Vezikül Sıvısı**								
	Vezikül Sıvısı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	1	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8678703	**Varicella Zoster Virüs (VZV) Antikoru, IgA ²**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	EİA	Sal 08:00	1 hafta sonra
C8678701	**Varicella Zoster Virüs (VZV) Antikoru, IgG**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	CLIA	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Sal 18:00 Per 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8678702	**Varicella Zoster Virüs (VZV) Antikoru, IgM**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	CLIA	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Sal 18:00 Per 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Belirgin hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kullanılmaz.							
C8557618	**Varicella Zoster Virüs (VZV) DNA (PCR), İntraoküler Sıvı**							
	Intraokuler Sıvı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	1	mL	2-8°C	REAL TIME PCR	Pzt-Cum 08:00	1 hafta
	Intraokuler Sıvı: Varicella Zoster Virus tanısı ve ayırıcı tanısında kullanılır.							
C8678706	**Varicella Zoster Virüs (VZV) IgG Avidite**							
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	ELİSA	Sal 08:00	Çar 18:00
C8458601	**Vazoaktif İntestinal Polipeptid (VIP) ²**							
	Plazma (EDTA)	**Laboratuvara danışınız**	1	mL	<0°C	RİA	Sal 08:00	2 hafta sonra
	Plazma (EDTA): Hasta gece boyunca aç kalmalıdır.Laboratuvardan istenecek Trasylolle hazırlanmış tüp içine 4 ml EDTA tam kan eklenir. Sonrasında santrifüj edilip üzerinde kalan süpernatan bir başka tüpe aktarılır, dondurulur ve transfer edilir.							
C8659204	**VDRL, Titrimetrik**							
	BOS	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	2	mL	2-8°C	FLOKÜLASYON	Pzt-Cum 08:00 Cmt 08:00	Sal-Cmt 18:00 Pzt 18:00
	Serum	**Jelli Tüp**	0.2	mL	2-8°C	FLOKÜLASYON		
C8217503	**VEGF ²**							
	Numune alınır alınmaz buzlu suya koyunuz (mümkün olduğunca soğuk muhafaza ediniz). 1.500 x g'de 10 dakika santrifüjleyin plazmayı hücrelerinden ayırınız. 30 dakika içinde örneği dondurunuz.							
	Plazma (EDTA), Dondurulmuş	**EDTA-Mor Kapak**	1	mL	<0°C	ECLİA	Sal 08:00	2-6 hafta sonra

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8351902	**VGKC (Voltage Gated Potassium Channel) Antikoru [2]**							
	BOS	**BOS Tüpü**	1	mL	2-8°C	RADİOİMMUN	Sal 08:00	2 hafta sonra
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	RADİOİMMUN		
C8459001	**Vitamin A (Retinol) [1] [3]**							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	0.5	mL	<0°C	HPLC	Çar 08:00	Cum 18:00
	Serum, Dondurulmuş: Örnek aç olarak alınmalı ve ışıktan korunmalıdır.							
C8442501	**Vitamin B1 (Tiyamin)**							
	Tam Kan (EDTA), Dondurulmuş	**EDTA-Mor Kapak**	1	mL	<0°C	LC-MS/MS	Pzt 08:00	Sal 18:00
	Tam Kan (EDTA), Dondurulmuş: Örnek ışıktan korunmalıdır.							
C8260701	**Vitamin B12**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
	Serum: Örnek en az 8 saat açlıkta alınmalıdır.Örnek ışıktan korunmalıdır.							
C8425201	**Vitamin B2 (Riboflavin)**							
	Plazma (Heparin)	**Heparin-Yeşil Kapak**	2	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Cum 08:00	1 hafta sonra
	Plazma (Heparin): Örnek ışıktan korunmalıdır. Örnek en az 12 saat açlık sonrası alınmalıdır.							
C8459102	**Vitamin B3 (Niasin, Nikotinamid)**							
	Örnek ışıktan korunmalıdır.							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	2	mL	<0°C	LC-MS/MS	Çar 08:00	1 hafta sonra
C8459104	**Vitamin B5 (Pantotenik Asit) [2]**							
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Sal 08:00	2 hafta sonra
	Serum: Örnek ışıktan korunmalıdır.							
C8420701	**Vitamin B6 (Piridoksal Fosfat)**							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1	mL	<0°C	LC-MS/MS	Sal 08:00	Çar 18:00
	Serum, Dondurulmuş: Örnek en az 8 saat açlıkta alınmalıdır.Örnek ışıktan korunmalıdır.							
C8218001	**Vitamin C (Askorbik Asit)**							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1	mL	<0°C	FOTOMETRİ	Çar 08:00	Cum 18:00
	Serum, Dondurulmuş: Örnek aç olarak alınmalı ve ışıktan korunmalıdır.							

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8265201 **Vitamin D 1,25-Dihidroksi**								
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	CLIA	Sal 08:00 Per 08:00	Cum 18:00 Pzt 18:00
	Serum: Örnek en az 8 saat açlıkta alınmalıdır. Örnek alındıktan sonra serum santrifüjle 2 saat içerisinde ayrılmalıdır. Aşırı hemolizli örnekler kabul edilmez.							
C8230601 **Vitamin D, 25-Hidroksi**								
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Cmt 12:00	Pzt-Cmt 18:00
C8444601 **Vitamin E (Alfa-Tokoferol)**								
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1	mL	<0°C	HPLC	Çar 08:00	Cum 18:00
	Serum, Dondurulmuş: Örnek aç olarak alınmalı ve ışıktan korunmalıdır.							
C8459701 **Vitamin K1**								
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	2	mL	<0°C	LC-MS/MS	Pzt 08:00	10 gün sonra
	Serum, Dondurulmuş: Örnek aç olarak alınmalı ve ışıktan korunmalıdır.Aksi takdirde vitamin K1 konsantrasyonu artmaktadır.							
C8351905 **Voltaj Kapılı Kalsiyum Kanalı Otoantikorları (P/Q tipi VGCC) (RIA) ²**								
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	RİA	Sal 08:00	2 hafta sonra
C8676514 **Von Willebrand Faktörü (VwF) Profili**								
	Test içeriğinde; Faktör VIII, von Willebrand Faktör Aktivitesi (Ristosetin Kofaktör), Von Willebrand Faktör Antijeni, Trombosit Fonksiyon Testleri yer almaktadır.Test panelinde tanımlı tüm örnek türleri gereklidir.							
	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	**Sitrat-Mavi Kapak**	1.5	mL	<0°C		Çar 08:00	Pzt 18:00
	Tam Kan (Sitrat)	**Sitrat-Mavi Kapak**	6	mL	2-8°C			
	Tam Kan (Sitrat): Bu test için, "Antiplatelet İlaçlar ve Trombosit Fonksiyon Testi İçin Hasta Takip Formu" doldurulmalıdır. Bilgi formunda yer alan örnek alım saati ve kullanılan ilaçların belirtilmesi önemlidir. Testin çalışılması için taze örnek gerekmekte olup, örnek stabilitesi nedeniyle örneğin kurye saatine yakın alınması ve 3 saat içinde Merkez laboratuvara ulaşması gerekmektedir. Hafta içi 16:00, hafta sonu 12:00 a kadar örnek teslim edilmelidir. Testin çalışılması için 3 adet örnek gerekmektedir.							
C8524601 **Von Willebrand Faktör Aktivitesi**								
	Plazma örneği en az iki ayrı tüpe bölünerek dondurulmalıdır. Hemolizli, lipemik, ikterik ve fibrin içeren numuneler analiz için kullanılmaz.							
	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	**Sitrat-Mavi Kapak**	1	mL	<0°C	KOAGÜLOMETRİ	Sal 08:00 Per 08:00	1 hafta sonra
C8524503 **Von Willebrand Faktör Antijeni**								
	Plazma örneği en az iki ayrı tüpe bölünerek dondurulmalıdır. Hemolizli, lipemik, ikterik ve fibrin içeren numuneler analiz için kullanılmaz.							
	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	**Sitrat-Mavi Kapak**	1	mL	<0°C	KOAGÜLOMETRİ	Sal 08:00 Per 08:00	1 hafta sonra

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8524003	**Von Willebrand Faktör Multimer Analizi ²**							
	Plazma örneği en az iki ayrı tüpe bölünerek dondurulmalıdır.							
	Plazma (Sitrat), Dondurulmuş	**Sitrat-Mavi Kapak**	2	mL	<0°C	SDS JEL	Sal 08:00	5 hafta sonra
C8029962	**Vorikonazol (Voriconazole) ²**							
	Serum	**Jelsiz Tüp**	1	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Cum 08:00	Pzt 18:00
C8779913	**VRE (Vancomycin Resistant Enterococci A/B) DNA (PCR)**							
	Gaita	**Plastik Kap**	1	gr	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	2 gün sonra
C8663802	**Weil Felix Testi**							
	Bu panel içerisinde OX K, OX 19 ve OX 2 bulunmaktadır.							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.3	mL	2-8°C	AGLUTİNASYON	Pzt-Cum 08:00	Pzt-Cum 18:00
C8272501	**Yağ asitleri, Serbest (FFA) (NEFA) ²**							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	0.3	mL	<0°C	FOTOMETRİ	Sal 08:00	1 hafta sonra
	Serum, Dondurulmuş: Örnek aç olarak alınmalıdır.Serum, örnek alındıktan sonra 1 saat içerisinde soğuk ortamda ayrılmalıdır.							
C8271001	**Yağ, Kantitatif, Gaita**							
	Gaita	**Plastik Kap**	10	gr	2-8°C	MANUEL	Sal 08:00 Per 08:00	Çar 18:00 Cum 18:00
	Gaita: Örnek miktarı 5 g'dan az olmamalıdır. Hasta testten üç gün önce ve test sırasında 100-150 g yüksek yağlı gıda maddesi yemelidir. Doktor, belirli bir lipit içeriğine sahip bir diyet önerebilir. Laksatifler gibi kabızlık ilaçlarının kullanımı yasaktır. Hasta bizmut, baryum, magnezyum, hint yağı ve mineral yağ içeren ilaçları kullanmaktan kaçınmalıdır. Bebeklerde bez dermatiti ve pişik için kullanılan kremler kullanılmamalıdır.							
C8749156	**Yavaş Üreyen Tüberküloz Dışı Mycobacteri Antibiyotik Duyarlılığı**							
	Genç Bakteri Kökeni	**Kültür Plağı**	0		18-24°C	MİKRODİLÜSYON	Pzt-Cum 08:00	4 hafta sonra 18:00
C8690004	**Yenidoğan Kan Grubu + Direkt Coombs**							
	Yeni doğan kan grubu ile birlikte direkt coombs testi çalışılmaktadır. Yenidoğan eritrositlerinin zayıf antijenik yapısı nedeniyle kan grubu tam olarak değerlendirilemeyebilir. Değerlendirme yapılamadığında transfüzyon gerektiren olgular için önerilen kan grupları (plazma ve eritrosit süspansiyonları için) rapor edilmektedir. Değerlendirilemeyen örneklerin 6 ay sonra kontrolu önerilir.							
	Tam Kan (EDTA) (TM)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	Jel Santrifügasyon	Her gün	2 saat sonra
C8925693	**Yenidoğan Metabolik Tarama (Kapsamlı Panel)**							
	Bu paneldeki testlerin yenidoğan dönemi için istenmesi uygun olup kan örneği, 0-1 ay yaş aralığındaki bebeklerde topuk bölgesinden alınmalıdır. Kanın, kart üzerindeki işaretli yuvarlak bölgelerin tamamı dolacak şekilde sadece kartın ön yüzünden emdirilmesine dikkat edilmelidir. Örnek alındıktan sonra, kartlar yatay şekilde ve güneş ışığına maruz bırakılmadan oda sıcaklığında 2-3 saat kurutulmalıdır. Örnekler laboratuvara ıslak olarak gönderilmemelidir. Test içeriğinde; Neonatal TSH, Fenilketonüri Tarama Testi (PKU), Neonatal GALT Tarama Testi, Kistik Fibrozis Tarama Testi (IRT), Neonatal 17-OH-Progesteron Tarama Testi, Biyotinidaz, Tarama Testi yer almaktadır.							
	Kapiller Kan	**Filtre Kağıdı**	0		18-24°C		Pzt-Cum 08:00	1 hafta sonra

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8679303	**Yersinia Antikoru, IgA ²**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	EİA	Sal 08:00	1 hafta sonra
C8704601	**Yersinia Kültürü**							
	Gaita	**Plastik Kap**	0		2-8°C	K/T/D	Pzt-Cmt 12:00	7 gün sonra 17:00
	Gaita: Gaita örneği Cary Blair transport besiyerinde gönderilmelidir.							
C8636112	**ZAP-70 Paneli**							
	Acıbadem Labmed Flow Sitometri Testleri İstek Formu doldurulmalıdır. Örnek alınmadan önce laboratuvar ile iletişime geçilmelidir. Örnek taze olmalıdır. Örnek alındıktan sonra 24 saat içinde laboratuvara ulaşmış olmalıdır. Test içeriğinde; Anti-ZAP-70, CD19 (B-Lenfosit), CD3 (T-Lenfosit), CD38, CD45 ve CD5 (T-Lenfosit) bulunmaktadır.							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ	Pzt 08:00 Sal 08:00 Çar 08:00 Per 08:00 Cum 08:00 Cmt 08:00	Çar 18:00 Per 18:00 Cum 18:00 Pzt 18:00 Sal 18:00 Sal 18:00
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	18-24°C	AKIM SİTOMETRİ		
C8690007	**Zayıf D**							
	"RhD NEGATİF" kan grubuna sahip bireylerde test çalışılır.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	0			JEL SANTRİFÜGASYON	Her gün	2 saat sonra
	Tam Kan (EDTA) (TM)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	JEL SANTRİFÜGASYON		
C8780142	**Zika Virüs RNA (PCR), Biyolojik Sıvı**							
	Biyolojik Sıvı	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	2	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	3 gün sonra
C8780143	**Zika Virüs RNA (PCR), Doku**							
	Doku	**Plastik Kap**	0		2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	3 gün sonra
C8780144	**Zika Virüs RNA (PCR), İdrar**							
	İdrar	**Steril Tüp**	2	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	3 gün sonra
C8780145	**Zika Virüs RNA (PCR), Plazma**							
	Plazma (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	3 gün sonra

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8780146	**Zika Virüs RNA (PCR), Serum**							
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	3 gün sonra
C8780147	**Zika Virüs RNA (PCR), Sürüntü**							
	Sürüntü	**Nucliswab**	0		2-8°C	PCR	Pzt-Cum 08:00	3 gün sonra
	Sürüntü: Alınan sürüntü örnekleri nucli swap ile transfer edilmelidir.							
C8600455	**Zonulin, Gaita**							
	Gaita, Dondurulmuş	**Plastik Kap**	1	gr	<0°C	EIA	Pzt 08:00	Sal 18:00
C8600454	**Zonulin, Serum** [3]							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1	mL	<0°C	EIA	Çar 08:00	Per 18:00
	Serum, Dondurulmuş: Hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kabul edilmez.							
C8461406	**1. Trimester Prenatal Tarama Testi (İkili Test)**							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	1	mL	<0°C	CLIA	Pzt 08:00 Sal 08:00 Çar 08:00 Per 08:00 Cum 08:00	Çar 18:00 Per 18:00 Cum 18:00 Pzt 18:00 Sal 18:00
	Serum, Dondurulmuş: "Prenatal tarama testi bilgi formu" eksiksiz doldurulmalı ve hekim tarafından kaşeli/imzalı olarak örnekle beraber gönderilmelidir.Bu test için, 11-13 hafta 6 gün gebelik haftaları arasında risk hesaplaması yapılmaktadır.							
C8263401	**11-Deoksikortizol**							
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Per 08:00	Cum 18:00
C8789901	**(1,3)-Beta-D-Glukan (Fungal)**							
	(1-3)-ß-D-glukan mantar hücre duvarının karakteristik bir birleşenidir. İnvaziv enfeksiyonlar sırasında Aspergillus, Candida, Fusarium, Trichosporon, Saccharomyces, Acremonium ve Pneumocyctis jirovecii içeren birçok mantar tarafından (1-3)-ß-D-glukan kana salınmaktadır.							
	BOS	**BOS Tüpü**	1	mL	2-8°C	CLIA	Pzt-Per 08:00 Cum 08:00	Sal-Cum 13:00 Pzt 13:00
	Bronkoalveoler Lavaj	**Biyolojik Sıvı Tüpü**	1	mL	2-8°C	CLIA		
	Plazma (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	1	mL	2-8°C	CLIA		
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	CLIA		
	Serum: Hemolizli ve lipemik örnekler analiz için kabul edilmez.							

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8349801	**17-Alfa-Hidroksiprogesteron (Direkt)**							
	Serum	**Jelli Tüp**	1	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Pzt 08:00 Per 08:00	Sal 18:00 Cum 18:00
C8349101	**17-Hidroksikortikosteroidler ²**							
	24 Saatlik İdrar, (Asetik asit ile)	**24 Saatlik İdrar Kabı**	10	mL	2-8°C	FOTOMETRİ	Sal 08:00	2 hafta sonra
	24 Saatlik İdrar, (Asetik asit ile): İdrar koruyucusu olarak 25 ml %50 Glasiyal asetik asit kullanılmalıdır. Bu test yerine serum kortizol ve idrar serbest kortizol seviyeleri istenebilir.							
C8414301	**17-Hidroksipregnenolon ²**							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	2	mL	<0°C	RİA	Sal 08:00	2 hafta sonra
C8461407	**2. Trimester Prenatal Tarama Testi (Dörtlü Test)**							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	2	mL	<0°C	CLIA	Pzt 08:00 Çar 08:00 Cum 08:00	Çar 18:00 Cum 18:00 Pzt 18:00
	Serum, Dondurulmuş: Hemolizli örnekler kabul edilmez.Prenatal tarama testleri bilgi formu doldurulmalıdır.Bu formda kilo bilgisi, son adet tarihi, siyah ırk, daha önceki gebeliklerde yaşanan tıbbi sorunlar ve annede varsa insüline bağımlı diabet (Tip I diabet), BPD ölçümüne göre gebelik haftası bilgileri belirtilmelidir.Bu test için optimum değerlendirmeler 16-18. gebelik haftaları arasında olmakla birlikte 15-22. haftalar arasındaki tüm gebelerde risk değerlendirmesi yapılmaktadır.							
C8461405	**2. Trimester Prenatal Tarama Testi (ÜçlüTest)**							
	Serum, Dondurulmuş	**Jelli Tüp**	2	mL	<0°C	CLIA	Pzt 08:00 Sal 08:00 Çar 08:00 Per 08:00 Cum 08:00	Çar 18:00 Per 18:00 Cum 18:00 Pzt 18:00 Sal 18:00
	Serum, Dondurulmuş: "Prenatal tarama testi bilgi formu" eksiksiz doldurulmalı ve hekim tarafından kaşeli/imzalı olarak örnekle beraber gönderilmelidir.Bu test için optimum değerlendirmeler 16-18. gebelik haftaları arasında olmakla birlikte, 15-22. haftalar arasındaki tüm gebelerde risk değerlendirmesi yapılmaktadır.							
C8301838	**2-Butoksiasetik Asit**							
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	10	mL	2-8°C	GC-MS	Pzt 08:00	10 gün sonra
	Spot İdrar: Işık korumasına gerek yoktur.							
C8351907	**21-Hidroksilaz Antikoru ²**							
	Serum	**Jelli Tüp**	2	mL	2-8°C	RİP	Sal 08:00	2 hafta sonra
C8443002	**2,5-Hekzandion**							
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	10	mL	2-8°C	GC-MS	Pzt-Cum 08:00	8 gün sonra

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8391501 **5' Nükleotidaz**								
	Serum	**Jelli Tüp**	0.5	mL	2-8°C	ENZİMATİK	Cum 08:00	Cum 18:00
C8349701 **5-Hidroksiindolasetik Asit (5-HIAA) (24 saat)**								
	24 Saatlik İdrar, (HCl ile)	**24 Saatlik İdrar Kabı**	5	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Pzt 08:00 Per 08:00	Sal 18:00 Cum 18:00
	24 Saatlik İdrar, (HCl ile): İdrar toplamadan 3 gün önce ve idrar toplama sırasında diyet uygulanmalıdır. Avokado, muz,patlıcan, ananas, domates ve vanilya içeren besinler yenilmemeli, kahve gibi kafein içeren içecekler içilmemelidir. Aspirin ve tansiyon ilaçları çok gerekli görülmedikce alınmamalı, hekime danışılmalıdır. İdrar koruyucusu olarak 10 mL, 6 N HCl kullanılmalıdır.							
C8349702 **5-Hidroksiindolasetik Asit (5-HIAA)/Kreatinin Oranı, İdrar (Spot)**								
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	1	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Pzt 08:00 Per 08:00	Sal 18:00 Cum 18:00
C8260703 **5-Hydroxytryptophan ²**								
	Plazma (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	1	mL	2-8°C	LC-MS/MS	Sal 08:00	1 hafta sonra
	24 Saatlik İdrar, (Asetik asit ile)	**24 Saatlik İdrar Kabı**	5	mL	2-8°C	LC-MS/MS		
	24 Saatlik İdrar, (Asetik asit ile): 24 saatlik idrar 5-10 ml asetik asit üzerine alınarak toplanmalıdır. Plazma (EDTA): Test için EDTA-Plazma gerekmektedir.							
C8254101 **7-Dehidrokolesterol**								
	Plazma (Heparin), Dondurulmuş	**Heparin-Yeşil Kapak**	0.5	mL	<0°C	GC-MS	Pzt 08:00	2 hafta sonra
C8217507 **8-Hidroksi-2-Deoksiguanozin/Kreatinin Oranı, İdrar (Spot)**								
	Spot İdrar	**Plastik Kap**	2	mL	<0°C	LC-MS/MS	Cum 08:00	Pzt 18:00

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ

Genetik Tanı Testleri

C8392717 **ABCB1 Geni C3435T Analizi**

Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C		Pzt-Cmt	2 hafta
Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C			

C8392124 **Abort Materyali_Mikroarray + Kromozom Analizi + Maternal Kontaminasyon**

Laboratuvardan temin edilen transport medyum içerisinde kabul edilmektedir. Maternal kontaminasyonun dışlanması için anneden 3 mL EDTA'lı tüpte tam kan gereklidir. Gebelik kayıpları nedeniyle yapılan kromozom analizlerinde yaşanan iki sorun, toplanan hücrelerden kromozom eldesi amaçlı yapılan kültürün sıkça başarısız olması ve sonuç verilememesi; sonuç verilen olgularda yeterli çözünürlükte kromozom analizi yapılamaması, DNA eldesi ile yapılan array karyotipleme sayesinde bertaraf edilebilmektedir.

Abortus Materyali ve Tam Kan	**Transport Medyum ve EDTA(mor kapak)**	1	adet	18-24°C	YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SNP ARRAY	Pzt-Cmt	2 hafta sonra

C8392901 **Acıbadem Genetik Check-up**

Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C			6 hafta

C8392741 **Ağır Kombine İmmün Yetmezlik Paneli**

Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	6 hafta

C8392353 **Ailesel Fruktoz İntoleransı Aldolaz B (ALDOB) Delesyon/Duplikasyon Analizi**

Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	MLPA	Pzt-Cmt	4 hafta sonra

C8389909 **Ailesel Fruktoz İntoleransı Aldolaz B (ALDOB) Geni Dizi Analizi**

ALDO B genindeki mutasyonlar, otozomal resesif kalıtılan Ailesel Fruktoz İntoleransının gelişmesine neden olmaktadır

Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	4 hafta sonra

C8392133 **Ailesel Hiperkolesterolemi Gen Paneli**

Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	6-8 hafta sonra

C8389282 **Ailesel Transthyretin Amiloidozu TTR Geni Dizi Analizi**

TTR genindeki mutasyonlar otozomal dominant kalıtılan Herediter transtiretin ilişkili amiloidoz (OMIM# 105210) hastalığına sebep olmaktadır.

Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	4 hafta sonra

C8389600 **Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) MEFV Geni Dizi Analizi**

MEFV genindeki mutasyonlar, otozomal resesif kalıtılan Ailevi Akdeniz Ateşi hastalığına neden olmaktadır.

Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	4 hafta sonra

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8392870	**Akciğer Kanseri NGS Paneli (18 Gen) ²**							
	Doku	**.**	1	adet	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	21 gün
C8392641	**Akçaağaç Şurubu İdrar Hastalığı, Tip 1A, BCKDHA Geni Dizi Analizi**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	4 hafta
C8392142	**Akondroplazi hastalığı FGFR3 Geni Dizi Analizi**							
	Akondroplazi (OMIM# 100800), otozomal dominant dwarfism sebebi olup, iskelet displazileri içerisinde en sık rastlanan hastalıklardan biridir. FGFR3 genine (OMIM 134934) ait mutasyonlar hastalığa sebep olmaktadır. Özellikle sık rastlanan ve kodon 380 içerisinde görülen G1138A ve G1138C mutasyonları ile kodon 540 içerisinde görülen A1619C, A1619G, C1620A ve C1620G mutasyonları, ilk basamak test olarak olguların %99'dan fazlasının tanımlanmasına imkan sağlamaktadır. Mutasyon saptanamayan durumlarda FGFR3 geninin dizi analizi yöntemi ile tamamının incelenmesi (bkz. C8392142), nadir rastlanan mutasyon tipleri için farklı yöntemler kullanılması ve ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken diğer iskelet displazileri taranmalıdır.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	6	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	2 hafta sonra
C8392161	**Akondroplazi Hastalığı FGFR3 Geni Dizi Analizi, Prenatal**							
	Maternal kontaminasyonun dışlanması için anneden 3 mL, konfirmasyon çalışması için babadan 3 mL EDTA'lı tüpte tam kan gereklidir. Akondroplazi (OMIM# 100800), otozomal dominant dwarfism sebebi olup, iskelet displazileri içerisinde en sık rastlanan hastalıklardan biridir. FGFR3 genine (OMIM 134934) ait mutasyonlar hastalığa sebep olmaktadır.							
	Amniyon sıvısı ve Tam Kan	**Enjektör ve EDTA (Mor Kapak)**	5	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	3 hafta sonra
	CVS ve Tam Kan	**Transport Medyum ve EDTA(mor kapak)**	3	villus	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ		
	Kordosentez(Kordon Kanı)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ		
C8389616	**Akondroplazi Hastalığı FGFR3 Geni Sık Görülen Mutasyon Analizi**							
	FGFR3 geni hücrede yara iyileşmesi, ajiogenez ve mitogenez işlevlerine katılan bir büyüme faktörünü sentezlemektedir. FGFR3 genindeki mutasyonlar, otozomal dominant dwarfism sebebi olup, iskelet displazileri içerisinde en sık rastlanan Akondroplazi (OMIM# 100800) hastalığına neden olmaktadır. Özellikle sık rastlanan ve kodon 380 içerisinde görülen G1138A ve G1138C mutasyonları ile kodon 540 içerisinde görülen A1619C, A1619G, C1620A ve C1620G mutasyonları, ilk basamak test olarak olguların %99'dan fazlasının tanımlanmasına imkan sağlamaktadır. Mutasyon saptanamayan durumlarda FGFR3 geninin dizi analizi yöntemi ile tamamının incelenmesi (bkz. C8392142), nadir rastlanan mutasyon tipleri için farklı yöntemler kullanılması ve ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken diğer iskelet displazileri taranmalıdır.							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	2 hafta sonra
C8392159	**Akondroplazi Hastalığı FGFR3 Geni Sık Görülen Mutasyon Analizi, Prenatal**							
	Maternal kontaminasyonun dışlanması için anneden 3 mL, konfirmasyon çalışması için babadan 3 mL EDTA'lı tüpte tam kan gereklidir. Akondroplazi (OMIM# 100800), otozomal dominant dwarfism sebebi olup, iskelet displazileri içerisinde en sık rastlanan hastalıklardan biridir. FGFR3 genine (OMIM 134934) ait mutasyonlar hastalığa sebep olmaktadır. Özellikle sık rastlanan ve kodon 380 içerisinde görülen G1138A ve G1138C mutasyonları ile kodon 540 içerisinde görülen A1619C, A1619G, C1620A ve C1620G mutasyonları, ilk basamak test olarak olguların %99'dan fazlasının tanımlanmasına imkan sağlamaktadır. Mutasyon saptanamayan durumlarda FGFR3 geninin dizi analizi yöntemi ile tamamının incelenmesi (bkz. C8392142), nadir rastlanan mutasyon tipleri için farklı yöntemler kullanılması ve ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken diğer iskelet displazileri taranmalıdır.							
	Amniyon sıvısı ve Tam Kan	**Enjektör ve EDTA (Mor Kapak)**	5	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	2 hafta sonra
	CVS ve Tam Kan	**Transport Medyum ve EDTA(mor kapak)**	3	villus	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ		
C8392149	**Alfa Talasemi HBA1, HBA2 Geni Delesyon Duplikasyon Analizi**							
	Alfa globulin gen mutasyonları, alfa talasemi hastalığına neden olmaktadır.HBA1 ve HBA2 genlerindeki delesyon ve duplikasyon mutasyonlarının yanı sıra bu genlerdeki nokta mutasyon taranması tanı koyma değerini arttırmasını sağlamaktadır.							
	Amniyon sıvısı ve Tam Kan	**Enjektör ve EDTA (Mor Kapak)**	3	mL	18-24°C	MLPA	Pzt-Cmt	4 hafta sonra
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	MLPA		

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8389815	**Alfa Talasemi HBA1, HBA2 Geni Dizi Analizi**							
	Alfa globulin gen mutasyonları, alfa talasemi hastalığına neden olmaktadır.HBA1 ve HBA2 genlerindeki delesyon ve duplikasyon mutasyonlarının yanı sıra bu genlerdeki nokta mutasyon taranması tanı koyma değerini arttırmasını sağlamaktadır.							
	Amniyon sıvısı ve Tam Kan	**Enjektör ve EDTA (Mor Kapak)**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	3 hafta sonra
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ		
C8389902	**Alfa1-Antitripsin Genotiplemesi**							
	SERPINA1 geni aynı zamanda proteaz inhibitörü (PI) olarak bilinen alfa-1-antitripsin (AAT) proteinini kodlar. Bu gendeki mutasyonlar otozomal resesif kalıtılan Alfa 1 Antitripsin yetmezliğine neden olmaktadır. En sık rastlanan patojenik allel PI*Z (p.E342K) olup, homozigot formda en düşük enzim düzeyine sebep olan genotiptir. Bir başka patojenik genotip ise PI*S (p.E264V) ve PI*M genotipleridir.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	2 hafta sonra
C8392795	**ALL_IKZFplus Analizi**							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	NGS	Pzt-Cmt	20 gün sonra
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	NGS		
C8392129	**Alport Sendromu COL4A3, COL4A4, COL4A5 Genleri Dizi Analizi ²**							
	Alport sendromu (OMIM# 301050, 104200, 203780), bazal membran tip IV kollajen sentezinden sorumlu COL4A3, COL4A4 ve COL4A5 genlerindeki mutasyonlar sonucu ortaya çıkmaktadır. Mutasyon profiline göre hastalık, X'e bağlı (COL4A5) veya otozomal resesif (COL4A3, COL4A4) veya otozomal dominant (COL4A3) kalıtım paterni sergiler. Her üç genin kodlayan bölgesinin tamamı dizi analizi yöntemi ile taranmaktadır. Farklı kalıtım paternleri, COL4A3 mutasyonlarının genotip fenotip ilişkisinin çeşitliliği nedeniyle sonuçların klinik olarak da iyi analiz edilmesi, ailelerin tüm genetik tetkiklerde olduğu gibi, test öncesi ve test sonrası genetik danışmaya yönlendirilmesi gereklidir.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	6	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	4 hafta sonra
C8392628	**AML Moleküler Dar Panel**							
	Panel içeriğinde çalışılan parametreler: FLT3-ITD, p.D835, CEBPA, NPM1 Ekzon 12.							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	10 gün
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ		
C8392627	**AML Sitogenetik-FISH-Moleküler Panel**							
	Panel içeriğinde çalışılan parametreler: FISH: 5p15.31/5q31.1 EGR1, 7q22.1/7q31, t(8;21) AML1/ETO, 11q23 MLL, 16q22 (inv16), t(15;17) PML/RARA, inv3, 17p13 P53, t(6;9)(p22;q34) DEK/NUP214, t(7;12)(q36;p13) MNX1/ETV6, t(9;22). Kromozom analizi, FLT3 IDT, p.D835, CEBPA, NPM1 Ekzon 12. Genler: ABL1, CBLB, ETNK1, IL7R, MSH2, PMS2, SRP72, ZRSR2, ADA, CBLC, ETV6, JAK1, MSH6, PRAMEF2, SRSF2, ANKRD26, CDKN2A, EZH2, JAK2, MYC, PRF1, STAG2, ASXL1, CEBPA, FAM154B, JAK3, MYD88, PRPF40B, STAT3, ASXL2, CHEK2, FAM47A, KAT6A, NBN, PRPF8, STXBP2, ATM, CREBBP, FAM5C, KCNA4, NF1, PTEN, SUZ12, ATRX, CRLF2, FAS, KCNK13, NOTCH1, PTPN11, TAL1, BCL6, CSF1R, FBXW7, KDM6A, NPAT, RAD21, TERC, BCOR, CSF3R, FLRT2, KDR, NPM1, RB1, TERT, BCORL1, CTCF, FLT3, KIT, NRAS, RELN, TET2, BCR, CUX1, GATA1, KLHDC8B, NSD1, RUNX1, TNFRSF13B, BIRC3, DAXX, GATA2, KLHL6, NTRK3, SETBP1, TP53, BLM, DDX41, GJB3, KMT2A, OR13H1, SF1, TPMT, BRAF, DNM2, GNAS, OR8B12, SF3A1, TUBA3C, BRCA1, DNMT1, HNRNPK, KRAS, P2RY2, SF3B1, U2AF1, BRCA2,							
	Kemik İliği	**EDTA+Heparin**	6	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	4 hafta
	Tam Kan	**EDTA+Heparin**	6	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)		
C8392685	**AML-BFM2019 Geniş Panel**							
	Kemik İliği	**EDTA+Heparin**	3	mL	18-24°C	Interfaz FISH	Pzt-Cmt	21 gün
	Tam Kan	**EDTA+Heparin**	3	mL	18-24°C	Interfaz FISH		

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8392275	**Amniyon Sıvısı_Prenatal Mikroarray + Kromozom Analizi + Hızlı Anöploidi Analizi**							
	Maternal kontaminasyonun dışlanması için anneden 3 mL EDTA'lı tüpte tam kan gereklidir. Merkezimizde Affymetrix marka SNP array platformu kullanılarak yüksek çözünürlükte karyotipleme (kazanç için 2000kb, kayıp için 1000kb olmak üzere ve en az 25 marker ile saptanabilme koşuluyla) imkanı sunulmakta, bu sayede çok sayıda mikrodelesyon ve mikroduplikasyon sendromunun eş zamanlı taranması mümkün olmaktadır. Halihazırda invaziv girişim yapılmış olan tüm gebelerde kullanılabilmekle birlikte, ultrason bulgusu olan, aile öyküsü bulunan özel olgularda tercih sebebi olmalıdır. Tarama için anne ve babanın da kan vermesi istenir, bu sayede fetusta saptanan bulguların karşılaştırmalı analizi, patojenisite tayini açısından mümkün olmaktadır. Ek olarak uzun süreli kültür ve kromozom analizi halihazırda yapılmakta olup, ek isteme gerek yoktur.							
	Amniyon sıvısı ve Tam Kan	**Enjektör ve EDTA (Mor Kapak)**	20	mL	18-24°C	YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SNP ARRAY	Pzt-Cmt	2 hafta sonra
C8392100	**Amniyon Sıvısı_Prenatal Mikroarray TRIO, Anne-Baba-Çocuk + Kromozom Analizi + Hızlı Anöploidi Analizi**							
	Merkezimizde Affymetrix marka SNP array platformu kullanılarak yüksek çözünürlükte karyotipleme (kazanç için 2000kb, kayıp için 1000kb olmak üzere ve en az 25 marker ile saptanabilme koşuluyla) imkanı sunulmakta, bu sayede çok sayıda mikrodelesyon ve mikroduplikasyon sendromunun eş zamanlı taranması mümkün olmaktadır. Halihazırda invaziv girişim yapılmış olan tüm gebelerde kullanılabilmekle birlikte, ultrason bulgusu olan, aile öyküsü bulunan özel olgularda tercih sebebi olmalıdır. Tarama için anne ve babanın da kan vermesi istenir, bu sayede fetusta saptanan bulguların karşılaştırmalı analizi, patojenisite tayini açısından mümkün olmaktadır. Ek olarak uzun süreli kültür ve kromozom analizi halihazırda yapılmakta olup, ek isteme gerek yoktur.							
	Amniyon sıvısı ve Tam Kan	**Enjektör ve EDTA (Mor Kapak)**	20	mL	18-24°C	YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SNP ARRAY	Pzt-Cmt	2 hafta sonra
C8389842	**Anjiotensin-ACE ins/del (ID) Polimorfizm Analizi**							
	Anjiotensin dönüştürücü enzim (ACE), anjiotensin I'in anjiotensin II' ye dönüşümünü katalize eder. ACE genine ait insersiyon (I) ve delesyon (D) polimorfizmleri (rs1799752), MI, diabetin mikrovaskuler komplikasyonları, hemorajik ve iskemik stroke gibi durumlara yatkınlıkla ilişkilendirilmiştir.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	2 hafta sonra
C8389605	**Ankilozan Spondilit, HLA Analizi (HLA B*27)**							
	HLA B*27, ankilozan spondilit gibi spondiloartropatilerin yatkınlık analizinde kullanılmaktadır.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	REAL TIME PCR	Pzt-Cmt	2 hafta sonra
C8389837	**Apo B Geni Genotip Analizi**							
	Apo B genindeki varyasyonlar, LDL düzeylerine olan etkisi nedeniyle hiperkolesterolemi yatkınlığı, dolayısıyla kardiyovaskuler risk panellerinin bir parçası olarak kullanılmaktadır.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	REAL TIME PCR	Pzt-Cmt	10 gün sonra
C8389834	**Apo E Geni Genotip Analizi**							
	Apo E geninin bazı özgün izoformlarının tespiti, hiperlipoproteinemi yatkınlığı ve ateroskleroz riskinin belirlenmesinde etkilidir. Bununla birlikte Alzheimer yatkınlığında da özellikle APO E4 izoformunun varlığı önemli olabilmektedir.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	REAL TIME PCR	Pzt-Cmt	10 gün sonra
C8389906	**B hücre Klonalite Testi**							
	IGH (VH-JH FR1, FR2, FR3) ve IGK (VK-JK,VK-Kde ve intron Kde) bölgeleri için yeniden düzenlenmelerin belirlenmesi, klonal düzenlemenin saptanması, B hücresi malignitesi tespiti dışında, atipik lenfoproliferatif hastalıklarda klonalite tespiti, reaktif lezyon malignite ayrımı yapılması, olgun monoklonal lenfoproliferatif hastalıklarda baskın seri aranması tumor spesifik markır analizi (IGH, IGK) konusunda yardımcı olmaktadır.							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	PCR-FRAGMAN ANALİZİ	Pzt-Cmt	2 hafta sonra
	Parafin Kesit	**Steril Tüp**	1	adet	18-24°C	PCR-FRAGMAN ANALİZİ		

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8392742	**Bardet-Biedl Sendromu Paneli**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	6 hafta
C8392667	**BCL2 Geni Dizi Analizi**							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA dizi analizi	Pzt-Cmt	15 gün
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA dizi analizi		
C8392754	**Beckwith-Wiedemann, Russell-Silver Sendromu, 11p15 Metilasyon, Delesyon-Duplikasyon Analizi**							
	Amniyon sıvısı ve Tam Kan	**Enjektör ve EDTA (Mor Kapak)**	20		18-24°C	MLPA-MS	Pzt-Cmt	4 Hafta sonra
	CVS ve Tam Kan	**Transport Medyum ve EDTA(mor kapak)**	5	villus	18-24°C	MLPA-MS		
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	MLPA-MS		
C8389607	**Behçet Hastalığı Yatkınlığı, HLA Analizi-HLA B*51**							
	HLA B*51/52, Behçet Sendromuna (OMIM#109650) yatkınlık analizinde kullanılmaktadır.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	REAL TIME PCR	Pzt-Cmt	2 hafta sonra
C8392947	**Beşli Taşıyıcılık Paneli (SMA, HBB, DMD, FRAX, CFTR)**							
	Saç Teli	**Steril Tüp**	1	adet	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	5 hafta
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)		
	Yanak Epitel Sürüntüsü	**Steril Tüp**	1	adet	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)		
C8389848	**Beta Fibrinojen FGB Geni Polimorfizm Analizi**							
	ß-Fibrinojen c.-455 G>A polimorfizmi fibrinojen düzeyi ve hiperkoagulabilite yatkınlığı ile ilişkilendirilmektedir.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	15 gün sonra
C8392380	**Beta Talasemi HBB Geni Delesyon Duplikasyon Analizi**							
	Amniyon sıvısı ve Tam Kan	**Enjektör ve EDTA (Mor Kapak)**	3	mL	18-24°C	MLPA	Pzt-Cmt	4 hafta sonra
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	0			MLPA		

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8389820	**Beta Talasemi HBB Geni Dizi Analizi**							
	Ülkemizde de taşıyıcı sıklığının fazla olması nedeniyle populasyon taramalarına da hedef olmuş olan beta talasemi hastalığına sebep olan mutasyonların önemli bir kısmı HBB genindeki nokta mutasyonlar sonucu ortaya çıkmaktadır.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	3 hafta sonra
C8389888	**Beta Talasemi HBB Geni Dizi Analizi, Prenatal**							
	Maternal kontaminasyonun dışlanması için anneden 3 mL, konfirmasyon çalışması için babadan 3 mL EDTA'lı tüpte tam kan gereklidir.Ülkemizde de taşıyıcı sıklığının fazla olması nedeniyle populasyon taramalarına da hedef olmuş olan beta talasemi hastalığına sebep olan mutasyonların önemli bir kısmı HBB genindeki nokta mutasyonlar sonucu ortaya çıkmaktadır.HBB geninin dizi analizi yöntemiyle 5' ve 3' UTR bölgelerinin kısmen dahil edilmesi ile birlikte birçok Hb varyantına sebep olan genotip saptanabilmektedir.							
	Amniyon sıvısı ve Tam Kan	**Enjektör ve EDTA (Mor Kapak)**	5	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	3 hafta sonra
	CVS ve Tam Kan	**Transport Medyum ve EDTA(mor kapak)**	3	villüs	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ		
C8392398	**Biotinidaz Eksikliği, BTD Geni Dizi Analizi**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	4 hafta sonra
C8392946	**Biyolojik Yaş (TruAge) ²**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	6	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	6 hafta
C8392945	**Biyolojik Yaş (TruAge) ve TruHealth ²**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	6	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	6 hafta
C8390110	**B-Raf (BRAF) p.V600E Mutasyon Analizi**							
	BRAF geni, hücre bölünmesini kontrol eden serin/treonin kinaz aktivitesine sahip bir proteini kodlamaktadır.Melanomalarda %60-80, kolorektal kanserlerde (CRC) %15, papiller tiroid kanserlerinde %45 ve akciğer kanserlerinde %1-5 oranında somatik BRAF gen mutasyonları saptanmıştır.BRAF geninde en sık görülen mutasyon p.V600E dir.Somatik BRAF geni mutasyonlarına sahip metastatik kolorektal kanserli hastalarda monoklonal antikorlar olan cetuximab (Erbitux) ve panitumumab (Vectibix) tedavilerine karşı direnç gelişimi gözlenemektedir.							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	REAL TIME PCR	Pzt-Cmt	10 gün sonra
	Parafin Kesit	**Steril Tüp**	1	adet	18-24°C	REAL TIME PCR		
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	REAL TIME PCR		
C8392230	**BRCA1/BRCA2 Geni Delesyon Duplikasyon Analizi**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	MLPA	Pzt-Cmt	4 hafta sonra
C8392190	**BRCA1-BRCA2 Genleri Dizi Analizi**							
	Meme - over kanserine yatkınlıkla ilişkili BRCA1-2 genlerinin nokta mutasyon ve delesyon duplikasyonlar açısından taranmasını içerir. Test öncesi ve sonrası genetik danışmanlık gereklidir. Tüm moleküler genetik analizlerde saptanan varyantlar için geçerli olduğu gibi, hastalığa sebep olduğu kesin olarak kanıtlanmış varyantlar rapor edilir, analiz tarihinde benign olarak değerlendirilen varyantlar raporda yer almaz, arada kalan, önemi belirsiz (muhtemelen benign ve muhtemelen patojenikler dahil) varyantlar sonuç bölümünden ayrı olarak, "diğer bulgular" şeklinde hekimin dikkatine sunulur.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	6	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	4 hafta sonra

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8389900	**CADASIL Hastalığı NOTCH3 Geni Sık Görülen Mutasyon Analizi**							
	NOTCH3 genideki mutasyonlar, otozomal dominant olarak kalıtılan Cadasil hastalığı için yüksek duyarlılıkta bir birinci basamak moleküler tanı testi imkanı sağlamaktadır.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	3 hafta sonra
C8389988	**CEBPA Geni Dizi Analizi**							
	AML tanısı ile takibe alınan hastalarda CEBPA gen mutasyonları, klinik karar ve prognoz tayini açısından önem taşımaktadır.							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	10 gün sonra
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ		
C8389200	**Charcot Marie Tooth Tip 1A PMP22 Delesyon, Duplikasyon Analizi**							
	17p11.2 ve PMP22 gen lokusundaki CMT1A-REP bölgesi rekombinasyonlarının sebep olduğu duplikasyon, Charcot Marie Tooth Tip 1A sebebidir.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	PCR-FRAGMAN ANALİZİ	Pzt-Cmt	4 hafta sonra
C8389211	**Charcot Marie Tooth X e Bağlı Dominant Tip GJB1 Geni Dizi Analizi**							
	GJB1 genindeki mutasyonlar, X" e Bağlı Dominan tCharcot Marie Tooth hastalığının gelişmesine neden olmaktadır.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	4 hafta sonra
C8392735	**Charcot-Marie-Tooth Hastalığı Paneli**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	6 hafta
C8392274	**CVS_ Prenatal Mikroarray + Kromozom Analizi + Hızlı Anöploidi Analizi**							
	Maternal kontaminasyonun dışlanması için anneden 3 mL EDTA'lı tüpte tam kan gereklidir. Merkezimizde Affymetrix marka SNP array platformu kullanılarak yüksek çözünürlükte karyotipleme (kazanç için 2000kb, kayıp için 1000kb olmak üzere ve en az 25 marker ile saptanabilme koşuluyla) imkanı sunulmakta, bu sayede çok sayıda mikrodelesyon ve mikroduplikasyon sendromunun eş zamanlı taranması mümkün olmaktadır. Halihazırda invaziv girişim yapılmış olan tüm gebelerde kullanılabilmekle birlikte, ultrason bulgusu olan, aile öyküsü bulunan özel olgularda tercih sebebi olmalıdır. Tarama için anne ve babanın da kan vermesi istenir, bu sayede fetusta saptanan bulguların karşılaştırmalı analizi, patojenisite tayini açısından mümkün olmaktadır. Ek olarak uzun süreli kültür ve kromozom analizi halihazırda yapılmakta olup, ek isteme gerek yoktur.							
	CVS ve Tam Kan	**Transport Medyum ve EDTA(mor kapak)**	5	villus	18-24°C	YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SNP ARRAY	Pzt-Cmt	2 hafta sonra
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SNP ARRAY		
C8392163	**CVS_Prenatal Mikroarray TRIO, Anne-Baba-Çocuk + Kromozom Analizi + Hızlı Anöploidi Analizi**							
	Laboratuvardan temin edilen transport medyum içerisinde kabul edilmektedir.Maternal kontaminasyonun dışlanması için anne kanı ile birlikte gönderilmelidir.Merkezimizde Affymetrix marka SNP array platformu kullanılarak yüksek çözünürlükte karyotipleme (kazanç için 2000kb, kayıp için 1000kb olmak üzere ve en az 25 marker ile saptanabilme koşuluyla) imkanı sunulmakta, bu sayede çok sayıda mikrodelesyon ve mikroduplikasyon sendromunun eş zamanlı taranması mümkün olmaktadır.Halihazırda invaziv girişim yapılmış olan tüm gebelerde kullanılabilmekle birlikte, ultrason bulgusu olan, aile öyküsü bulunan özel olgularda tercih sebebi olmalıdır.Tarama için anne ve babanın da kan vermesi istenir, bu sayede fetusta saptanan bulguların karşılaştırmalı analizi, patojenisite tayini açısından mümkün olmaktadır.Ek olarak uzun süreli kültür ve kromozom analizi halihazırda yapılmakta olup, ek isteme gerek yoktur.							
	CVS ve Tam Kan	**Transport Medyum ve EDTA(mor kapak)**	5	villus	18-24°C	YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SNP ARRAY	Pzt-Cmt	2 hafta sonra
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SNP ARRAY		

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8392024	**Çölyak Hastalığı, HLA Analizi (DQ2, DQ8 ve DR4)**							
	Çölyak hastalığı (OMIM# 212750) yatkınlığı için kullanılmaktadır. Bir yatkınlık testi olduğundan tanı koydurucu veya tanı ekarte edici özelliği yoktur. Tüm genetik çalışmalar gibi genetik danışma eşliğinde planlanması ve sonuç verilmesi gereklidir.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	REAL TIME PCR	Pzt-Cmt	2 hafta sonra
C8392919	**Demir Metabolizması Bozuklukları; Hiperferritinemi Paneli**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	8 hafta
C8392890	**Derin Ekzom Sekanslama ²**							
	Doku	**.**	1	adet	18-24°C		Pzt-Cmt	6-8 hafta
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	6	mL	18-24°C			
C8392265	**Dihidropirimidin Dehidrogenaz Eksikliği, DPYD Geni Genotip Analizi**							
	DPYD geni IVS14+1G>A (*2A) varyasyonun analizi							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
C8392709	**Distoni Paneli**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	6 hafta
C8390802	**DNA izolasyonu; kan, kemik iliği, amnion sıvısı**							
	Abortus Materyali	**Steril Tüp**	1	adet	18-24°C	DNA İZOLASYONU	Pzt-Cmt	3 gün sonra
	Amniyotik Sıvı	**Enjektör**	5	mL	18-24°C	DNA İZOLASYONU		
	CVS	**Steril Tüp**	3	villus	18-24°C	DNA İZOLASYONU		
	Doku	**Steril Tüp**	1	cm	18-24°C	DNA İZOLASYONU		
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	18-24°C	DNA İZOLASYONU		
	Kordon Kanı	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	18-24°C	DNA İZOLASYONU		
	Parafin Kesit	**Steril Tüp**	1	adet	18-24°C	DNA İZOLASYONU		
	Saç Teli	**Steril Tüp**	1	adet	18-24°C	DNA İZOLASYONU		
	Sürüntü	**Swap**	1		18-24°C	DNA İZOLASYONU		
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA İZOLASYONU		
C8389207	**Duchenne Musküler Distrofi (DMD) Distrofin Geni Delesyon Duplikasyon Analizi**							
	DMD geni büyük bir kas proteini olan distrofin proteinini sentezler.DMD genindeki mutasyonların %60'nı i delesyon ve duplikasyonlar oluşturmaktadır.Bu gendeki mutasyonlar, Duchenne (OMIM# 310200) ve Becker (OMIM# 300376) müsküler distrofi hastalığından sorumludur.Delesyon ve Dublikasyon analizi ilk basamak moleküler tanı testi olarak tercih edilmektedir.Negatif sonuçlarda dizi analizi ile nokta mutasyon taramasına geçilmelidir.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	MLPA	Pzt-Cmt	4 hafta sonra

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8389285	**Duchenne Musküler Distrofi (DMD) Distrofin Geni Delesyon Duplikasyon Analizi, Prenatal**							
	Maternal kontaminasyonun dışlanması için anneden 3 mL EDTA'lı tüpte tam kan gereklidir.Distrofin genindeki %60 oranındaki delesyon ve duplikasyonlar,Duchenne (OMIM# 310200) ve Becker (OMIM# 300376) distrofi hastalığından sorumludur. Delesyon ve Dublikasyon analizi ilk basamak moleküler tanı testi olarak tercih edilmektedir. Negatif sonuçlarda dizi analizi ile nokta mutasyon taramasına geçilmelidir.							
	Amniyon sıvısı ve Tam Kan	**Enjektör ve EDTA (Mor Kapak)**	5	mL	18-24°C	MLPA	Pzt-Cmt	3 hafta sonra
	CVS ve Tam Kan	**Transport Medyum ve EDTA(mor kapak)**	3	villüs	18-24°C	MLPA		
C8392125	**Duchenne Musküler Distrofi (DMD) Distrofin Geni Dizi Analizi ²**							
	DMD geni büyük bir kas proteini olan distrofin protinini sentezler.DMD genindeki mutasyonların %60'nı i delesyon ve duplikasyonlar oluşturmaktadır.Bu gendeki mutasyonlar, Duchenne (OMIM# 310200) ve Becker (OMIM# 300376) müsküler distrofi hastalığından sorumludur.Delesyon ve Dublikasyon analizi ilk basamak moleküler tanı testi olarak tercih edilmektedir.Negatif sonuçlarda dizi analizi ile nokta mutasyon taramasına geçilmelidir.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	6	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	6 hafta sonra
C8392013	**E-CADHERIN CDH1 Geni Dizi Analizi**							
	CDH1 geni mutasyonlar, prognoz açısından kötü diffüz tip herediter mide kanserine yatkınlık taşımaktadır. CDH1 genindeki mutasyonların analizi kötü diffüz tip herediter mide kanserine yatkınlığın belirlenmesinde rol oynamaktadır.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	4 hafta sonra
C8390103	**EGFR Geni Sık Görülen Mutasyon Analizi ²**							
	Non-Small Cell Akciğer Kanseri (NSCLC) en sık gözlenen Akciğer kanserlerden birisidir. Tedaviye yanıt vermeyen NSCLC olgularının bir kısmında (%10-15), erlotinib (Tarceva) veya gefitinib (Iressa) kullanımının etkili olduğu bilinmektedir. Tümör dokusu EGFR gen mutasyonları ile ilaçlara yanıt verme arasında korelasyon bulunduğu saptanmıştır. Bu nedenle NSCLC olgularında tedavi hedeflerinden biri olarak taranmaktadır. Exon 18'de; G719A – 2156G>C, G719S – 2155G>A, G719C – 2155G>T, G719D – 2156G>A. Exon 20'de; T790M – 2369C>T, S768I – 2303G>T, 2307-2308 ins GCCAGCGTG, 2319-2320 ins CAC, 2310-2311 ins GGT. Exon 19 ve Exon 21 sık görülen toplam 52 mutasyona bakılmaktadır.							
	Biyopsi Materyali	**Steril Tüp**	1	adet	18-24°C	REAL TIME PCR	Pzt-Cmt	2 hafta sonra
	Parafin Kesit	**Steril Tüp**	2	adet	18-24°C	REAL TIME PCR		
C8392406	**Ekzom Sekanslama (WES, Single)**							
	Abortus Materyali ve Tam Kan	**Transport Medyum ve EDTA(mor kapak)**	3	ml	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	6 hafta sonra
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	6	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)		
C8392453	**Ekzom Sekanslama (WES, Single), Prenatal**							
	Abortus Materyali ve Tam Kan	**Transport Medyum ve EDTA(mor kapak)**	3	ml	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	6 hafta sonra
	Amniyon sıvısı ve Tam Kan	**Enjektör ve EDTA (Mor Kapak)**	20	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)		
	CVS ve Tam Kan	**Transport Medyum ve EDTA(mor kapak)**	5	villus	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)		
	DNA	**Steril Tüp**	1	ADET	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)		
	Kordon Kanı	**EDTA+Heparin**	6	ml	2-8°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)		
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)		

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8392673	**Ekzom Sekanslama (WES, Trio)**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	6	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	6 Hafta sonra
C8392444	**Ekzom Sekanslama Yeniden Değerlendirme (Tek Birey)**							
	Laboratuvara Danışınız	**Laboratuvara danışınız**	0			YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	3 hafta sonra
C8392637	**Ekzom Sekanslama Yeniden Değerlendirme (TRIO)**							
	Laboratuvara Danışınız	**Laboratuvara danışınız**	0		18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	4 hafta
C8392743	**Epidermolizis Büllosa Paneli**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	6 hafta
C8392739	**Epilepsi Paneli**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	6 hafta
C8392158	**ERG Geni Delesyon Analizi**							
	21. kromozomda gözlenen intrakromozomal amplifikasyon, özellikle çocukluk çağı B hücre serisi ALL hastalıklarının %2'sinde görülmesi ve relaps riski ve sağkalım süresi ile ilişkilendirilmesi nedeniyle önemlidir.ALL hastaları arasında amplifikasyonun hedefi değişkenlik göstermekle birlikte etkilenen ortak gen RUNX1 (AML1)'dir.RUNX1'e özgü FISH analizi sonucunda amplifikasyon gözlenen hastalarda konfirmasyon amaçlı MLPA yöntemi kullanılmaktadır.RUNX1 bu ve benzeri bulguların genom boyu analizi için ise moleküler (array) karyotipleme yöntemi (C8392094) tercih edilmelidir.							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	MLPA	Pzt-Cmt	20 gün sonra
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	MLPA		
C8392834	**Erkek İnfertilite Paneli (Kromozom Analizi ve Y-Mikrodelesyonu)**							
	Tam Kan	**EDTA+Heparin**	3	ml	18-24°C	DİĞER	Pzt-Cmt	3 hafta
C8392707	**Erkek İnfertilitesi Gen Paneli**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	6 hafta
C8392646	**Eşte Hedefe Yönelik Taşıyıcılık Taraması**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	6 hafta
C8392306	**Fabry Hastalığı, GLA Geni Dizi Analizi**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	4 hafta sonra

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8389827	**Faktör II (protrombin) Polimorfizm Analizi**							
	Faktör II (protrombin) geni p.G20210A polimorfizmi özellikle homozigot formu tromboz riskini ile ilişkilidir.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	REAL TIME PCR	Pzt-Cmt	10 gün sonra
C8391007	**Faktör V Cambridge Polimorfizm Analizi**							
	Faktör V Cambridge (p.R306T) polimorfizmi, aktive protein C rezistansına bağlı gelişen trombofili taramasında risk faktörü olarak kullanılmaktadır.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	REAL TIME PCR	Pzt-Cmt	10 gün sonra
C8389831	**Faktör V_Leiden Polimorfizmi**							
	Faktör V Leiden (c.G1691A = p.R506Q) polimorfizmi, özellikle venöz tromboemboli riskinde ana risk faktörlerinden biri olarak kabul edilmektedir.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	REAL TIME PCR	Pzt-Cmt	10 gün sonra
C8389993	**Faktör XIII Polimorfizm Analizi**							
	Faktör XIII p.V34L polimorfizmi, venöz tromboz ve kroner arter hastalığı riski ile ilişkilendirimektedir.							
	DNA	**Steril Tüp**	2	mL	18-24°C	REAL TIME PCR	Pzt-Cmt	10 gün sonra
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	REAL TIME PCR		
C8392745	**Fankoni Anemi Paneli**							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	3	ml	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	6 hafta
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)		
C8392368	**Farmakogenomik Paneli ²**							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C		Pzt-Cmt	4-6 hafta sonra
C8392356	**Fenilketonüri PAH Geni Delesyon/Duplikasyon Analizi**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	MLPA	Pzt-Cmt	4 hafta sonra
C8389703	**Fenilketonüri PAH Geni Dizi Analizi**							
	Fenilalanin hidroksilaz enzimini kodlayan PAH genindeki mutasyonlar, otozomal resesif kalıtılan fenilketonüri hastalığına sebep olmaktadır.							
	Amniyotik Sıvı	**Enjektör**	5	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	4 hafta sonra
	CVS ve Tam Kan	**Transport Medyum ve EDTA(mor kapak)**	3	villus	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ		
	Kordon Kanı	**Heparin-Yeşil Kapak**	2	mL		DNA DİZİ ANALİZİ		
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	6	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ		

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8392409	**Fetal Kan (Kord Kanı)_Prenatal Mikroarray + Kromozom Analizi + Hızlı Anöploidi Analizi**							
	Maternal kontaminasyonun dışlanması için anneden 3 mL EDTA'lı tüpte tam kan gereklidir. Merkezimizde Affymetrix marka SNP array platformu kullanılarak yüksek çözünürlükte karyotipleme (kazanç için 2000kb, kayıp için 1000kb olmak üzere ve en az 25 marker ile saptanabilme koşuluyla) imkanı sunulmakta, bu sayede çok sayıda mikrodelesyon ve mikroduplikasyon sendromunun eş zamanlı taranması mümkün olmaktadır. Halihazırda invaziv girişim yapılmış olan tüm gebelerde kullanılabilmekle birlikte, ultrason bulgusu olan, aile öyküsü bulunan özel olgularda tercih sebebi olmalıdır. Tarama için anne ve babanın da kan vermesi istenir, bu sayede fetusta saptanan bulguların karşılaştırmalı analizi, patojenisite tayini açısından mümkün olmaktadır. Ek olarak uzun süreli kültür ve kromozom analizi halihazırda yapılmakta olup, ek isteme gerek yoktur.							
	Kordon Kanı	**EDTA+Heparin**	3	mL	18-24°C	YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SNP ARRAY	Pzt-Cmt	2 hafta sonra
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SNP ARRAY		
C8389844	**Fetal Neonatal Alloimmün Trombositopeni (HPA-1a)**							
	ITGB3 geni p.L33P polimorfizmi, kardiyovaskuler risk hesaplanmasında kullanılan bir belirteçtir. MI yatkınlığında taranan genlerden biri olma özelliği taşımaktadır.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	10 gün sonra
C8392093	**FGFR2 Geni Dizi Analizi**							
	Fibroblast Growth Factor Receptor 2 (FGFR2) gen mutasyonları kraniyosinositoz sendromlarının en sık nedenidir. Bu gendeki mutasyonlar; Antley-Bixler sendromu, Apert sendromu, Beare-Stevenson cutis gyrata, Bent bone displazi , Craniofacial-skeletal-dermatologic displazi, Craniosynostosis, nonspecific, Crouzon Sendromu, Jackson-Weiss sendromu , LADD sendromu, Saethre-Chotzen sendromu ile ilişkilendirilmiştir.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	6	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	4 hafta sonra
C8392074	**FISH_ PTEN**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8392072	**FISH_ t(11;19)(MLL/MLLT1)**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8392232	**FISH t(4;11) MLL/AFF1**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8392689	**FISH_ t(5;11) NUP98/NSD1**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C		Pzt-Cmt	7 gün
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C			

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8392073	**FISH_ t(9;11) MLLT3/MLL**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8392070	**FISH_ 1p36/1q25**							
	Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8392071	**FISH_ 19q13/19p13**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8392014	**FISH_ 2p24.3 N-MYC**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Parafin Kesit	**Lam**	3	adet	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8392790	**FISH_ABL1 Yeniden Düzenlenmeleri**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH	Pzt-Cmt	7 gün
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH		
C8392791	**FISH_ABL2 Yeniden Düzenlenmeleri**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH	Pzt-Cmt	7 gün
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH		
C8392339	**FISH_Alagille Sendromu 20p12 Mikrodelesyonu**							
	Amniyotik Sıvı	**Enjektör**	20	mL	18-24°C	METAFAZ FISH	Pzt-Cmt	3 hafta sonra
	CVS	**Steril Tüp**	3	adet	18-24°C	METAFAZ FISH		
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	METAFAZ FISH		
C8392012	**FISH_ALK Yeniden Düzenlenmeleri**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	ml	18-24°C	PARAFİN DOKUDAN FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Parafin Kesit	**Lam**	2	Adet	18-24°C	PARAFİN DOKUDAN FISH		

Özel Acıbadem Labmed Genetik Hastalıklar Tanı ve Değerlendirme Merkezi, TÜRKAK tarafından AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına gör sabit kapsam ile akredite edilmiştir. Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: TS EN ISO 15189 standardına göre akredite test olduğunu, 2: Testlerin CAP Laboratuvar Akreditasyon Program Standartlarına göre akredite anlaşmalı laboratuvarda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8389920	**FISH_ALL Paneli**							
	Panel çerçevesinde 4q12, 8q24 cMYC, 9p21/CEP9 P16 (CDKN2A), t(9;22) BCR/ABL, 11q22.3 ATM, 11q23 MLL, t(12,21) TEL/AML1, 14q32 IGH, 17p13 P53, 19p13 E2A testleri bir arada çalışılmaktadır. Panel içerikleri NCCN (National Comprehensive Cancer Network) ve ELN (Eupean Leukemia Network) ile Klinisyenlerimizi ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmekte ve güncellenebilmektedir.						
	BOS	**BOS Tüpü**	3	ml		İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
	Parafin Kesit	**Lam**	1	adet	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8392796	**FISH_ALL Refrakter Hastalık Paneli**							
	CRLF2, PDGFRB, JAK2, ABL1, ABL2, CSF1R, IGH, ETV6, NTRK3, EPOR							
	Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH	Pzt-Cmt	7 gün
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH		
C8392621	**FISH_AML Paneli**							
	Panel içeriğinde çalışılan parametreler; 5p15.31/5q31.1 EGR1, 7q22.1/7q31, t(8;21) AML1/ETO, 11q23 MLL, 16q22 (inv16), t(15;17) PML/RARA, 17p13 P53, t(6;9)(p22;q34) DEK/NUP214, t(7;12)(q36;p13) MNX1/ETV6, t(9;22), inv3							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH	Pzt-Cmt	7 gün
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH		
C8389924	**FISH_AML/MDS Paneli**							
	Panel çerçevesinde 5p15.31/5q31.1 EGR1, 7q22.1/7q31, t(8;21) AML1/ETO, 11q23 MLL, 16q22 (inv16), t(15;17) PML/RARA, 17p13 P53, 20q12/20q13.12testleri bir arada çalışılmaktadır. Panel içerikleri NCCN (National Comprehensive Cancer Network) ve ELN (Eupean Leukemia Network) ile Klinisyenlerimizi ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmekte ve güncellenebilmektedir.							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8392797	**FISH_CCND1 Yeniden Düzenlenmeleri**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH	Pzt-Cmt	7 gün
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH		
C8392058	**FISH_CHARGE Sendromu 8q12.2 Mikrodelesyonu**							
	Amniyotik Sıvı	**Enjektör**	5	mL	18-24°C	METAFAZ FISH	Pzt-Cmt	2 hafta sonra
	CVS	**Steril Tüp**	3	villus	18-24°C	METAFAZ FISH		
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	METAFAZ FISH		

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8392798	**FISH_CKS1B/CDKN2C (P18) Amplifikasyon/Delesyon**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH	Pzt-Cmt	7 gün
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH		
C8390203	**FISH_Cri du chat 5p Mikrodelesyonu**							
	Amniyotik Sıvı	**Enjektör**	5	mL	18-24°C	METAFAZ FISH	Pzt-Cmt	3 hafta sonra
	CVS	**Steril Tüp**	3	villüs	18-24°C	METAFAZ FISH		
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	METAFAZ FISH		
C8392237	**FISH_CRLF2 Yeniden Düzenlenmeleri**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	2	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	2	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8389957	**FISH_Del 11q22.3 (ATM)**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8389921	**FISH_Del 13q14 (D13S25)**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8389969	**FISH_Del 13q14 (RB1)**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8389975	**FISH_Del 13q14.3 (D13S319, DLEU1)**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8389959	**FISH_Del 13q34**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8389923	**FISH_Del 20q12**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8389964	**FISH_Del 5q31 (EGR1)**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8389963	**FISH_Del 5q33-q34 (CSF1R)**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8389962	**FISH_Del 7q22/del 7q35**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8389925	**FISH_del 9p21 (p16/CDKN2A)**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8389952	**FISH_Del/amp 17p13.1 (p53)**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8389970	**FISH_Del/t(11q23) MLL**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8392753	**FISH_DiGeorge Mikrodelesyon Sendromu Geniş Panel (10p14 + HIRA+ TBX1 + N25) [1]**							
	Amniyon sıvısı ve Tam Kan	**Enjektör ve EDTA (Mor Kapak)**	3	ml	18-24°C	FISH	Pzt-Cmt	15 gün
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH		

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8392750	**FISH_DiGeorge 22q11.2 (HIRA, TUPLE1) Mikrodelesyon Sendromu ¹**							
	Amniyon sıvısı ve Tam Kan	**Enjektör ve EDTA (Mor Kapak)**	20	ml	18-24°C	FISH	Pzt-Cmt	3 hafta
	Diğer	**.**	0		18-24°C	FISH		
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH		
C8392751	**FISH_DiGeorge 22q11.2 (N25) Mikrodelesyon Sendromu ¹**							
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH	Pzt-Cmt	3 hafta
C8392752	**FISH_DiGeorge 22q11.2 (TBX1) Mikrodelesyon Sendromu ¹**							
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH	Pzt-Cmt	3 hafta
C8392935	**FISH_EBF1 Yeniden Düzenlenmeleri**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	ml	18-24°C			
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	ml	18-24°C			
C8392688	**FISH_ETV6 Yeniden Düzenlenmeleri**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C		Pzt-Cmt	7 gün
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C			
C8392080	**FISH_E2A (TCF3)**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8392817	**FISH_FGFR1 Yeniden Düzenlenmeleri**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH	Pzt-Cmt	7 gün
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH		
C8392499	**FISH_FIP1L1/CHIC2/PDGFRA Delesyon, Yeniden Düzenlenme**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH		

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8392931	**FISH_FLT3 Yeniden Düzenlenmeleri**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH	Pzt-Cmt	1 hafta
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH		
C8392723	**FISH_FUS/ERG t(16;21)(p11;q22)**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	Interfaz FISH	Pzt-Cmt	7 gün
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	Interfaz FISH		
C8392924	**FISH_Geniş ALL Paneli**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH	Pzt-Cmt	1 hafta
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH		
C8392690	**FISH_GLIS2/CBFA2T3 inv(16)**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C		Pzt-Cmt	7 gün
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C			
C8392800	**FISH_Hipereozinofilik Sendrom Paneli**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH	Pzt-Cmt	7 gün
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH		
C8389927	**FISH_IGH (14q32)**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8392932	**FISH_IGH/CCND3**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH	Pzt-Cmt	1 hafta
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH		
C8392238	**FISH_IKZF1 (7p12.2)**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	2	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	2	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8392411	**FISH_IKZF3**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	Interfaz FISH	Pzt-Cmt	2 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	Interfaz FISH		
C8392782	**FISH_iAMP21 Amplifikasyonu**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH	Pzt-Cmt	7 gün
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH		
C8389960	**FISH_inv(16)(p13q22)**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8392789	**FISH_JAK2 Yeniden Düzenlenmeleri**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH	Pzt-Cmt	7 gün
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH		
C8390208	**FISH_Kallmann Xp22 Mikrodelesyonu**							
	Amniyotik Sıvı	**Enjektör**	5	mL	18-24°C	METAFAZ FISH	Pzt-Cmt	3 hafta sonra
	CVS	**Steril Tüp**	3	villus	18-24°C	METAFAZ FISH		
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	METAFAZ FISH		
C8389862	**FISH_Kimerizm, FISH ile X/Y Analizi [1]**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8389922	**FISH_KLL paneli**							
	Panel çerçevesinde MYB / D6Z1, t(11;18) IGH/BCL2, t(11;14) IGH/CCND1, del 13 (RB1)/D13S25 (13q14), del D134S319/13q34/Trizomi 12, 14q32 IGH, ATM/P53 testleri bir arada çalışılmaktadır. Panel içerikleri NCCN (National Comprehensive Cancer Network) ve ELN (Eupean Leukemia Network) ile Klinisyenlerimizi ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmekte ve güncellenebilmektedir.							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Parafin Kesit	**Lam**	2	adet	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8392859	**FISH_KMT2A-MLLT4 t(6;11)**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	ml	18-24°C	FISH	Pzt-Cmt	7 gün
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH		
C8392622	**FISH_MDS Paneli**							
	Panel içeriğinde çalışılan parametreler: 5p15.31/5q31.1 EGR1, 7q22.1/7q31, 17p13 P53, 20q12/20q13.12, Trizomi 8							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH	Pzt-Cmt	7 gün
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH		
C8390205	**FISH_Miller-Dieker 17p13 Mikrodelesyonu**							
	Amniyotik Sıvı	**Enjektör**	5	mL	18-24°C	METAFAZ FISH	Pzt-Cmt	3 hafta sonra
	CVS	**Steril Tüp**	3	villus	18-24°C	METAFAZ FISH		
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL		METAFAZ FISH		
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	METAFAZ FISH		
C8392925	**FISH_MM_Trizomi Paneli**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH	Pzt-Cmt	1 hafta
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH		
C8392164	**FISH_Monozomi, Trizomi X**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8392410	**FISH_Monozomi 1p36**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	Interfaz FISH	Pzt-Cmt	2 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	Interfaz FISH		
C8392719	**FISH_Monozomi 3**							
	Biyopsi Materyali	**Steril Tüp**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
	Parafin Kesit	**Lam**	2	adet	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8392059	**FISH_Monozomi 5**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8392152	**FISH_Monozomi/Trizomi 10**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8392151	**FISH_Monozomi/Trizomi 4**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8392062	**FISH_Monozomi/Trizomi 7**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Sürüntü	**Steril Tüp**	3	ml	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8392629	**FISH_MPN Paneli**							
	Panel içeriğinde çalışılan parametreler; FISH ile; FIP1L1/CHIC2/PDGFRA, t(9;22) BCR/ABL, del 7q22/del 7q35, del 13q34, FISH_+8 (trizomi 8), del/amp 17p13.1 (p53), del 20q12, Trizomi 21.							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH	Pzt-Cmt	7 gün
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH		
C8389980	**FISH_Multiple Myeloma paneli**							
	Panel çerçevesinde t(4;14) IGH/FGFR3, t(11;14) IGH/CCND1, del 13 (RB1)/D13S25 (13q14), del D134S319/13q34/Trizomi 12, t(14;16) IGH/MAF, 14q32 IGH, 17p13.1 p53 testleri bir arada çalışılmaktadır. Panel içerikleri NCCN (National Comprehensive Cancer Network) ve ELN (Eupean Leukemia Network) ile Klinisyenlerimizi ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmekte ve güncellenebilmektedir.							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Parafin Kesit	**Lam**	1	adet	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8392720	**FISH_MYB (6q23.3), D6Z1**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8389926	**FISH_NHL (Non Hodgkin Lymphoma) paneli**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8392644	**FISH_Nöroblastom Paneli (1p, 11q, 17q ve N-MYC)**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH	Pzt-Cmt	10 gün
	Parafin Kesit	**Lam**	8	adet	18-24°C	FISH		
C8392691	**FISH_NTRK1 Yeniden Düzenlenmeleri**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C		Pzt-Cmt	10 gün
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C			
C8392692	**FISH_NTRK2 Yeniden Düzenlenmeleri**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C		Pzt-Cmt	10 gün
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C			
C8392693	**FISH_NTRK3 Yeniden Düzenlenmeleri**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C		Pzt-Cmt	10 gün
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C			
C8392290	**FISH_PAX5 Yeniden Düzenlenmeleri**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	2	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	2	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8392043	**FISH_PDGFRB**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8392930	**FISH_Ph-Like ALL Paneli**							
	BOS	**Steril Tüp**	3	ml	18-24°C	FISH	Pzt-Cmt	1 hafta
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	ml	18-24°C	FISH		
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	ml	18-24°C	FISH		

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8392060	**FISH_Prader-Willi/Angelman (SNRPN)**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	METAFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	METAFAZ FISH		
C8392663	**FISH_RET_10q11_Yeniden Düzenlenmeleri**							
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH	Pzt-Cmt	10 gün sonra
C8399905	**FISH_ROS1**							
	Parafin Kesit	**Lam**	2	adet	18-24°C	PARAFİN DOKUDAN FISH	Pzt-Cmt	2 hafta sonra
C8392064	**FISH_Rubinstein–Taybi 16p13 Mikrodelesyonu**							
	Amniyotik sıvısı	**Enjektör**	5	mL	18-24°C	METAFAZ FISH	Pzt-Cmt	3 hafta sonra
	CVS	**Steril Tüp**	3	villus	18-24°C	METAFAZ FISH		
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	METAFAZ FISH		
C8392296	**FISH_Seathre-Chotzen Sendromu 7p21 Mikrodelesyonu**							
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	2	mL	18-24°C	METAFAZ FISH	Pzt-Cmt	3 hafta sonra
C8392363	**FISH_Sentromerik Y Kromozom İncelemesi**							
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	Interfaz FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
C8392065	**FISH_SHOX Mikrodelesyonu**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8390206	**FISH_Smith-Magenis 17p11 Mikrodelesyonu**							
	Amniyotik Sıvı	**Enjektör**	5	mL	18-24°C	METAFAZ FISH	Pzt-Cmt	3 hafta sonra
	CVS	**Steril Tüp**	3	mL	18-24°C	METAFAZ FISH		
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	METAFAZ FISH		
C8392061	**FISH_SOTOS Sendromu (5q35.3)**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	METAFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	METAFAZ FISH		

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8392076	**FISH_SRY Analizi**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8392091	**FISH_Subtelomerik Prob İki Kromozom**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	METAFAZ FISH	Pzt-Cmt	2 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	METAFAZ FISH		
C8392090	**FISH_Subtelomerik Prob Tek Kromozom**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	METAFAZ FISH	Pzt-Cmt	2 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	METAFAZ FISH		
C8391011	**FISH_Subtelomerik Tarama (Tüm Kromozomlar)**							
	Panel Çerçevesinde tüm kromozomların subtelomerik bölgeleri analiz edilmektedir.							
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	METAFAZ FISH	Pzt-Cmt	2 hafta sonra
C8392934	**FISH_TCRA-D Yeniden Düzenlenmeleri**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH	Pzt-Cmt	1 hafta
C8392718	**FISH_Trizomi 10**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8392081	**FISH_Trizomi 21**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	METAFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	METAFAZ FISH		
C8392801	**FISH_Trizomi 9**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH	Pzt-Cmt	7 gün
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH		

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8389913	**FISH_t(11;14) IgH/CCND1**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8392063	**FISH_t(1;19)(q23;p13) TCF3/PBX1**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8391012	**FISH_t(12;21)(p13;q22) TEL/AML1**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8389916	**FISH_t(14;16) IGH/MAF**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8389910	**FISH_t(14;18) IgH/BCL2**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Parafin Kesit	**Lam**	1	adet	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8389966	**FISH_t(15;17) PML/RARA**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8389917	**FISH_t(17q21;?)/i(17q) RARA**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8392279	**FISH_t(17;19) HLF/TCF3**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	2	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	2	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8389981	**FISH_t(4;14) IGH/FGFR3**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8392617	**FISH_t(6;9) DEK/NUP214**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH	Pzt-Cmt	7 gün
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH		
C8392654	**FISH_t(7;12)(q36;p13) MNX1/ETV6**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH	Pzt-Cmt	7 gün
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH		
C8389911	**FISH_t(8;14) IGH/MYC**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8389967	**FISH_t(8;21) AML1/ETO**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8389965	**FISH_t(9;22) BCR/ABL ¹**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8390204	**FISH_Williams 7q11.23 Mikrodelesyonu**							
	Amniyotik Sıvı	**Enjektör**	5	mL	18-24°C	METAFAZ FISH	Pzt-Cmt	3 hafta sonra
	CVS	**Steril Tüp**	3	villus	18-24°C	METAFAZ FISH		
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	METAFAZ FISH		
C8390207	**FISH_Wolf-Hirschhorn 4p16.3 Mikrodelesyonu**							
	Amniyotik Sıvı	**Enjektör**	5	mL	18-24°C	METAFAZ FISH	Pzt-Cmt	3 hafta sonra
	CVS	**Steril Tüp**	3	villus	18-24°C	METAFAZ FISH		
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	METAFAZ FISH		

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8389948	**FISH_+12 (trizomi 12)**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8389982	**FISH_18q21 (MALT1)**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8392618	**FISH_3q26.2 EVI1(MECOM) Yeniden Düzenlenmeleri**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH	Pzt-Cmt	7 gün
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	FISH		
C8389914	**FISH_(3q27) BCL6**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Parafin Kesit	**Lam**	2	adet	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8389950	**FISH_+8 (trizomi 8)**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8389979	**FISH_8q24 MYC**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Parafin Kesit	**Lam**	1	adet	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	İNTERFAZ FISH		
C8392645	**FLT3 Mutasyon Analizi (ITD ve D835)**							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	FRAGMAN ANALİZİ	Pzt-Cmt	5 gün
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	FRAGMAN ANALİZİ		
C8389206	**Frajil X FMR1 Geni CGG Üçlü Tekrar Sayısı Analizi, Postnatal**							
	FMR1 genindeki CGG triplet sayısını daki değişiklikler, sık rastlanan mental retardasyon sebeplerinden olan Frajil X hastalığına neden olmaktadır.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	PCR-FRAGMAN ANALİZİ	Pzt-Cmt	2 hafta sonra

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8389286	**Frajil X FMR1 Geni CGG Üçlü Tekrar Sayısı Analizi Prenatal**							
	Amniyon sıvısı ve Tam Kan	**Enjektör ve EDTA (Mor Kapak)**	20	mL	18-24°C	TP-PCR	Pzt-Cmt	10 gün sonra
	CVS ve Tam Kan	**Transport Medyum ve EDTA(mor kapak)**	3	villus	18-24°C	TP-PCR		
C8389210	**Friedreich Ataksisi FXN Geni GAA Üçlü Tekrar Sayısı Analizi**							
	FXN genin 1. intronda yer alan 5-30 arasındaki GAA tekrarların patolojik genişlemesi otozomal resesif Friedrich ataksi hastalığının gelişmesine neden olmaktadır.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	TP-PCR/FRAGMAN ANALİZİ	Pzt-Cmt	2 hafta sonra
C8389250	**Fruktoz 1,6 Bifosfotaz Eksikliği FBP1 Geni Dizi Analizi**							
	FBP1 genindeki mutasyonlar, otozomal resesif kalıtılan fruktoz 1,6 bifosfataz eksikliğine neden olmaktadır.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	4 hafta sonra
C8392239	**Galaktokinaz Eksikliği, GALK1 Geni Dizi Analizi**							
	GAKL1 geni dizi analizi (Tüm kodlayan ekzonlar)							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	4 hafta sonra
C8389730	**Galaktozemi GALT Geni Sık Görülen Mutasyon Analizi**							
	GALT genindeki mutasyonlar, otozomal resesif kalıtılan galaktozemi hastalığının gelişmesine neden olmaktadır.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	3 hafta sonra
C8392004	**GATA1 Geni Sık Görülen Mutasyon Analizi**							
	GATA1 geni hematopoietik hücre soylarının normal gelişiminde önemli olan transkripsiyon faktörünü kodlar. GATA1 geninin 2. ekzonundaki mutasyonların analizi ile, özellikle Down sendromlu bireylerde risk artışı bulunan transient myeloproliferatif bozukluk için risk tayini yapılabilmektedir. Remisyon sonrası takip hastalarında kaybolmuş mutasyonun tekrar ortaya çıktığı da gözlenmektedir. Bu nedenle takip belirteci olarak da kullanılabilmektedir.							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	3	ml	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	2 hafta sonra
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ		
C8392437	**GATA2 Geni Dizi Analizi**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	4 hafta sonra
C8392463	**Gen Paneli**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	6	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	6 hafta
C8392135	**Genetik Aritmi Gen Paneli**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	6-8 hafta sonra

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8392865	**Genişletilmiş Herediter Kanser Genleri Paneli (SNVs, InDel ve Büyük Delesyon ve Duplikasyonlar Dahil) ²**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	6	mL	18-24°C		Pzt-Cmt	35 gün
C8392838	**Genom Sekanslama (WGS) SOLO**							
	Biyopsi Materyali	**Steril Tüp**	1	adet	18-24°C	NGS	Pzt-Cmt	6 hafta sonra
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	NGS		
C8392837	**Genom Sekanslama (WGS) TRIO**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	6 hafta
C8392287	**Gilbert Sendromu, UGT1A1 Geni Dizi Analizi**							
	UGT1A1 geni dizi analizi (Tüm kodlayan ekzonlar)							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	4 hafta sonra
C8392746	**Glikojen Depo Hastalıkları Paneli**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	6 hafta
C8392099	**Gonadal Hücre Dondurma, Ön Hazırlık (STR Analizi)**							
	Gonad hücreleri dondurulan bireylerde yasa gereği genotiplemenin yapılması							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	PCR-FRAGMAN ANALİZİ	Pzt-Cmt	7 Gün
C8392268	**G6PD Geni Dizi Analizi**							
	G6PD geni dizi analizi (Tüm kodlayan ekzonlar)							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	6	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	5 hafta sonra
C8392491	**Hedef Mutasyon Analizi, İki Mutasyon**							
	Tüm genler için bilinen 2 adet nokta mutasyonların analizi için bu kayıt açılabilir.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	3 hafta sonra
C8392166	**Hedef Mutasyon Analizi, Prenatal, Tek Mutasyon,**							
	Maternal kontaminasyonun dışlanması için anneden 3 mL, konfirmasyon çalışması için babadan 3 mL EDTA'lı tüpte tam kan gereklidir. Ailede bilinen mutasyonu olan olgularda, genetik danışma verilmiş olması şartıyla, ailede taşınan mutasyonun fetusa nasıl aktarıldığının tayini esasına dayanır.							
	Amniyon sıvısı ve Tam Kan	**Enjektör ve EDTA (Mor Kapak)**	5	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	3 hafta sonra
	CVS ve Tam Kan	**Transport Medyum ve EDTA(mor kapak)**	3	villus	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ		

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8392097	**Hedef Mutasyon Analizi, Tek Mutasyon**							
	Tüm genler için bilinen nokta mutasyonların analizi için bu kayıt açılabilir.							
	DNA	**Steril Tüp**	1	adet	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	3 hafta sonra
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ		
	Parafin Kesit	**Steril Tüp**	2	adet	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ		
	Saç Teli	**Steril Tüp**	1	adet	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ		
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ		
	Yanak Epitel Sürüntüsü	**Steril Tüp**	1	ml	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ		
C8392492	**Hedef Mutasyon Analizi, Üç Mutasyon**							
	Tüm genler için bilinen 3 adet nokta mutasyonların analizi için bu kayıt açılabilir.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	3 hafta sonra
C8392833	**Hemakromatosis HFE Geni Dizi Analizi**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	3 hafta
C8389836	**Hemakromatosis HFE Geni Sık Görülen Mutasyon Analizi**							
	HFE genindeki mutasyonlar, otozomal resesif Hemokromatoz hastalığının gelişmesine neden olmaktadır.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	REAL TIME PCR	Pzt-Cmt	2 hafta sonra
C8392655	**Hemofili A F8 Geni İnversiyon 1 ve 22 Analizi ²**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	6	mL	18-24°C	PCR	Pzt-Cmt	4 hafta
C8390107	**Herediter Kanser Paneli (BRCA1-BRCA2 Dahil) ²**							
	Test içeriğindeki Genler: ABRAXAS1, AIP, ALK, APC, AR, ATM, AXIN2, BAP1, BARD1, BLM, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1, BUB1B, CBL, CD82, CDC73, CDH1, CDK12, CDK4, CDKN1B, CDKN1C, CDKN2A, CEBPA, CEP57, CHEK1, CHEK2, CTNNA1, CYLD, DDB2, DICER1, DIS3L2, EGFR, ELAC2, ENG, EPCAM, ERCC2, ERCC3, ERCC4, ERCC5, EXT1, EXT2, EZH2, FAN1, FANCA, FANCB, FANCC, FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, FANCL, FANCM, FH, FLCN, GALNT12, GATA2, GPC3, HOXB13, HRAS, KIF1B, KIT, LZTR1, MAX, MEN1, MET, MITF, MLH1, MLH3, MRE11, MSH2, MSH3, MSH6, MSR1, MUTYH, MXI1, NBN, NF1, NF2, NSD1, NTHL1, PALB2, PALLD, PAX5, PDGFRA, PHOX2B, PMS1, PMS2, POLD1, POLE, POT1, PPP2R2A, PRF1, PRKAR1A, PRSS1, PTCH1, PTCH2, PTEN, RAD50, RAD51B, RAD51C, RAD51D, RAD54L, RB1, RECQL, RECQL4, RET, RHBDF2, RINT1, RNASEL, RNF43, RUNX1, SBDS, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, SLC45A2, SLX4, SMAD4, SMARCA4, SMARCB1, SMARCE1, SRGAP1, STK11, SUFU, TERT, TGFBR2, TMEM127, TP53, TSC1, TSC2, TYR, VHL, WRN, WT1, XPA, XPC, XRCC2, XRCC3.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	6	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	4 hafta sonra
C8392712	**Herediter Nöropati Paneli**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	6 hafta
C8392736	**Herediter Spastik Parapleji Paneli**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	6-8 hafta

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8390785	**Hızlı Anöploidi Analizi (X,Y,13,18,21)**							
	Maternal kontaminasyonun dışlanması için anneden 3 mL EDTA'lı tüpte tam kan gereklidir.Prenatal tanı amaçlı yapılan invaziv girişim sonrası, numuneden (amniyon sıvısı, CVS) doğrudan elde edilen DNA'dan yapılan ve sadece test edilen kromozomlara özgü bilgi veren bir ön bilgilendirme testidir.İlgili kromozomların yalnızca tam anöploidileri (trizomi - monozomi) tespit edilir; parsiyel monozomi ve trizomiler, ayrıca mozaik kuruluşlar saptanamaz, maternal kontaminasyonu dışlamaz.Test sonucu hekim ile paylaşılır.Uzun süreli kültür sonucu ile birlikte değerlendirilmesi gereken bir testtir.							
	Abortus Materyali ve Tam Kan	**Steril Tüp ve EDTA(mor kapak)**	20	mL	18-24°C	QF-PCR	Pzt-Cmt	3 gün sonra
	Amniyon sıvısı ve Tam Kan	**Enjektör ve EDTA (Mor Kapak)**	5	mL	18-24°C	QF-PCR		
	CVS ve Tam Kan	**Transport Medyum ve EDTA(mor kapak)**	3	villüs	18-24°C	QF-PCR		
	DNA	**Steril Tüp**	1	adet	18-24°C	QF-PCR		
	Hücre Kültürü	**Steril Tüp**	1	adet	18-24°C	QF-PCR		
	Kordosentez(Kordon Kanı)	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	QF-PCR		
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	QF-PCR		
C8392131	**HNPCC (Herediter non-polyposis kolorektal kanser) Paneli ²**							
	Herediter non-polyposis kolorektal kanser (Lynch 1 OMIM# 120435) için MSH2, Herediter non-polyposis kolorektal kanser tip II (OMIM# 609310) için MLH1, Herediter non-polyposis kolorektal kanser tip V (OMIM# 614350) için MSH6 ve Herediter non-polyposis kolorektal kanser tip IV (OMIM# 614337) için PMS2 analizi yapılmaktadır.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	6	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	6-8 hafta sonra
C8392878	**HRDTrack Test ²**							
	Doku	**.**	1	adet	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	30 gün
C8389216	**Huntington Hastalığı Huntingtin (IT15) Geni CAG Üçlü Tekrar Sayısı Analizi**							
	Huntingtin genindeki CAG üçlü tekrar sayısındaki artışı otozomal dominant kalıtılan Huntington hastalığının gelişmesine neden olmaktadır.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	PCR-FRAGMAN ANALİZİ	Pzt-Cmt	2 hafta sonra
C8392040	**IDH1 ve IDH2 Genleri Sık Görülen Mutasyon Analizi**							
	Glioblastoma multiform (GBM) beyin tümörleri içerisinde en sık rastlanan histolojik tiptir. Primer beyin tümörlerinin %22,6-27'sini, tüm gliomaların %50-60'ını , tüm intrakranial tümörlerin %12-15'ini ve astrositik tümörlerin %50-60'ını oluşturmaktadır.							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	18-24°C	FRAGMAN ANALİZİ	Pzt-Cmt	3 hafta sonra
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	FRAGMAN ANALİZİ		
C8392951	**IGHV Geni Hipermutasyon Analizi ²**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DİĞER	Pzt-Cmt	21 gün
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DİĞER		

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8389945	**Imatinib (Gleevec) Direnci ABL1 Geni Mutasyon Analizi**							
	ABL1 geni hücre farklılaşması, hücre bölünmesi, hücre adesyonu ve stres cevabında rol oynayan trozin kinaz proteinini sentezlemektedir.Bu gendeki mutasyonlar lösemi, Philadelphia kromozomu pozitif olgularda imatinib'e direç ile ilişkilendirilmiştir.							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	2 hafta sonra
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ		
C8392773	**İkili Taşıyıcılık Paneli (SMA ve Kistik Fibrozis 50 Mutasyon)**							
	Kistik Fibrozis ile ilişkili CFTR geninde incelenen varyantlar; R347H, R347P, 2789+5G>A, 3120+1G>A, 711+1G>T, R334W, I507del, F508del, 3849+10KbC>T, 1677delTA, 1078delT, V520F, L206W, W1282X, R560T, 2347delG, Q890X, R553X, G551D, S549R(T>G), S549N, M1101K, G542X, 3905insT, Y1092X(C>A), S1251N, 444delA, 1811+1.6kbA>G, 1717-1G>A, R117H, R117C, N1303K, Y122X, 394delTT, G85E, R1066C, 1898+1G>A, W846X, 2184delA, D1152H, CFTRdel2-3, P67L, 2143delT, E60X, 3659delC, 3272-26A>G, 621+1G>T, A455E, R1162X, R1158X. SMN1 geni (OMIM 600354) ekzon 7, ekzon 8 MLPA yöntemiyle incelenmektedir.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	REAL TIME PCR	Pzt-Cmt	3 hafta
C8389938	**inv 16 (p13q22) CBFB-MYH11 Füzyon transkripti**							
	CBFB/MYH11 füzyon analizi, AML tanısı, tedavinin ve minimal rezidüel hastalığın takibi, hastalık nüksünün erken belirlenmesi ile bu füzyona sahip AML'li olguların tanımlanması ve prognoz tayininde belirleyicidir.							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	REAL TIME PCR	Pzt-Cmt	10 gün sonra
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	REAL TIME PCR		
C8389974	**JAK2 Geni Mutasyon Analizi (Ekzon 12)**							
	JAK2 geninde p.V617F mutasyonu saptanmayan hastalarda 12. ekzondaki mutasyonların analiz edilmesi myeloproliferatif hastalıklarda tanının belirlenmesine ve tedavinin yönlendirilmesine katkı sağlamaktadır.							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	10 gün sonra
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ		
C8389939	**JAK2 Geni p.V617F Mutasyon Analizi [1]**							
	JAK2 genindeki p.V617F mutasyonunun analizi myeloproliferatif hastalıklarda tanı belirlenmesine ve tedavinin yönlendirilmesine katkı sağlamaktadır.							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	REAL TIME PCR	Pzt-Cmt	10 gün sonra
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	REAL TIME PCR		
C8392325	**JAK3 Geni Dizi Analizi**							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	3 hafta sonra
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ		
C8392708	**Kadın infertilitesi Panel**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	6 hafta

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8392926	**Kapsamlı Myeloid ve Lenfoid NGS Paneli, CNV ve Füzyonlar Dahil ²**							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	6	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	3 hafta
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	6	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)		
C8392132	**Kardiyomiyopati Gen Paneli**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	6-8 hafta sonra
C8389838	**Kardiyovasküler Risk Paneli**							
	(Faktör V Leiden, Faktör II (G20210A), MTHFR 677T, MTHFR A1298C, PAI-1 4G / 5G, ACE geni I/D, Faktör XIII V34L, ß-Fibrinojen -455 G>A, GPIIIa L33P,Apo B, ApoE)							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	REAL TIME PCR	Pzt-Cmt	2 hafta sonra
C8392391	**Karyotipleme (Kromozom Analizi); Abort Materyali + Maternal Kontaminasyon**							
	Laboratuvardan temin edilen transport medyum içerisinde yada yoksa steril kapta serum fizyolojik içerisinde kabul edilmektedir. Maternal kontaminasyonun dışlanması için anne kanı ile birlikte gönderilmelidir.							
	Abortus Materyali	**Transport Medyum**	1	adet	18-24°C	SİTOGENETİK	Pzt-Cmt	4 hafta sonra
	Abortus Materyali ve Tam Kan	**Transport Medyum ve EDTA(mor kapak)**	1	Adet	18-24°C	SİTOGENETİK		
C8390788	**Karyotipleme (Kromozom Analizi); Amniyon Sıvısı + Hızlı Anöploidi Analizi (X,Y,13,18,21) ¹**							
	Maternal kontaminasyonun dışlanması için anneden 3 mL EDTA'lı tüpte tam kan gereklidir. Amniyon sıvısından kromozom analizi amaçlı, merkezimizde uzun süreli kültür çalışması yapılmakta ve olguların %99'dan fazlasında başarılı sonuç alınmaktadır. Mozaiklik tayini amniyon sıvısından yapılan kromozom analizi çalışmalarında büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla en az iki farklı kültür yürütülmekte, moleküler karyotipleme gibi incelemelrin varlığında daha fazla kültür çalışılmaktadır. Bununla birlikte onam alınan gebelerde, takipte ihtiyaç duyulabilecek olası ek moleküler tetkiklerin planlanabilmesi amaçlı nitelikli DNA eldesi de yapılmakta, yine onam eşliğinde ve izin verilen süre boyunca saklanmaktadır.							
	Amniyon sıvısı ve Tam Kan	**Enjektör ve EDTA (Mor Kapak)**	20	mL	18-24°C	SİTOGENETİK	Pzt-Cmt	3 hafta sonra
C8392374	**Karyotipleme (Kromozom Analizi); Fetal Kan (Kord Kanı) + Hızlı Anöploidi Analizi (X,Y,13,18,21)**							
	Kordon Kanı	**Heparin-Yeşil Kapak**	2	mL	18-24°C	SİTOGENETİK	Pzt-Cmt	10 gün sonra
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	SİTOGENETİK		
C8390711	**Karyotipleme (Kromozom Analizi); Hemato-onkolojik (Periferik Kan) ¹**							
	Hematolojik malignensilerde yapılan karyotip analizinin standart metodlardan farklı ele alınması söz konusudur. Konstitusyonel analizden farklı olarak uyarılmamış kültür uygulanmaktadır. Analizi de özel uzmanlık gerektiren hematolojik karyotipleme çalışması ile merkezimizde 2, nadiren 3 hafta içerisinde konvansiyonel analiz raporu düzenlenebilmektedir.							
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	6	mL	18-24°C	SİTOGENETİK	Pzt-Cmt	3 hafta sonra
C8390702	**Karyotipleme (Kromozom Analizi); Kemik İliği ¹**							
	Hematolojik malignensilerde yapılan karyotip analizinin standart metodlardan farklı ele alınması söz konusudur.Konstitusyonel analizden farklı olarak uyarılmamış kültür uygulanmaktadır.Analizi de özel uzmanlık gerektiren hematolojik karyotipleme çalışması ile merkezimizde 2, nadiren 3 hafta içerisinde konvansiyonel analiz raporu düzenlenebilmektedir.							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	SİTOGENETİK	Pzt-Cmt	3 hafta sonra

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8390715	**Karyotipleme (Kromozom Analizi); Koryon Villus Örneği (CVS) + Hızlı Anöploidi Analizi (X,Y,13,18,21)**							
	Laboratuvardan temin edilen transport medyum içerisinde kabul edilmektedir. Maternal kontaminasyonun dışlanması için anneden 3 mL EDTA'lı tüpte tam kan gereklidir. Gebeliğin 12. haftasında yapılan koryon villus örneklemesinde karyotipleme çalışması yapılmakta olup, direkt preparasyon ve moleküler çalışmalar için de uygun durumlarda numune ayrımı yapılabilmektedir.							
	CVS ve Tam Kan	**Transport Medyum ve EDTA(mor kapak)**	5	villus	18-24°C	SİTOGENETİK	Pzt-Cmt	3 hafta sonra
C8390703	**Karyotipleme (Kromozom Analizi); Periferik Kan [1]**							
	Günümüzde halen sayı olarak en fazla yapılan genetik incelemeler arasında olup, merkezimizde 3 hafta içerisinde olguların çoğunda raporlama yapılabilmektedir.							
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	SİTOGENETİK	Pzt-Cmt	3 hafta sonra
C8392035	**Karyotipleme (Kromozom Analizi); Solid Doku Örneği (Cilt Dokusu vs.)**							
	Laboratuvarımızda özellikle konstitüsyonel mozaiklik tayininde kullanılan cilt biyopsisi ile her tür solid dokudan kromozom ve mikroarray karyotip analizi (C8392094) yapılmaktadır.							
	Biyopsi Materyali	**Steril Tüp**	1	adet	18-24°C	SİTOGENETİK	Pzt-Cmt	4 hafta sonra
	Doku	**Steril Tüp**	1	adet	18-24°C	SİTOGENETİK		
C8392249	**Karyotipleme (Subtelomerik Tarama Dahil); Infertilite, Kötü Obstetrik Öykü Paneli**							
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	SİTOGENETİK / METAFAZ FISH	Pzt-Cmt	3 hafta sonra
C8389901	**KIT (Mast cell growth factor receptor) Geni Ekzon 9, 11, 13, 17 Mutasyon Taraması**							
	KIT glikozillenmiş bir transmembran proteindir.Ttirozin kinaz reseptörü KIT ve ligandı, KITLG (184745), hematopoez melanojenez ve gametogenez yolaklarında işle yapmaktadır.Bu gendeki mutasyonlar AML ve mast hücre hastalığı gibi patolojiler ile ilişkilendirilmiştir.							
	Doku	**Steril Tüp**	1	adet	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	2 hafta sonra
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ		
	Parafin Kesit	**Steril Tüp**	1	Adet	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ		
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ		
C8390117	**KIT (Mast cell growth factor receptor) Geni p.D816V Mutasyon Analizi**							
	KIT glikozillenmiş bir transmembran proteindir.Ttirozin kinaz reseptörü KIT ve ligandı, KITLG (184745), hematopoez melanojenez, ve gametogenez yolaklarında işle yapmaktadır. Bu gendeki mutasyonlar özellikle p.D817V mutasyonu AML ve mast hücre hastalığı gibi patolojiler ile ilişkilendirilmiştir.							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	2 hafta sonra
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ		

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8389861	**Kimerizm, PCR Bazlı STR Fragman Analizi**							
	Kimerizm analizi, allo-kök hücre transplantasyonundan sonra verici kaynaklı lenf bezi ve kan hücrelerinin alıcıda bulunması şeklinde uygulanan bir tanı testidir. Kan ve kemik iliği örneklerinde yapılan bu analiz, donör hücrelerinin engrafmanı ve altta yatan hastalık relapsının riski hakkında önemli bilgiler verir							
	DNA	**Steril Tüp**	3	ml	18-24°C	PCR-FRAGMAN ANALİZİ	Pzt-Cmt	7 gün sonra
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	PCR-FRAGMAN ANALİZİ		
	Saç Teli	**Steril Tüp**	1	ADET	18-24°C	PCR-FRAGMAN ANALİZİ		
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	PCR-FRAGMAN ANALİZİ		
C8392030	**Kimerizm, PCR Bazlı STR Fragman Analizi, Ön Hazırlık**							
	STR bölgelerinin; 16 lokus (D3S1358, TH01, D21S11, D18251, Penta E, D5S818, D13S317, D7S820, D16S539, CSF1PO, Penta D, vWA, Amelogenin, D8S1179, TPOX, FGA) floresan PCR ve kapiller elektroforez yöntemi ile analizine dayanır. Alıcının yapısal profili ve verici adayının STR profili çıkarılarak nakil sonrası hızlı bir şekilde kimerizm incelemesinin sonuçlandırılması sağlanır.							
	Diğer	**.**	1	ADET	18-24°C	PCR-FRAGMAN ANALİZİ	Pzt-Cmt	7 gün sonra
	Saç Teli	**Steril Tüp**	5	Adet	18-24°C	PCR-FRAGMAN ANALİZİ		
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	PCR-FRAGMAN ANALİZİ		
C8392216	**Kistik Fibroz, CFTR Geni Delesyon Duplikasyon Analizi**							
	Amniyon sıvısı ve Tam Kan	**Enjektör ve EDTA (Mor Kapak)**	5	mL	18-24°C	MLPA	Pzt-Cmt	4 hafta sonra
	CVS ve Tam Kan	**Transport Medyum ve EDTA(mor kapak)**	5	villus		MLPA		
	Kordon Kanı	**EDTA+Heparin**	3	mL	18-24°C	MLPA		
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	MLPA		
C8389125	**Kistik Fibroz CFTR Geni Dizi Analizi**							
	CFTR genindeki mutasyonlar, otozomal resesif kalıtılan kistik fibrozis hastalığının gelişmesine neden olmaktadır. Ayrıca infertil erkek hastalarda konjenital bilateral vas deferens yokluğuda (CBAVD) CFTR gen mutasyonları ile ilişkilendirilmiştir.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	6	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	4 hafta sonra
C8389191	**Kistik Fibroz CFTR Geni Dizi Analizi, Prenatal ²**							
	Maternal kontaminasyonun dışlanması için anneden 3 mL EDTA'lı tüpte tam kan gereklidir.							
	Amniyon sıvısı ve Tam Kan	**Enjektör ve EDTA (Mor Kapak)**	5	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	4 hafta sonra
	CVS ve Tam Kan	**Transport Medyum ve EDTA(mor kapak)**	3	villus	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)		
	Kordon Kanı	**EDTA+Heparin**	3	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)		

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8392610	**Kistik Fibroz Sık Görülen Mutasyon Tarama**							
	Kistik Fibrozis ile ilişkili CFTR geninde 50 mutasyon taraması yapılmaktadır. İncelenen varyantlar; R347H, R347P, 2789+5G>A, 3120+1G>A, 711+1G>T, R334W, I507del, F508del, 3849+10KbC>T, 1677delTA, 1078delT, V520F, L206W, W1282X, R560T, 2347delG, Q890X, R553X, G551D, S549R(T>G), S549N, M1101K, G542X, 3905insT, Y1092X(C>A), S1251N, 444delA, 1811+1.6kbA>G, 1717-1G>A, R117H, R117C, N1303K, Y122X, 394delTT, G85E, R1066C, 1898+1G>A, W846X, 2184delA, D1152H, CFTRdel2-3, P67L, 2143delT, E60X, 3659delC, 3272-26A>G, 621+1G>T, A455E, R1162X, R1158X.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	REAL TIME PCR	Pzt-Cmt	10 gün
C8392611	**Kistik Fibroz Sık Görülen Mutasyon Tarama, Prenatal**							
	Kistik Fibrozis ile ilişkili CFTR geninde 50 mutasyon taraması yapılmaktadır. İncelenen varyantlar; R347H, R347P, 2789+5G>A, 3120+1G>A, 711+1G>T, R334W, I507del, F508del, 3849+10KbC>T, 1677delTA, 1078delT, V520F, L206W, W1282X, R560T, 2347delG, Q890X, R553X, G551D, S549R(T>G), S549N, M1101K, G542X, 3905insT, Y1092X(C>A), S1251N, 444delA, 1811+1.6kbA>G, 1717-1G>A, R117H, R117C, N1303K, Y122X, 394delTT, G85E, R1066C, 1898+1G>A, W846X, 2184delA, D1152H, CFTRdel2-3, P67L, 2143delT, E60X, 3659delC, 3272-26A>G, 621+1G>T, A455E, R1162X, R1158X.							
	Amniyon sıvısı ve Tam Kan	**Steril Tüp ve EDTA(mor kapak)**	10	mL	18-24°C	REAL TIME PCR	Pzt-Cmt	10 gün
	CVS ve Tam Kan	**Steril Tüp ve EDTA(mor kapak)**	5	adet	18-24°C	REAL TIME PCR		
C8392774	**Kistik Fibrozis (50 Mutasyon) ve Frajil X Taşıyıcılık Paneli**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	REAL TIME PCR	Pzt-Cmt	3 hafta
C8392872	**Kolorektal Kanser Paneli (Likid Biyopsi) ²**							
	Tam Kan	**Özel Kit**	20	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	21 gün
C8392150	**Konjenital Adrenal Hiperplazi CYP21A2 Geni Delesyon Duplikasyon Analizi**							
	CYP21A2 genindeki delesyon ve duplikasyonlar, 21 hidroksilaz eksikliğine bağlı konjenital adrenal hiperplazi etyolojisine neden olmaktadır.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	MLPA	Pzt-Cmt	4 hafta sonra
C8392033	**Konjenital Adrenal Hiperplazi CYP21A2 Geni Dizi Analizi**							
	CYP21A2 genindeki mutasyonlar, 21 hidroksilaz eksikliğine bağlı konjenital adrenal hiperplazi etyolojisine neden olmaktadır.							
	Amniyon sıvısı ve Tam Kan	**Enjektör ve EDTA (Mor Kapak)**	20	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	4 hafta sonra
	CVS ve Tam Kan	**Steril Tüp ve EDTA(mor kapak)**	1	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ		
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ		
C8392747	**Konjenital Miyasteni Paneli**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	6 hafta
C8392711	**Konjenital Miyopati ve Kas Distrofisi Paneli**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	6 hafta

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8392140	**Konjenital Nötropeni ELANE (ELA2) Geni Dizi Analizi**							
	ELANE genindeki mutasyonlar, otozomal dominant konjenital nötropeni hastalığının gelişmesine neden olmaktadır.							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	2 hafta sonra
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ		
C8392126	**Konjenital Sağırlık Connexin 26 (GJB2) Geni Dizi Analizi**							
	Non sendromik işitme kaybından sorumlu olan onlarca gen tanımlanmıştır.En sık Non sendromik işitme kayıplarına neden olan mutasyonlar GJB2 geninde yeralmaktadır. Conneksin 26 genindeki mutasyonların taranması ile non-sendromik işitme kayıplarının %50 sine tanı koyulabilmektedir.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	3 hafta sonra
C8392748	**Konjenital Trombositopeni Paneli**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	6 hafta
C8390112	**KRAS Ekzon 2, 3, 4 Mutasyon Analizi**							
	c-KRAS genindeki mutasyonlar, özellikle gastrik kanserlerde tedavi yanıtı değerlendirmede prediktör test olarak değerlidir.Ayrıca KRAS mutasyonları, mesane, meme, akciğer, myeloid, pankreatik kanserlerde, noonan sendromu ile de ilişkilendirilmektedir.							
	Biyopsi Materyali	**Steril Tüp**	1	adet	18-24°C	REAL TIME PCR	Pzt-Cmt	2 hafta sonra
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	REAL TIME PCR		
	Parafin Kesit	**Steril Tüp**	1	adet	18-24°C	REAL TIME PCR		
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	REAL TIME PCR		
C8392322	**Kromozomal İnstabilite Sendromları; DEB Testi**							
	Kromozomal kırık sendromları ve mutajenite çalışmaları için kromozom analizi							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	2	mL	18-24°C	SİTOGENETİK	Pzt-Cmt	3 hafta sonra
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	2	mL	18-24°C	SİTOGENETİK		
C8389501	**Leber Optik Atrofi MTND1 Geni Sık Görülen Mutasyon Analizi**							
	Mitokondrial genom MTND1-4-6 m.3460G>A, m.11778G>A, m.14484T>C mutasyonları Leber'in herediter optik nöropatisi (LHON, OMIM# 535000) ile ilişkilendirilmiştir.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	2 hafta sonra
C8392147	**Lokusa Özgü FISH Analizi**							
	Kemik İliği	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	METAFAZ FISH	Pzt-Cmt	2 hafta sonra
	Parafin Kesit	**Lam**	1	ader	18-24°C	METAFAZ FISH		
	Tam Kan	**Heparin-Yeşil Kapak**	3	mL	18-24°C	METAFAZ FISH		

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8392953	**Lösemi NGS Füzyon Paneli ²**							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	21 gün
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)		
C8392955	**Lösemi_MRD (Minimal Residual Disease) Test NGS_Füzyon ²**							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	21 gün
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)		
C8392954	**Lösemi_MRD (Minimal Residual Disease) Test NGS_Mutasyon**							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	21 gün
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)		
C8392128	**Marfan Sendromu FBN1 Geni Dizi Analizi ²**							
	Fibrillin-1 (FBN1) genindeki heterozigot mutasyonlar, çarpıcı pleyotropizm ve klinik değişkenlik gösteren otozomal dominant kalıtılan bir fibröz bağ dokusu hastalığı olan Marfan sendromuna neden olmaktadır.							
	Amniyon sıvısı ve Tam Kan	**Enjektör ve EDTA (Mor Kapak)**	20	1	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	6 hafta sonra
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	6	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)		
C8389293	**Metakromatik Lökodistrofi ARSA Geni Dizi Analizi**							
	ARSA genindeki mutasyonlar, otozomal resesif kalıtılan Metakromatik Lökodistrofi metobalik hastalığının tanısına yardımcı olmaktadır.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	4 hafta sonra
C8392094	**Mikroarray (Postnatal Diagnostik Array) ¹**							
	Özellikle açıklanamayan zihinsel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu, çoklu konjenital anomalilerde birinci basamak test olarak kabul edilen moleküler karyotipleme, merkezimizde Affymetrix marka SNP array platformu kullanılarak yüksek çözünürlüklü SNP array teknolojisi ile uygulanmaktadır. Bu yöntem sayesinde genom boyu analiz imkanı yaratılarak neredeyse intragenik olanlar dahil, olası genomik dengesizliklerin yüksek duyarlılıkta taranması ve etyolojinin aydınlatılması mümkün olmaktadır. Çalışmanın sürdürülmesi esnasında bulguların karşılaştırılması amaçlı anne baba analizleri gerkebilir. Sonraki gebelik planları da dahil olmak üzere test öncesi ve test sonrası genetik danışmanın verilmesi önem arz eder.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SNP ARRAY	Pzt-Cmt	4 hafta sonra
C8392714	**Mikroarray, Segregasyon Analizi (Anne-Baba)**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	MIKROARRAY	Pzt-Cmt	2 hafta

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8390108	**Mikrosatellit Instabilitesi**							
	Hastanı dokusunun yanısıra 3 mL EDTA'lı tam kanınında gönderilmesi gerekmektedir.Mikrosatelitler, her insanın hücrelerinde bulunan ve sürekli tekrar eden kısa DNA dizileridir.Bu DNA dizileri tekrarlanırken DNA tamir genleri (Mismatch Repair System, MMR) olası hataları tamir eder ve düzenler; MMR'ın düzenleyemediği genler normalin dışında diziler geliştirir ve Mikrosatellit İnstabilite (MSI) olarak adlandırılır.Mikrosatellit instabilitesi (MSI) sporadik kolon kanserlerinin %10–20 'sinde gözlenir.Aynı zamanda Kalıtsal Lynch Sendromu'nun (HNPCC) %90 oranında rastlanılan bir faktördür.Mononükleotid tekrar markerlarından (BAT25, BAT26, Mono27, NR21 ve NR24') oluşan bir panel kullanılarak tümör dokusu ve normal dokuda MSI'nin değerlendirilmesi yapılabilmektedir.							
	DNA	**Steril Tüp**	3	adet	18-24°C	PCR-FRAGMAN ANALİZİ	Pzt-Cmt	2 hafta sonra
	Doku	**Steril Tüp**	1	adet	18-24°C	PCR-FRAGMAN ANALİZİ		
	Parafin Kesit ve Tam Kan	**Steril Tüp ve EDTA(mor kapak)**	1	adet	18-24°C	PCR-FRAGMAN ANALİZİ		
C8392179	**Mitokondriyal Genom Analizi** ²							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	6	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	45 gün sonra
C8392134	**MODY Gen Paneli** ²							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	6	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	6-8 hafta sonra
C8392630	**MPN Moleküler+FISH Paneli**							
	Panel içeriğinde çalışılan parametreler; FISH ile; FIP1L1/CHIC2/PDGFRA, FISH_t(9;22) BCR/ABL, FISH_Del 7q22/del 7q35, FISH_Del 13q34, FISH_+8 (trizomi 8), FISH_Del/amp 17p13.1 (p53), FISH_Del 20q12, FISH_Trizomi 21. Realtime PCR ile; CALR, MLP, JAK2 (Ekzon 12 ve V617F), CSF3R							
	Kemik İliği	**EDTA+Heparin**	6	mL	18-24°C	FISH+REAL TIME	Pzt-Cmt	7 gün
	Tam Kan	**EDTA+Heparin**	6	mL	18-24°C	FISH+REAL TIME		
C8392609	**MPN Tarama Testi (CALR, MPL, JAK2 (Ekzon 12 ve V617F), CSF3R)**							
	Panel içeriğinde çalışılan parametreler; Realtime PCR ile; CALR, MLP, JAK2 (Ekzon 12 ve V617F), CSF3R							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	18-24°C	REAL TIME PCR	Pzt-Cmt	1 hafta sonra
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	REAL TIME PCR		
C8389829	**MTHFR c.C677T ve c.A1298C Polimorfizmleri**							
	MTHFR genindeki polimorfizmler, homosistein düzeyindeki değişiklikler ile ilişkilendirilmektedir.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	REAL TIME PCR	Pzt-Cmt	10 gün sonra
C8389845	**MTHFR Geni c.A1298C Polimorfizm Analizi**							
	MTHFR genindeki polimorfizmler, homosistein düzeyindeki değişiklikler ile ilişkilendirilmektedir.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	REAL TIME PCR	Pzt-Cmt	10 gün sonra

Tam Kan: Test için EDTA-Tam kan gerekmektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8389841	**MTHFR Geni c.C677T Polimorfizm Analizi**							
	MTHFR genindeki polimorfizmler, homosistein düzeyindeki değişiklikler ile ilişkilendirilmektedir.							
	DNA	**Steril Tüp**	1		18-24°C	REAL TIME PCR	Pzt-Cmt	10 gün sonra
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	REAL TIME PCR		
C8392148	**Multipl Endokrin Neoplazi Tip 1 MEN1 Geni Dizi Analizi**							
	MEN1 geni, menin isimli bir nukleer katlanma proteini kodlar. Bu protein kromatin yeniden düzenlenmesine etki ederek transkripsiyonu düzenler. MEN1 geninin tümör baskılayıcı olarak fonksiyon gördüğü kabul edilir. Multipl endokrin neoplazi tip 1 (OMIM# 131100), otozomal dominant kalıtılan bir genetik sendromdur. Paratiroid, pankreas adacığı, ön pituiter, duodenal endokrin hücre tümörleriyle karakterizedir. Penetransı 50 yaş itibariyle %90 üzerindedir.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	4 hafta sonra
C8390130	**Multipl Endokrin Neoplazi Tip2A RET Geni Dizi Analizi**							
	MEN2A da MEN1 gibi otozomal dominant çoklu endokrin tümör sendromudur. RET genindeki mutasyonlar multiple endokrin neoplazilerin tanısına yardımcı olmaktadır.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	6	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	4 hafta sonra
C8392737	**Müsküler Distrofi Paneli**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	6 hafta
C8392784	**MYD88 (L265P) Hedef Varyant Analizi**							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	10 gün
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ		
C8399906	**Myeloproliferatif hastalıklarda CALR Gen Mutasyon Analizi**							
	Calreticulin, Ca (2+) bağlayan çok işlevli bir proteindir.Aynı zamanda, transkripsiyon regülasyonunda rol oynayabileceğini düşündürmektedir.CALR geninde özellikle 9. ekzonda görülen somatik mutasyonlar myeloproliferatif hastalıkların (MPD) tanısında önemlidir.BCR/ABL füzyonu, JAK2 ve MPL mutasyonu görülmeyen olgularda test edilmesi tanın değerlendirilmesinde önemli olabilmektedir.							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	2 hafta sonra
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ		
C8389989	**Myeloproliferative Leukemia Protein, MPL Geni Sık Görülen Mutasyon Analizi**							
	MPL geni trombopoietin reseptörünü, multipotent hematopötik projenitör hücreleri ve plateletler üretimini regüle eden bir hematopoietik büyüme faktörünü kodlamaktadır. MPL genindeki mutasyonlar "Myeloid metaplazi ile seyreden miyolofibrosis" hastalığına neden olmaktadır.							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	10 gün sonra
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ		
C8389218	**Myotonik Distrofi Tip 1 DMPK geni CTG Üçlü Tekrar Sayısı Analizi**							
	DMPK genindeki CTG üçlü tekrar sayısındaki patolojik artışlar (50 üzeri) otozomal dominant Myotonik Distrofi 1 hastalığının gelişmesine neden olmaktadır.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	TP-PCR/FRAGMAN ANALİZİ	Pzt-Cmt	3 hafta sonra

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8392489	**Non-invaziv Prenatal Tarama Testi (NIPT), Anne kanından Trizomi 13-18-21, Sık Görülen 5 Mikrodelesyon Taraması (NATERA Panorama) ²**							
	Gebeliğin 9. haftasından itibaren anne kanından yapılan Trizomi 21-13-18 ve ek olarak sık görülen 5 mikrodelesyon taraması, genetik bilgilendirme eşliğinde test edilip rapor teslimi yapılan bir tarama testidir.							
	Tam Kan	**Özel Kit**	10	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	14 gün sonra
C8392476	**Non-invaziv Prenatal Tarama Testi (NIPT), Anne kanından Trizomi 13-18-21, DiGeorge taraması (Natera, Panorama) ²**							
	Gebeliğin 9. haftasından itibaren anne kanından yapılan Trizomi 21-13-18 ve ek olarak DiGeorge Sendromu taraması, genetik bilgilendirme eşliğinde test edilip rapor teslimi yapılan bir tarama testidir.							
	Tam Kan	**Özel Kit**	20	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	14 gün sonra
C8392703	**Non-sendromik İşitme Kaybı Paneli**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	6 hafta
C8392821	**Noonan Sendromu Paneli / RASopati Paneli**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	8 hafta
C8392092	**Noonan Sendromu PTPN11 Geni Dizi Analizi ²**							
	PTPN11 geni ekstraselüler cevabın düzenlenmesine rol oynayanbir trozin fosfataz proteini kodlamaktadı Bu gendeki mutasyonlar, otozomal dominant kalıtılan Noonan sendromu tip I neden olmaktadır. Noonan sendromunda genetik heterojenite söz konusudur ve gerek prenatal tarama gerekse postnatal dönemde yapılan taramalarda dizi analizi yöntemi ile yapılan nokta mutasyon taramasının birinci basamak moleküler tarama olarak gerçekleştirilmektedir.							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	4 hafta sonra
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	6	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ		
C8392162	**Noonan Sendromu PTPN11 Geni Dizi Analizi, Prenatal**							
	Maternal kontaminasyonun dışlanması için anneden 3 mL, konfirmasyon çalışması için babadan 3 mL EDTA'lı tüpte tam kan gereklidir.PTPN11 geni ekstraselüler cevabın düzenlenmesine rol oynayan bir trozin fosfataz proteini kodlamaktadır.Bu gendeki mutasyonlar, otozomal dominant kalıtılan Noonan sendromu tip I neden olmaktadır.Noonan sendromunda genetik heterojenite söz konusudur ve gerek prenatal tarama gerekse postnatal dönemde yapılan taramalarda dizi analizi yöntemi ile yapılan nokta mutasyon taramasının birinci basamak moleküler tarama olarak gerçekleştirilmektedir.							
	Abortus Materyali ve Tam Kan	**Steril Tüp ve EDTA(mor kapak)**	1	Adet	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	3 hafta sonra
	Amniyon sıvısı ve Tam Kan	**Enjektör ve EDTA (Mor Kapak)**	5	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ		
	CVS ve Tam Kan	**Transport Medyum ve EDTA(mor kapak)**	3	villus	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ		
	Kordon Kanı	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ		
C8392710	**Nörodejeneratif Hastalık (Erişkin Başlangıçlı) Paneli**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	6 hafta
C8392941	**Nörofibromatozis NF1 ve NF2 Genleri Dizi Analizi ²**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	6	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	6 hafta

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8392145	**Nörofibromatozis Tip 1 NF1 Geni Delesyon Duplikasyon Analizi**							
	Nörofibromin (NF1) genindeki mutasyonlar, otozomal dominant kalıtılan café-au-lait lekeleri, gözde lisch nodülleri ve deride fibromatoz tümör ile karakterize otozomal dominant kalıtılan tip 1 nörofibromatoz hastalığına neden olmaktadır. .							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	MLPA	Pzt-Cmt	4 hafta sonra
C8392324	**Nörofibromatozis Tip 2 NF2 Geni Delesyon Duplikasyon Analizi**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	MLPA	Pzt-Cmt	4 hafta sonra
C8392338	**NPHP1 Geni Delesyon Duplikasyon Analizi**							
	NPHP1 geni tamamını kapsayan delesyonlar ve duplikasyonlarının belirlenmesi							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	MLPA	Pzt-Cmt	4 hafta sonra
C8392786	**NPM1 MutA, B, C ve D Rezidüel Analiz**							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	10 gün
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ		
C8392213	**NRAS Ekzon 2, 3, 4 Mutasyon Analizi**							
	Biyopsi Materyali	**Steril Tüp**	1	adet	18-24°C	REAL TIME PCR	Pzt-Cmt	3 hafta sonra
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	REAL TIME PCR		
	Parafin Kesit	**Steril Tüp**	1	adet	18-24°C	REAL TIME PCR		
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	REAL TIME PCR		
C8392675	**NRAS Tüm Gen Dizi Analizi**							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	21 gün
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ		
C8390123	**Nükleofosmin (NPM1) Geni Ekzon 12 Mutasyon Analizi**							
	NPM1 çekirdek ve sitoplazma arasında çalışan nükleolar bir proteindir. Bu genedeki mutasyonlar AML ile ilişkilendirilmiştir. AML hastalarında, C-KIT, FLT3-ITD, CEBPA analizlerine ek olarak NPM1 genin 12. ekzonundaki mutasyonlar da prognozu belirlemede yardımcı olmaktadır.							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	10 gün sonra
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ		

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8389259	**Oligodendroglioma 1p / 19q delesyonları**							
	D1S162, D1S226, D1S186, D1S312, D19S112, D19S918 ve D19S206 STR bölgelerinin analizi, Kromozom 1p ve 19q'da heterozigozite kaybının belirlenmesine yardımcı olmaktadır.							
	Doku ve Tam Kan	**Steril Tüp ve EDTA(mor kapak)**	1	cm3	18-24°C	PCR-FRAGMAN ANALİZİ	Pzt-Cmt	3 hafta sonra
	Parafin Kesit ve Tam Kan	**Steril Tüp ve EDTA(mor kapak)**	1	Adet	18-24°C	PCR-FRAGMAN ANALİZİ		
C8392886	**OncoTrack - Likid Biyopsi-NGS (EGFR, KRAS, NRAS, BRAF) ²**							
	Tam Kan	**Özel Kit**	20	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	21 gün
C8392713	**Oosit Maturasyon Defekt Paneli**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	6 hafta
C8389810	**Orak Hücre (Sickle Cell) Anemisi HBB Geni p.E7V Mutasyon Analizi, Postnatal**							
	Beta-globin (HBB) genindeki mutasyonlar özellikle kodon 7 (p.E7V) mutasyonu Orak hücreli anemisinin gelişmesine neden olmaktadır.							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	2 hafta sonra
C8389890	**Orak Hücre (Sickle Cell) Anemisi HBB Geni p.E7V Mutasyon Analizi, Prenatal**							
	Maternal kontaminasyonun dışlanması için anneden 3 mL, konfirmasyon çalışması için babadan 3 mL EDTA'lı tüpte tam kan gereklidir. Orak hücreli anemi (OMIM# 603903), beta-globin (HBB) genindeki mutasyonlar sonucu ortaya çıkar ve bunların başlıcası olan kodon 7 (eski terminoloji ile 6) E7V mutasyonu test edilmektedir.							
	Amniyon sıvısı ve Tam Kan	**Enjektör ve EDTA (Mor Kapak)**	5	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	2 hafta sonra
	CVS ve Tam Kan	**Transport Medyum ve EDTA(mor kapak)**	3	villus	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ		
C8392744	**Osteogenesis İmperfecta Paneli**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	6 hafta
C8389839	**PAI-1 Geni -675 4G / 5G Polimorfizmi Analizi**							
	PAI-1 -675 4G / 5G polimorfizmi Plasminogen activator inhibitor-1 defekti ile ilişkilidir. Genin promotor bölgesinde yer alan bu polimorfizm, 4G alleli olarak mevcutsa yüksek plazma PAI1 transkripsiyon ve aktivitesi ile ilişkilidir. Aslında 5G alleli de transkripsiyonel aktivatöre bağlanır; ancak aynı zamanda bir reseptöre bağlandığından koruyucudur. Bu nedenle özellikle MI öyküsü olan 45 yaş altı bireylerde 4G allel sıklığı daha fazladır.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	REAL TIME PCR	Pzt-Cmt	10 gün sonra
C8392313	**Paragangliom Paneli; SDHB, SDHC, SDHD, VHL Geni Dizi Analizi**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	6	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	6-8 hafta sonra

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8390122	**PDGFRA Geni Ekzon 12, 14, 18 Mutasyon Analizi**							
	PDGRFA geni, FIP1L1 füzyonu ile hipereozinofilik sendrom etyolojisinde adı geçmekle birlikte özellikle gastrointestinal stromal tümörlerde, GIST, (OMIM# 606764) somatik mutasyonları önem taşır.Tedavi yanıtının belirlenmesinde yardımcı olan bu belirteç için merkezimizde 12, 14 ve 18. ekzonlar dizi analizi yöntemiyle incelenmektedir.							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	2 hafta sonra
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ		
C8392146	**Pelizeus Merzbacher PLP1 Geni Delesyon Duplikasyon Analizi**							
	PLP1 genindeki mutasyonları X'e bağlı resesif kalıtılan Pelizaeus Merzbacher hastalığı gelişmesine neden olmaktadır.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	MLPA	Pzt-Cmt	4 hafta sonra
C8392706	**Periyodik Ateş Paneli**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	6 hafta
C8392168	**PGT-A, PGT-SR_Moleküler Karyotipleme**							
	Embriyo biopsisi ile elde edilen materyalden Karşılaştırmalı Genomik Hibridizasyon (CGH Array) yöntemi ile tüm kromozomların incelenerek normal embriyoların belirlenmesi. Bu yöntem ile Polar Body, Blastomer ve Trofektoderm biyopsileri çalışılarak sonuç verilir.							
	Diğer	**.**	1		18-24°C	ARRAY CGH / YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	Laboratuvara Danışınız
	Trofektoderm	**Laboratuvara danışınız**	0		18-24°C	ARRAY CGH / YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)		
C8392155	**PGT-HLA Uyumu_Ön Hazırlık ve I.Deneme**							
	Sadece HLA uyumu için PGT yaptırmak için başvuran ailelerde, aile bireylerinde STR ların çalışılarak tek hücrede tanıyı gerçekleştirebilecek önhazırlık işlemleri ve ailenin birinci IVF denemesi ile oluşan embriyolarında biyopsi ile tanı işleminin gerçekleştirilmesi							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	MULTİPLEKS PCR	Pzt-Cmt	Laboratuvara Danışınız
	Trofektoderm	**Laboratuvara danışınız**	0		18-24°C	MULTİPLEKS PCR		
C8392835	**PGT_İlave Tek Emriyo**							
	Trofektoderm	**Laboratuvara danışınız**	1	adet	18-24°C	MULTİPLEKS PCR / FRAGMAN ANALİZİ	Pzt-Cmt	Laboratuvara Danışınız

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8392082	**PGT-M_Tek Gen Hastalıkları_ Ön Hazırlık ve I.Deneme**							
	Sık görülen tek gen hastalıklarında (HBB ve SMA) PGT yaptırmak için başvuran ailelerde, aile bireylerinde mutasyonların ve STR ların çalışılarak tek hücrede tanıyı gerçekleştirebilecek önhazırlık işlemleri ve ailenin birinci IVF denemesi ile oluşan embriyolarında biyopsi ile tanı işleminin gerçekleştirilmesi.							
	DNA	**Steril Tüp**	1		18-24°C	MULTİPLEKS PCR / FRAGMAN ANALİZİ	Pzt-Cmt	Laboratuvara Danışınız
	Parafin Kesit	**Steril Tüp**	1		18-24°C	MULTİPLEKS PCR / FRAGMAN ANALİZİ		
	Saç Teli	**Steril Tüp**	1		18-24°C	MULTİPLEKS PCR / FRAGMAN ANALİZİ		
	Sürüntü	**Swap**	1	Adet	18-24°C	MULTİPLEKS PCR / FRAGMAN ANALİZİ		
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	MULTİPLEKS PCR / FRAGMAN ANALİZİ		
	Trofektoderm	**Laboratuvara danışınız**	0		18-24°C	MULTİPLEKS PCR / FRAGMAN ANALİZİ		
C8392084	**PGT-M_Tek Gen_II. Deneme ve Üstü**							
	PGT tek gen yaptırmak için başvuran ailelerin ikinci IVF denemesi ile oluşan embriyolarında biyopsi ile tanı işleminin gerçekleştirilmesi.							
	Trofektoderm	**Laboratuvara danışınız**	1	adet	18-24°C	MULTİPLEKS PCR / FRAGMAN ANALİZİ	Pzt-Cmt	Laboratuvara Danışınız
C8392664	**PGT-M_Tek Gen+PGT-HLA_II.Deneme ve Üstü**							
	Trofektoderm	**Laboratuvara danışınız**	0	adet	18-24°C	MULTİPLEKS PCR / FRAGMAN ANALİZİ	Pzt-Cmt	Laboratuvar danışınız
C8392154	**PGT-M_Tek Gen+PGT-HLA_Ön Hazırlık ve I.Deneme**							
	Tek Gen hastalığı ve HLA uyumu için PGT yaptırmak için başvuran ailelerde, aile bireylerinde mutasyon ve STR ların çalışılarak tek hücrede tanıyı gerçekleştirebilecek önhazırlık işlemleri ve ailenin birinci IVF denemesi ile oluşan embriyolarında biyopsi ile tanı işleminin gerçekleştirilmesi							
	DNA	**Steril Tüp**	1	adet	18-24°C	MULTİPLEKS PCR / FRAGMAN ANALİZİ	Pzt-Cmt	Laboratuvara Danışınız
	Sürüntü	**Swap**	1	Adet	18-24°C	MULTİPLEKS PCR / FRAGMAN ANALİZİ		
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	MULTİPLEKS PCR / FRAGMAN ANALİZİ		
	Trofektoderm	**Laboratuvara danışınız**	0		18-24°C	MULTİPLEKS PCR / FRAGMAN ANALİZİ		

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8392088	**PGT_Tek gen doğrulama_Prenatal Tanı**							
	Maternal kontaminasyonun dışlanması için anneden 3 mL EDTA'lı tüpte tam kan gereklidir.Tek gen hastalıkları için yapılan PGT sonucu hamile kalan anne adaylarında Prenatal tanı yöntemleri ile tanının doğruluğunun kesinleştirilmesi sağlanır.							
	Amniyotik Sıvı	**Enjektör**	20	mL	18-24°C	QF-PCR / SİTOGENETİK / DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	Laboratuvara Danışınız
	CVS	**Transport Medyum**	6	adet	18-24°C	QF-PCR / SİTOGENETİK / DNA DİZİ ANALİZİ		
	Trofektoderm	**Laboratuvara danışınız**	0		18-24°C	QF-PCR / SİTOGENETİK / DNA DİZİ ANALİZİ		
C8389214	**Prader-Willi - Angelman sendromu SNRPN Geni Metilasyon Paterni Analizi**							
	Prader Willi sendromu (OMIM# 176270) bir kontig gen sendromudur ve imprint genlerden 15q11-q13 bölgesindeki SNRPN, NDN ve muhtemelen başka bazı genlerin paternal kopyalarının delesyonları sonucu ortaya çıkar.Angelman sendromu (OMIM#105830) ise bilinen dört farklı genetik mekanizma ile ilişkilidir.Olguların %70'e yakını aynı bölgenin maternal kopyasındaki delesyon nedeniyle ortaya çıkar.Bunun dışında paternal UPD (%2), imprinting defektleri (%2-3) de önemlidir.Kalan %25'lik kısım ise ubiquitin-protein ligase E3A geni (UBE3A; 601623)mutasyonları sonucu ortaya çıkmaktadır.Merkezimizde bölgesel delesyonlara yönelik FISH analizi (C8392060), array karyotipleme (C8392094) yanında MLPA yöntemi ile delesyon ve ilişkili imprinting tiplemesi yapılmaktadır.							
	Amniyon sıvısı ve Tam Kan	**Steril Tüp ve EDTA(mor kapak)**	5	mL		MLPA	Pzt-Cmt	4 hafta sonra
	CVS ve Tam Kan	**Steril Tüp ve EDTA(mor kapak)**	3	Adet	18-24°C	MLPA		
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	MLPA		
C8392684	**Pre-B-ALL-BFM Geniş Panel**							
	Kemik İliği	**EDTA+Heparin**	3	mL	18-24°C	Interfaz FISH	Pzt-Cmt	21 gün
	Tam Kan	**EDTA+Heparin**	3	mL	18-24°C	Interfaz FISH		
C8392467	**Prenatal Trio Ekzom**							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	6 hafta
	Amniyon sıvısı ve Tam Kan	**Enjektör ve EDTA (Mor Kapak)**	20	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)		
	CVS ve Tam Kan	**Steril Tüp ve EDTA(mor kapak)**	5	villus	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)		
C8392704	**Primer İmmünyetmezlik NGS Paneli**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	6 hafta
C8392740	**Primer Silier Diskinezi Paneli**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	6 hafta sonra
C8392330	**PRSS1 Geni Dizi Analizi**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	4 hafta sonra

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8392749	**Rasopati Paneli**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	6 hafta
C8392668	**Retinitis Pigmentosa Paneli**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	6 hafta
C8392355	**Rett Sendromu MECP2 Geni Delesyon/Duplikasyon Analizi**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	MLPA	Pzt-Cmt	4 hafta sonra
C8389222	**Rett Sendromu MECP2 Geni Dizi Analizi**							
	MECP2 (methyl-CpG-binding protein-2) gen mutasyonları, X kromozomuna bağlı dominant kalıtılan Rett sendromu fenotipten sorumludur. Dizi analizi ile nokta mutasyon taraması, ilk basamak moleküler tanı yöntemi olarak uygulanmalıdır. Aynı zamanda veya sonrasında sık rastlanan delesyon tarzı mutasyonların da MLPA yöntemi ile taranması önerilmektedir.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	4 hafta sonra
C8390807	**RNA izolasyonu; kan, kemik iliği**							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	RNA İZOLASYONU	Pzt-Cmt	1 gün sonra
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	RNA İZOLASYONU		
C8392785	**SF3B1 Geni Sık Görülen Mutasyon (10-16. Ekzonlar) Analizi**							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	2 hafta
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ		
C8392831	**SHOX Geni Delesyon Duplikasyon Analizi**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	MLPA	Pzt-Cmt	4 hafta
C8392479	**Signatera Setup ve Plazma Testi ²**							
	Laboratuvara Danışınız	**Özel Kit**	0		18-24°C		Laboratuvara Danışınız	6 hafta
C8392643	**Signatera Subsequent Test ²**							
	Tam Kan	**Özel Kit**	20	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	14 gün sonra
C8392705	**Sitopeni ve Konjenital Anemi Paneli**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	6 hafta

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8392949	**SMA, Riskli Eş Taraması**							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	6	mL	18-24°C	NGS+MLPA	Pzt-Cmt	4 Hafta
C8392804	**SMA Sessiz Taşıyıcılık Analizi**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	MLPA	Pzt-Cmt	4 hafta
C8392293	**Smith Lemli Opitz Sendromu, DHCR7 Geni Dizi Analizi**							
	DHCR7 geni dizi analizi (Tüm kodlayan ekzonlar)							
	Amniyon sıvısı ve Tam Kan	**Enjektör ve EDTA (Mor Kapak)**	10	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	4 hafta sonra
	Kordon Kanı	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	2-8°C	DNA DİZİ ANALİZİ		
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ		
C8392781	**SMN1 Geni Dizi Analizi ²**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	6	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	4 hafta
C8392927	**SOD1 Geni Dizi Analizi**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	3 hafta
C8392252	**Somatik BRCA1-BRCA2 Genleri Dizi Analizi ²**							
	Meme - over kanserine yatkınlıkla ilişkili BRCA1-2 genlerinin nokta mutasyon ve delesyon duplikasyonlar açısından taranmasını içerir.Test öncesi ve sonrası genetik danışmanlık gereklidir. Tüm moleküler genetik analizlerde saptanan varyantlar için geçerli olduğu gibi, hastalığa sebep olduğu kesin olarak kanıtlanmış varyantlar rapor edilir, analiz tarihinde benign olarak değerlendirilen varyantlar raporda yer almaz, arada kalan, önemi belirsiz (muhtemelen benign ve muhtemelen patojenikler dahil) varyantlar sonuç bölümünden ayrı olarak, "diğer bulgular" şeklinde hekimin dikkatine sunulur.							
	Doku	**Steril Tüp**	1	Adet	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	5 hafta sonra
	Parafin Kesit	**Steril Tüp**	1	Adet	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)		
C8392331	**SPINK1 Geni Dizi Analizi**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	4 hafta sonra
C8389287	**Spinal Musküler Atrofi (SMA) Delesyon/Duplikasyon Analizi, Prenatal**							
	Maternal kontaminasyonun dışlanması için anneden 3 mL EDTA'lı tüpte tam kan gereklidir.Spinal muskuler atrofi (OMIM# 253300), SMN1 olarak isimlendirilen SMN geninin telomerik kopyasındaki delesyonlar veya diğer mutasyonlar sonucu ortaya çıkar.Hastalık nispeten kompleks bir moleküler mekanizmaya sahiptir. SMN1 ve SMN2, 5. kromozomun q kolundaki bir invert tekrar bölgesinin telomerik ve sentromerik yarısında yer alırlar. SMN2 geninin kodlayan bölgesi SMN1'den ekzon 7'deki bir tek nükleotid farkıyla ayrılır (c.840C vs T) . Bu farklılık nedeniyle transkripsiyon zayıflar ve normal stabil SMN proteini azalır. SMA hastalarının %95'ine yakınında homozigot SMN1 ekzon 7 kaybı söz konusudur. Bu kayıp, gerek bir delesyonla (ekzon 7'ye kısıtlı veya yaygın), gerekse c.840C>T mutasyonuyla gelişebilir. Merkezimizde uygulanan MLPA yöntemi ile hasta bireylerde doğrulama testi yapılabilmekte, anne baba taşıyıcı analizi yapılabilmektedir. Prenatala tanıda yine MLPA yöntemi ile sonuç verilmektedir.							
	Amniyon sıvısı ve Tam Kan	**Enjektör ve EDTA (Mor Kapak)**	5	mL	18-24°C	MLPA	Pzt-Cmt	3 hafta sonra
	CVS ve Tam Kan	**Transport Medyum ve EDTA(mor kapak)**	3	villüs	18-24°C	MLPA		

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8389217	**Spinal Musküler Atrofi (SMA)_Delesyon/Duplikasyon Analizi, Postnatal**							
	Spinal muskuler atrofi (OMIM# 253300), SMN1 olarak isimlendirilen SMN geninin telomerik kopyasındaki delesyonlar veya diğer mutasyonlar sonucu ortaya çıkar. Hastalık nispeten kompleks bir moleküler mekanizmaya sahiptir. SMN1 ve SMN2, 5. kromozomun q kolundaki bir invert tekrar bölgesinin telomerik ve sentromerik yarısında yer alırlar. SMN2 geninin kodlayan bölgesi SMN1'den ekzon 7'deki bir tek nükleotid farkıyla ayrılır (c.840C vs T) . Bu farklılık nedeniyle transkripsiyon zayıflar ve normal stabil SMN proteini azalır. SMA hastalarının %95'ine yakınında homozigot SMN1 ekzon 7 kaybı söz konusudur. Bu kayıp, gerek bir delesyonla (ekzon 7'ye kısıtlı veya yaygın), gerekse c.840C>T mutasyonuyla gelişebilir. Sonuçta SMN1, SMN2 genine dönüşmüş olmaktadır (gene conversion). SMN proteini çoğunlukla SMN1 geninin ürünü olsa da, SMN2 geni de az miktarda üretimine katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle SMN2 kopya sayısı da genotip modifikasyonu açısından önemlidir.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	MLPA	Pzt-Cmt	4 hafta sonra
C8392738	**Spinoserebellar Ataksi NGS Paneli (Üçlü Tekrar Sayısı Hariç)**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	6 hafta
C8389230	**Spinoserebellar Ataksi (SCA) Tipler 1,2,3,6,7,8 Üçlü Tekrar Sayısı Analizi**							
	Özellikle erişkin yaşta manifest hale geçen ve dominant kalıtılan spinoserebral ataksilerin %50'den fazlasını tip 1,2,3,6 ve 7 oluşturmaktadır. Bu amaçla ATXN1, ATXN2, ATXN3 CACNA1A, ATXN7 genlerindeki CAG tekrar sayılarının belirlenmesi hastalığın tanısı için önemlidir.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	TP-PCR/FRAGMAN ANALİZİ	Pzt-Cmt	3 hafta sonra
C8389907	**T hücre Klonalite Testi**							
	TCRb Vb -Jb bölgelerinin analizi, malignensi araştırmalarına yön vermek , T hücre malignitesi dışında lösemi ve lenfomalarda baskın serinin tespitedilmesi, rekurrens tayininde ve reziduel hastalık tanısının konulmasına yardımcı olmaktadır.							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	PCR-FRAGMAN ANALİZİ	Pzt-Cmt	2 hafta sonra
	Parafin Kesit	**Steril Tüp**	1	Adet	18-24°C	PCR-FRAGMAN ANALİZİ		
C8392799	**Talasemi Taşıyıcılık Paneli**							
	HBA1, HBA2 ve HBB genleri dizi analizi ve MLPA analizlerini kapsamaktadır.							
	Saç Teli	**Steril Tüp**	3		18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ / MLPA	Pzt-Cmt	4 hafta
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ / MLPA		
	Yanak Epitel Sürüntüsü	**Enjektör ve EDTA (Mor Kapak)**	3		18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ / MLPA		
C8392864	**Taşıyıcılık Testi-Eş Dahil, 2000 Gen (Frajil X ve SMA) ²**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	6	mL	18-24°C		Pzt-Cmt	45 gün
C8392942	**Taşıyıcılık Testi-Tek Birey, 2000 Gen (Frajil X ve SMA) ²**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	6	mL	18-24°C		Pzt-Cmt	45 gün
C8392805	**Tek Gen Dizi Analizi**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C		Pzt-Cmt	6-8 hafta

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8392336	**Tiroid Hormon Direnci THRB Geni Dizi Analizi**							
	THRB geni dizi analizi (Tüm kodlayan ekzonlar)							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	4 hafta sonra
C8389990	**TPMT Genotiplemesi**							
	TPMT, 6-MP'i (6-merkaptopürin) inaktif hale getirmekte ve metabolit oluşumunu engellemektedir. TPMT aktivitesi ile 6-MP metabolitlerinin birikimi arasında ters bir ilişki bulunmakta ve TPMT aktivitesi düşük olan bireylerde metabolit birikimi artmaktadır. TPMT (THIOPURINE S-METHYLTRANSFERASE) geni TPMT*2 (c.238G>C), TPMT*3A (c.460G>A ve c.719A>G), TPMT*3B (c.460G>A), TPMT*3C (c.719A>G) varyantları, düşük aktivite ile ilişkilidir.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	2 hafta sonra
C8392291	**TP53 Geni Dizi Analizi**							
	P53 geni dizi analizi (Tüm kodlayan ekzonlar)							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	3 hafta sonra
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ		
C8392959	**TriSure Basic NIPT ²**							
	Tam Kan	**Özel Kit**	10	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	14 gün
C8392960	**TriSure NIPT ²**							
	Tam Kan	**Özel Kit**	10	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	14 gün
C8392961	**TriSure Procare NIPT ²**							
	Tam Kan	**Özel Kit**	10	mL	18-24°C			
C8392661	**Trombofili Paneli (F2, FVL, FXIII, MTHFR 677, MTHFR 1298, PAI, FVC)**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	Floresan PCR	Pzt-Cmt	10 gün sonra
C8392289	**TSH Reseptör Geni (TSHR) Dizi Analizi**							
	TSHR geni dizi analizi (Tüm kodlayan ekzonlar)							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	4 hafta sonra
C8392783	**TUBB8 Geni Dizi Analizi**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	4 hafta

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8391013	**t(1;19) E2A-PBX Füzyon transkripti**							
	E2A/PBX füzyonunu akut lenfoblastik lösemi olguların tanımlanması ve prognoz tayininde belirleyicidir.							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	REAL TIME PCR	Pzt-Cmt	10 gün sonra
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	REAL TIME PCR		
C8389955	**t(12;21) TEL/AML1 Füzyon transkripti**							
	TEL/AML1 füzyonu, akut lemfoblastik lösemi (ALL) olgularının eukemia (ALL), açıklanmasında belirleyici olmaktadır.							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	REAL TIME PCR	Pzt-Cmt	10 gün sonra
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	REAL TIME PCR		
C8389937	**t(15;17) PML/RARA Füzyon transkripti**							
	PML/RARA füzyonu Akut promiyelositik lösemi (APL), akut miyeloid lösemi (AML) alt tipi olguların tanımlanması ve prognoz tayininde belirleyicidir.							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	REAL TIME PCR	Pzt-Cmt	10 gün sonra
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	REAL TIME PCR		
C8389943	**t(4;11)(q21;q23) MLL-AF4 Füzyon transkripti**							
	MLL (KMT2A) - AF4 (AFF1) füzyonu, agresif "mixed-lineage" lösemi olgularının tanımlanması ve prognoz tayininde belirleyicidir.							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	REAL TIME PCR	Pzt-Cmt	10 gün sonra
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	REAL TIME PCR		
C8389931	**t(8;21) AML1/ETO Füzyon transkripti**							
	AML1/ETO füzyon analizi, AML tanısı, tedavinin ve minimal rezidüel hastalığın takibi, hastalık nüksünün erken belirlenmesi ile bu füzyona sahip AML'li olguların tanımlanması ve prognoz tayininde belirleyicidir.							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	REAL TIME PCR	Pzt-Cmt	10 gün sonra
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	REAL TIME PCR		
C8389935	**t(9;22) BCR/ABL Füzyon transkripti [1]**							
	BCR/ABL füzyon analizi, KML tanısı, tedavinin ve minimal rezidüel hastalığın takibi, hastalık nüksünün erken belirlenmesi ile bu füzyona sahip ALL'li olguların tanımlanması ve prognoz tayininde belirleyicidir.							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	REAL TIME PCR	Pzt-Cmt	10 gün sonra
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	6	mL	18-24°C	REAL TIME PCR		
C8392364	**t(9;22) BCR/ABL p190 Füzyon Transkripti, Kantitatif [1]**							
	BCR/ABL füzyon analizi, KML tanısı, tedavinin ve minimal rezidüel hastalığın takibi, hastalık nüksünün erken belirlenmesi ile bu füzyona sahip ALL'li olguların tanımlanması ve prognoz tayininde belirleyicidir.							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	REAL TIME PCR	Pzt-Cmt	10 gün sonra
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	REAL TIME PCR		

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8392365	**t(9;22) BCR/ABL p210 Füzyon Transkripti, Kantitatif [1]**							
	BCR/ABL füzyon analizi, KML tanısı, tedavinin ve minimal rezidüel hastalığın takibi, hastalık nüksünün erken belirlenmesi ile bu füzyona sahip ALL'li olguların tanımlanması ve prognoz tayininde belirleyicidir.							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	REAL TIME PCR	Pzt-Cmt	10 gün sonra
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	REAL TIME PCR		
C8392694	**t(9;22) BCR/ABL p230 Füzyon Transkripti**							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C		Pzt-Cmt	10 gün
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C			
C8392832	**UPD7-UPD14 MLPA ile Metilasyon Analizi**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	MLPA	Pzt-Cmt	4 hafta
C8392948	**Uzun Okuma Tüm Genom Dizileme, Solo**							
	PacBio Uzun Okumalı Genom Sekanslama, üçüncü nesil SMRT (Single Molecule Real-Time) ve HiFi (High-Fidelity) dizileme teknolojileri sayesinde %99,9'un üzerinde doğrulukla 15-20 kilobaz uzunluğunda okumalar sağlayarak, tek nükleotid varyantlarından büyük yapısal varyasyonlara kadar geniş bir genomik değişiklik yelpazesinin güvenilir şekilde saptanmasına olanak tanır. Uzun okuma teknolojisi ve yüksek doğruluk oranı sayesinde, kısa okuma teknolojileriyle (NGS) genomda analiz edilmesi güç olan düşük karmaşıklıklı bölgeler, tekrar artış ve azalışları (repeat expansions/contractions), psödogenler ve benzeri genomik bölgelerin doğru ve kapsamlı şekilde analiz edilmesini mümkün kılar. Ayrıca, ek deneysel işleme gerek kalmadan DNA metilasyon profilinin değerlendirilmesine olanak sağlayarak epigenetik değişikliklerin de incelenmesini sağlar. Bu özellikleriyle PacBio Uzun Okumalı Genom Sekanslama, genomun daha kapsamlı analiz edilmesini sağlayarak genetik hastalıkların tanısal doğruluğunu ve tanı başarısını artıran dizileme yaklaşımı sunar. *****Örnek alımı Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri yapılmalıdır. Perşembe günü alınan örneklerin, en geç saat 17:00'ye kadar Labgen Merkez Laboratuvarı'na ulaşacak şekilde planlanması gerekmektedir. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri örnek alımı ve örnek kabulü yapılmayacaktır.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	6	mL	2-8°C		Pzt-Perş 12:00	12 hafta
C8392825	**Uzun QT Sendromu Paneli**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	8 hafta
C8392016	**Von Hippel Lindau VHL Geni Dizi Analizi**							
	VHL genindeki mutasyonlar, otozomal dominanat Von Hippel-Lindau sendromunun gelişmesine neden olmaktadır.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	3 hafta sonra
C8392677	**WES Taşıyıcılık Plus_Eş Dahil_SMA, DMD, Frajil X**							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	12 hafta sonra
C8392036	**Wilms Tümörü_1p / 16q delesyonları**							
	Kromozom1p /16q bölgelerindeki delesyonlar Wilms tümörleri ile ilişkilendirilmiştir.							
	Doku	**Steril Tüp**	1	cm	18-24°C	MLPA	Pzt-Cmt	2 hafta sonra
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	18-24°C	MLPA		
	Parafin Kesit	**Steril Tüp**	1	adet	18-24°C	MLPA		

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8392003	**Wilson Hastalığı ATP7B Geni Dizi Analizi ²**							
	ATP7B genindeki mutasyonlar, otozomal resesif kalıtılan Wilson hastalığnın gelişmesine neden olmaktadır.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	6 hafta sonra
C8389835	**Wiskott-Aldrich Sendromu WAS Geni Dizi Analizi**							
	WAS genindeki p.G70Q (c.209G>A mutasyonunun analizi X'e bağlı resesif kalıtılan Wiskott-Aldrich sendromunun ayırıcı tanısına yardımcı olmaktadır.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	4 hafta sonra
C8392950	**WT1 Ekspresyon Analizi**							
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	REAL TIME PCR	Pzt-Cmt	10 gün
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	REAL TIME PCR		
C8389410	**Y kromozom Mikrodelesyon Taraması**							
	Erkek infertilitesinde primer nedenler arasında Y kromozom spermatogenez genlerindeki mikrodelesyonlar ve sonucunda gelişen azoospermi önemli yer tutmaktadır.Y kromozomu üzerinde yer alan azoospermi lokuslarındaki (AZFa, AZFb, ve AZFc) mikrodelesyon analizleri azospermi tanısında önem taşımaktadır.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	MULTİPLEKS PCR	Pzt-Cmt	3 hafta sonra
C8392634	**1-3 Gen Dizi Analizi**							
	Amniyotik Sıvı	**Steril Tüp**	20	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)	Pzt-Cmt	6-8 hafta
	Kemik İliği	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)		
	Parafin Kesit	**Steril Tüp**	1	adet	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)		
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ (NGS)		
C8392295	**5 Alfa Redüktaz Eksikliği, SRD5A2 Geni Dizi Analizi**							
	SRD5A2 geni dizi analizi (Tüm kodlayan ekzonlar)							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	3	mL	18-24°C	DNA DİZİ ANALİZİ	Pzt-Cmt	4 hafta sonra

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ

HLA Doku Tetkikleri

C8616108 **C3d-Bağlanma Testi- Class I**

Serum	**Jelli Tüp**	8	mL	2-8°C	LUMİNEX ASSAY	Çar 08:00 Cum 08:00	3 gün sonra

C8616109 **C3d-Bağlanma Testi- Class II**

Serum	**Jelli Tüp**	8	mL	2-8°C	LUMİNEX ASSAY	Çar 08:00 Cum 08:00	3 gün sonra

C8390026 **HLA Donör Spesifik Antikor**

Örnekler, şehir içi kurumlardan saat 14:00'a kadar, şehir dışı kurumlardan 24 saat içinde, kadavra örnekleri ise en geç 2 saat içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Pıhtılı, hemolizli, lipemik, barkodsuz,transfer süresini aşan, test istem formu olmayan örnekler ret edilir. Kan örneği hasta diyalize girmeden önce alınmalıdır.Kan örnekleri alıcı ve vericiden eş zamanlı alınmalıdır.

Serum (Alıcıdan), Tam Kan (Vericiden)	**Jelli Tüp (Alıcıdan), ACD Tüp (Vericiden)**	8	mL	2-8°C	LUMİNEX ASSAY	Çar 08:00 Cum 08:00	3 gün sonra

C8390044 **Lenfosit Cross-match (CDC)**

Örnekler, şehir içi kurumlardan saat 14:00'a kadar, şehir dışı kurumlardan 24 saat içinde, kadavra örnekleri ise en geç 2 saat içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.Pıhtılı, hemolizli, lipemik, barkodsuz, transfer süresini aşan, test istem formu olmayan örnekler ret edilir. Kan örneği hasta diyalize girmeden önce alınmalıdır.Kan örnekleri alıcı ve vericiden eş zamanlı alınmalıdır.

Serum (Alıcıdan) ,Tam Kan (Vericiden ve Alıcıdan)	**Jelli Tüp (Alıcıdan), ACD Tüp (Vericiden)**	8	mL	2-8°C	CDC	Pzt-Cts 08:00	Pzt-Cum 18:00 Cts 14:00

C8390024 **Lenfosit Cross-Match (Flow Cytometry)**

Örnekler, şehir içi kurumlardan saat 14:00'a kadar, şehir dışı kurumlardan 24 saat içinde, kadavra örnekleri ise en geç 2 saat içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Pıhtılı, hemolizli, lipemik, barkodsuz,transfer süresini aşan, test istem formu olmayan örnekler ret edilir. Kan örneği hasta diyalize girmeden önce alınmalıdır.Kan örnekleri alıcı ve vericiden eş zamanlı alınmalıdır.

Serum (Alıcıdan), Tam Kan (Vericiden)	**Jelli Tüp (Alıcıdan), ACD Tüp (Vericiden)**	8	mL	2-8°C	FLOW SİTOMETRİ	Pzt-Cts 08:00	Pzt-Cum 18:00 Cts 14:00

C8630438 **Lökosit Antijen Deteksiyon (LAD)**

Serum	**Jelli Tüp**	8	mL	2-8°C	LUMİNEX ASSAY	Pzt-Cum 16:00	3 gün sonra

Serum: Örnekler, şehir içi kurumlardan saat 14:00'a kadar, şehir dışı kurumlardan 24 saat içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.Pıhtılı, hemolizli, lipemik, barkodsuz, transfer süresini aşan, test istem formu olmayan örnekler ret edilir.Serum örnekleri 48 saat içinde çalışılmayacaksa -20°C saklanır.

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8390018	**Panel reaktif antikor (PRA) class I antijene spesifik**							
	Örnekler, şehir içi kurumlardan saat 14:00'a kadar, şehir dışı kurumlardan 24 saat içinde, kadavra örnekleri ise en geç 2 saat içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Pıhtılı, hemolizli, lipemik, barkodsuz,transfer süresini aşan, test istem formu olmayan örnekler ret edilir. Kan örneği hasta diyalize girmeden önce alınmalıdır.Serum örnekleri 48 saat içinde çalışılmayacaksa -20 derecede saklanır.							
	Serum	**Jelli Tüp**	8	mL	2-8°C	LUMİNEX ASSAY	Çar 08:00 Cum 08:00	3 gün sonra
C8390019	**Panel reaktif antikor (PRA) class II antijene spesifik**							
	Örnekler, şehir içi kurumlardan saat 14:00'a kadar, şehir dışı kurumlardan 24 saat içinde, kadavra örnekleri ise en geç 2 saat içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Pıhtılı, hemolizli, lipemik, barkodsuz,transfer süresini aşan, test istem formu olmayan örnekler ret edilir. Kan örneği hasta diyalize girmeden önce alınmalıdır.Serum örnekleri 48 saat içinde çalışılmayacaksa -20 derecede saklanır.							
	Serum	**Jelli Tüp**	8	mL	2-8°C	LUMİNEX ASSAY	Çar 08:00 Cum 08:00	3 gün sonra
C8390017	**PRA (PANEL REAKTİF ANTİKOR) tanımlama**							
	Örnekler, şehir içi kurumlardan saat 14:00'a kadar, şehir dışı kurumlardan 24 saat içinde, kadavra örnekleri ise en geç 2 saat içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Pıhtılı, hemolizli, lipemik, barkodsuz,transfer süresini aşan, test istem formu olmayan örnekler ret edilir. Kan örneği hasta diyalize girmeden önce alınmalıdır.Serum örnekleri 48 saat içinde çalışılmayacaksa -20 derecede saklanır.							
	Serum	**Jelli Tüp**	8	mL	2-8°C	LUMİNEX ASSAY	Çar 08:00 Cum 08:00	3 gün sonra
C8390014	**PRA (PANEL REAKTİF ANTİKOR) tarama**							
	Örnekler, şehir içi kurumlardan saat 14:00'a kadar, şehir dışı kurumlardan 24 saat içinde, kadavra örnekleri ise en geç 2 saat içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Pıhtılı, hemolizli, lipemik, barkodsuz,transfer süresini aşan, test istem formu olmayan örnekler ret edilir. Kan örneği hasta diyalize girmeden önce alınmalıdır.Serum örnekleri 48 saat içinde çalışılmayacaksa -20 derecede saklanır.							
	Serum	**Jelli Tüp**	8	mL	2-8°C	LUMİNEX ASSAY	Çar 08:00 Cum 08:00	3 gün sonra
C8696183	**SBT, Yüksek Çözünürlükte, 4 Basamaklı, 5 Lokus Donör Taraması (HLA A,B,C, DR, DQ)**							
	Örnekler, şehir içi kurumlardan saat 14:00'a kadar, şehir dışı kurumlardan 24 saat içinde, kadavra örnekleri ise en geç 2 saat içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Pıhtılı, hemolizli, lipemik, barkodsuz,transfer süresini aşan, test istem formu olmayan örnekler ret edilir. Kan örneği hasta diyalize girmeden önce alınmalıdır.HLA Tiplendirme testleri için TDİS üzerinden kayıt açılması gereklidir.							
	Tam Kan (EDTA)	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	SBT	Pzt-Cum 16:00	14 gün sonra
C8389606	**SBT, Yüksek Çözünürlükte, 4 Basamaklı, 6 Lokus Donör Taraması (HLA A,B,C,DR, DQ, DP)**							
	Örnekler, şehir içi kurumlardan saat 14:00'a kadar, şehir dışı kurumlardan 24 saat içinde, kadavra örnekleri ise en geç 2 saat içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.Pıhtılı, hemolizli, lipemik, barkodsuz, transfer süresini aşan, test istem formu olmayan örnekler ret edilir.Kan örneği hasta diyalize girmeden önce alınmalıdır.HLA Tiplendirme testleri için TDİS üzerinden kayıt açılması gereklidir.							
	Bukkal Mukoza	**Nucliswab**	0		2-8°C	SBT	Pzt-Cum 16:00	14 gün sonra
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	4.5	mL	2-8°C	SBT		

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8696181	**Single Antigen Class I**							
	Örnekler, şehir içi kurumlardan saat 14:00'a kadar, şehir dışı kurumlardan 24 saat içinde, kadavra örnekleri ise en geç 2 saat içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.Pıhtılı, hemolizli, lipemik, barkodsuz,transfer süresini aşan, test istem formu olmayan örnekler ret edilir.Kan örneği hasta diyalize girmeden önce alınmalıdır.Serum örnekleri 48 saat içinde çalışılmayacaksa -20 derecede saklanır.							
	Serum	**Jelli Tüp**	8	mL	2-8°C	LUMİNEX ASSAY	Çar 08:00 Cum 08:00	3 gün sonra
C8696180	**Single Antigen Class II**							
	Örnekler, şehir içi kurumlardan saat 14:00'a kadar, şehir dışı kurumlardan 24 saat içinde, kadavra örnekleri ise en geç 2 saat içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Pıhtılı, hemolizli, lipemik, barkodsuz,transfer süresini aşan, test istem formu olmayan örnekler ret edilir. Kan örneği hasta diyalize girmeden önce alınmalıdır.Serum örnekleri 48 saat içinde çalışılmayacaksa -20 derecede saklanır.							
	Serum	**Jelli Tüp**	8	mL	2-8°C	LUMİNEX ASSAY	Çar 08:00 Cum 08:00	3 gün sonra
C8390006	**SSO, HLA A (Düşük Çözünürlük)**							
	Örnekler, şehir içi kurumlardan saat 14:00'a kadar, şehir dışı kurumlardan 24 saat içinde, kadavra örnekleri ise en geç 2 saat içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Pıhtılı, hemolizli, lipemik, barkodsuz,transfer süresini aşan, test istem formu olmayan örnekler ret edilir. Kan örneği hasta diyalize girmeden önce alınmalıdır.HLA Tiplendirme testleri için TDİS üzerinden kayıt açılması gereklidir.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	PCR-SSO	Pzt-Cum 16:00	3 gün sonra
C8390007	**SSO, HLA B (Düşük Çözünürlük)**							
	Örnekler, şehir içi kurumlardan saat 14:00'a kadar, şehir dışı kurumlardan 24 saat içinde, kadavra örnekleri ise en geç 2 saat içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Pıhtılı, hemolizli, lipemik, barkodsuz,transfer süresini aşan, test istem formu olmayan örnekler ret edilir. Kan örneği hasta diyalize girmeden önce alınmalıdır.HLA Tiplendirme testleri için TDİS üzerinden kayıt açılması gereklidir.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	PCR-SSO	Pzt-Cum 16:00	3 gün sonra
C8390008	**SSO, HLA C (Düşük Çözünürlük)**							
	Örnekler, şehir içi kurumlardan saat 14:00'a kadar, şehir dışı kurumlardan 24 saat içinde, kadavra örnekleri ise en geç 2 saat içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Pıhtılı, hemolizli, lipemik, barkodsuz,transfer süresini aşan, test istem formu olmayan örnekler ret edilir. Kan örneği hasta diyalize girmeden önce alınmalıdır.HLA Tiplendirme testleri için TDİS üzerinden kayıt açılması gereklidir.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	PCR-SSO	Pzt-Cum 16:00	3 gün sonra
C8390011	**SSO, HLA DQB1,DQA1 (Düşük Çözünürlük)**							
	Örnekler, şehir içi kurumlardan saat 14:00'a kadar, şehir dışı kurumlardan 24 saat içinde, kadavra örnekleri ise en geç 2 saat içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Pıhtılı, hemolizli, lipemik, barkodsuz,transfer süresini aşan, test istem formu olmayan örnekler ret edilir. Kan örneği hasta diyalize girmeden önce alınmalıdır.HLA Tiplendirme testleri için TDİS üzerinden kayıt açılması gereklidir.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	PCR-SSO	Pzt-Cum 16:00	3 gün sonra
C8390009	**SSO, HLA DR B1 (Düşük Çözünürlük)**							
	Örnekler, şehir içi kurumlardan saat 14:00'a kadar, şehir dışı kurumlardan 24 saat içinde, kadavra örnekleri ise en geç 2 saat içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Pıhtılı, hemolizli, lipemik, barkodsuz,transfer süresini aşan, test istem formu olmayan örnekler ret edilir. Kan örneği hasta diyalize girmeden önce alınmalıdır.HLA Tiplendirme testleri için TDİS üzerinden kayıt açılması gereklidir.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	PCR-SSO	Pzt-Cum 16:00	3 gün sonra

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.

ALFABETİK TEST LİSTESİ

03.11.2026

	ÖRNEK	KAP	MİKTAR		TAŞIMA	YÖNTEM	ÇALIŞMA GÜNÜ	RAPORLAMA TARİHİ
C8390005	**SSO, HLA-A,B,DR (Düşük Çözünürlük)**							
	Örnekler, şehir içi kurumlardan saat 14:00'a kadar, şehir dışı kurumlardan 24 saat içinde, kadavra örnekleri ise en geç 2 saat içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Pıhtılı, hemolizli, lipemik, barkodsuz,transfer süresini aşan, test istem formu olmayan örnekler ret edilir. Kan örneği hasta diyalize girmeden önce alınmalıdır.HLA Tiplendirme testleri için TDİS üzerinden kayıt açılması gereklidir.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	PCR-SSO	Pzt-Cum 16:00	3 gün sonra
C8390045	**SSO,HLA A,B,C,DR,DQ Düşük Çözünürlük testi**							
	Örnekler, şehir içi kurumlardan saat 14:00'a kadar, şehir dışı kurumlardan 24 saat içinde, kadavra örnekleri ise en geç 2 saat içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır. Pıhtılı, hemolizli, lipemik, barkodsuz, transfer süresini aşan, test istem formu olmayan örnekler ret edilir. Kan örneği hasta diyalize girmeden önce alınmalıdır.HLA Tiplendirme testleri için TDİS üzerinden kayıt açılması gereklidir.							
	Tam Kan	**EDTA-Mor Kapak**	2	mL	2-8°C	PCR-SSO	Pzt-Cum 16:00	3 gün sonra

Özel Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, TÜRKAK'tan AB-0001-TL dosya numarası ile TS EN ISO 15189:2023 standardına göre sabit ve esnek kapsam ile akredite edilmiştir.Test adından sonra bulunan rakamlar; 1: Akredite test olduğunu, 2: Testlerin ISO 15189 standardına göre akredite Labmed Dortmund MVZ laboratuvarında, 3: Merkez laboratuvarımızda sonuçlandırıldığını göstermektedir.